

(参考) 助成対象のインターフェロンフリー治療

令和4年8月24日時点

	セロタイプ1	セロタイプ2	治療期間	留意点
ダグラタスビル及びアスナプレビル併用療法 (ダクルインザ+スンペプラ)	○		24週 (7ヶ月)	
レジパスビル・ソホスビル配合錠 (ハーボニー)	○	○	12週 (4ヶ月)	・慢性肝炎 ・代償性肝硬変
オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル配合錠 (ヴィキラックス)	○	○	12週 (4ヶ月)	セロタイプ2は慢性肝炎のみ16週 (5ヶ月)
ソホスビル・リバビリン併用療法 (ソバルディ+リバビリン)		○	12週 (4ヶ月)	
	いずれも該当しない		24週 (7ヶ月)	ジェノタイプ検査により、いずれにも該当しないことを確認
オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル配合錠/リバビリン併用療法 (ヴィキラックス+レベトール)		○		・適用は慢性肝炎 (肝硬変は対象外) ・リバビリンはレベトールのみ
グラゾプレビル及びエルバスビル併用療法 (グラジナ+エレルサ)	○		12週 (4ヶ月)	
ダグラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル配合錠 (ジメンシー)	○		12週 (4ヶ月)	
グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤 (マヴィレット配合錠)	○	○	8週 (3ヶ月)	・慢性肝炎 ・慢性肝炎に対する前治療歴に応じて12週とすることができる
	○	○	12週 (4ヶ月)	・代償性肝硬変
	いずれも該当しない		12週 (4ヶ月)	・慢性肝炎及び代償性肝硬変 ・ジェノタイプの検査により、いずれにも該当しないことを確認
ソホスビル/ベルパタスビル配合錠/リバビリン併用療法 (エプクルーサ配合錠+リバビリン)	○	○	24週 (7ヶ月)	・慢性肝炎 ・代償性肝硬変
ソホスビル/ベルパタスビル配合錠 (エプクルーサ配合錠)	○	○	12週 (4ヶ月)	