ID：

様

性別　　生年月日

処方箋が出されましたら、
治療と処方薬の確認のため薬局窓口で
この説明書を提示してください。

【パクリタキセル/シスプラチン／ベバシズマブ（PTX/CDDP/Bev）療法】
スケジュール：3週間を1コースの治療として繰り返し行います。

体調や検査値、副作用によってはスケジュールや点滴時間を変更する場合があります。

		今回のサイクル																					次サイクル																			
		4																					5																			
日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
点滴	アバスチン（ベバシズマブ）	血管新生阻害剤と呼ばれる分子標的薬です。がん細胞への血管新生を抑制します。血圧が高くなりますので、血圧は毎日同じ時間に計測してチェックしましょう。傷がふさがりにくく、出血しやすくなる傾向がありますので怪我にはご注意ください。多量の出血を伴う場合にはすぐにご連絡ください。 点滴は過敏症対策のため初回90分　2回目60分　3回目以降30分で点滴します。（別紙もご覧ください）																																									
点滴	パクリタキセル	がんの分裂を抑える薬です。アレルギー症状の発現に注意し、はじめの10分間はゆっくり点滴し、問題なければその後スピードを速めて点滴します。																																									
点滴	シスプラチン	白金製剤と呼ばれ、がん細胞のDNA合成を阻害する薬です。尿量が少ないと腎臓に障害を起こしやすいため、点滴日から3日間は1L以上の水分をとって尿量を増やしてください。																																									
副作用	過敏症状	点滴中に起こることがあります。息苦しい、胸がドキドキする、かゆみ・発疹が出る等の症状がありましたらすぐにお知らせください。																																									
副作用	ｱﾚﾙｷﾞｰ症状	点滴治療を開始して数日後に皮膚の発疹、かゆみなどが現れることがあります。自宅でこのような症状が現れた場合にはご連絡ください。																																									
副作用	吐き気・食欲不振	治療法に対応した吐き気止めを使用しますが、治療日から数日間、むかつきや食欲不振が起こることがあります。個人差が大きいため、食事や水分が摂れない時にはお知らせください。																																									
副作用	便秘	抗がん剤や制吐剤（吐き気止め）によって腸の動きが悪くなります。水分を十分にとり、下剤を調節して便秘を予防しましょう。（市販の下剤でも構いません。）																																									
副作用	骨髄抑制	点滴後10～14日頃が白血球や血小板の数が一番少なくなることが予想されます。この時期は、手洗い・うがいを感染症にかからないように心がけたり、ケガや転倒に気をつけましょう。																																									
副作用	筋肉痛・関節痛	治療日から2～3日目に発現するこることがあります。痛み止めで症状を軽減でき、数日で軽快します。																																									
副作用	脱毛	抗がん剤投与2～3週間後から起こります。頭髪以外の部分でも起こります。抗がん剤の治療終了3～6ヵ月後には再び生えてきます。																																									
副作用	末梢神経障害	感覚や運動の麻痺、手足のしびれ、手足の痛みなどを感じることがあります。投与回数が増えると増殖する傾向があります。																																									
日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火

ID：

様

性別　　生年月日

処方箋が出されましたら、
治療と処方薬の確認のため薬局窓口で
この説明書を提示してください。

『アバスチンの副作用』 腹痛（吐き気、嘔吐、便秘を伴うこともあります）。血便が出る。
意識がなくなる。麻痺が出る。めまいがする。
上180－下120を超える高血圧
我慢できない頭痛がする。気分が悪い。吐き気がする。けいれんがある。
胸が痛い（締めつけられるような感じがする）
足がむくんだり、痛みがある。突然息切れがする。
口から血を吐く（痰に血が混じる程度ではない明らかな出血を伴うもの）
鼻血や歯肉・膣などからの出血

頻度は少ないですが
このような症状がみられたら、
すぐにお知らせ下さい。
治療状況がいつでも把握できるように

備考	★【パクリタキセルにはアルコールが入っていますので、治療日に車の運転はしないで下さい。】 治療期間中に息苦しい、咳が出る、熱が出るなどの症状が出た場合にはご連絡ください。 この治療法は、作用の違う薬剤を組み合わせることで効果を高め、副作用を抑えています。副作用は不快なものですが、対処の仕方、気持ちの持ち方によって感じ方は大きく異なります。患者さんご自身で工夫をするとともに、辛いこと、困ったこと等ありましたら、医療者（医師・看護師・薬剤師）にご相談ください

CHIBA CANCER CENTER
千葉県がんセンター　薬剤部
千葉市中央区仁戸名町666-2
TEL：043-264-5431