

ID:   様性別       生年月日                     

本日処方箋が出された場合には治療と処方薬の確認のため薬局窓口でこの説明書を提示してください。

**【アムルピシン(AMR)療法】**

スケジュール: 3~4週間を1コースの治療として繰り返し行います。

体調や検査値、副作用によってはスケジュールや点滴時間を変更する場合があります。

		今回のサイクル												次サイクル																													
		4												5																													
日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
点滴	カルセド (アムルピシン)	☑☑☑												☑☑☑																													
		がん細胞の増殖の過程を抑える薬です。尿が赤色になることがあります。副作用予防のため短時間で投与します。																																									
副作用	悪心・食欲不振	[Green Bar]												[Green Bar]																													
		治療法に対応した吐き気止めを使用しますが、治療日から数日間、むかつきや食欲不振が起こることがあります。個人差が大きいので、食事や水分が摂れない時はお知らせください。																																									
	便秘	[Green Bar]												[Green Bar]																													
		抗がん剤や制吐剤(吐き気止め)によって腸の動きが悪くなります。水分を十分にとり、下剤を調節して便秘を予防しましょう。(市販の下剤でも構いません。)																																									
	下痢	1日3回以上の下痢が生じる場合があります。水分を十分にとって脱水を防ぎます。必要に応じて下痢止めを使用します。																																									
		骨髄抑制の時期は特に起こりやすくなります。点滴後からうがいで口の中を清潔に保つよう心がけましょう。																																									
	骨髄抑制	点滴後10~14日頃が白血球や血小板の数が一番少なくなることが予想されます。この時期は、手洗い・うがいをして感染症にかからないように心がけたり、ケガや転倒に気をつけましょう。																																									
	脱毛	[Green Bar]												[Green Bar]																													
		抗がん剤投与2~3週間後から起こります。頭髪以外の部分でも起こることがあります。抗がん剤の治療終了3~6ヵ月後には再び生えてきます。																																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火

**備考** 治療期間中に息苦しい、咳が出る、熱が出るなどの症状が出た場合にはご連絡ください。  
 その他の副作用として、心毒性(心機能低下)の報告があります。  
 副作用は不快なものですが、対処の仕方、気持ちの持ち方によって感じ方は大きく異なります。患者さんご自身で工夫をされるとともに、辛いこと、困ったこと等ありましたら、医療者(医師・看護師・薬剤師)にご相談ください。



千葉県がんセンター 薬剤部  
 千葉市中央区仁戸名町666-2  
 TEL: 043-264-5431