

ID:

**様**

性別  生年月日

処方箋が出された場合には  
 治療と処方薬の確認をするため  
 薬局窓口でこの説明書を提示し  
 てください。

**【ドキシソルビン療法】**

スケジュール: 4週間毎に一度治療を行います(1サイクル)。

(患者さんによってはスケジュールを変更する場合があります。)

1コース目(1日目から28日目まで)														2コース目												
4														5												
日付														日付												
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30														1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火														水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火												
点滴	ドキシソルビン														ドキシソルビン											
	がん細胞の増殖の過程を抑える薬です。尿が赤色になることがあります。約10分程度で点滴します。																									
副作用	悪心・食欲不振														悪心・食欲不振											
	治療法に対応した吐き気止めを使用しますが、治療日から数日間、むかつきや食欲不振が起こることがあります。個人差が大きいので、食事や水分が摂れない時はお知らせください。																									
	口内炎														口内炎											
	骨髄抑制の時期は特に起こりやすくなります。点滴後からうがいで口の中を清潔に保つよう心がけましょう。																									
	骨髄抑制														骨髄抑制											
点滴後10～14日頃が白血球や血小板の数が一番少なくなることが予想されます。この時期は、手洗い・うがいを感染症にかからないように心がけたり、ケガや転倒に気をつけましょう。																										
便秘														便秘												
抗がん剤や制吐剤(吐き気止め)によって腸の動きが悪くなります。水分を十分にとり、下剤を調節して便秘を予防しましょう。(市販の下剤でも構いません。)																										
脱毛														脱毛												
抗がん剤投与2～3週間後から起こります。頭髪以外の部分でも起こります。抗がん剤の治療終了3～6ヵ月後には再び生えてきます。																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30														1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火														水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火												

**備考** その他の副作用として、心毒性(総投与量が大量になると出やすくなるため、規定の量を超えないようにしています)治療期間中に息苦しい、咳が出る、熱が出るなどの症状が出た場合にはご連絡ください。副作用の出方には個人差があります。また、表以外の副作用も出ることがあります。不快な副作用はできるだけ軽くするように支援しますので、辛い症状がある場合には医療スタッフに相談してください。