

ID:

様

性別 生年月日

治療と処方薬の確認のため薬局窓口でこの説明書を提示してください。

【FOLFIRI療法】

スケジュール： 2週間以上あけて治療を繰り返します。スケジュールは変更することがあります。

		今回のサイクル														次サイクル																											
		4														5																											
日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火							
点滴	イリノテカン	✂														✂																											
	レボホリナート	✂														✂																											
	フルオロウラシル	✂														✂																											
	フルオロウラシル(持続)	✂✂✂														✂✂✂																											
副作用	悪心・嘔吐	■														■																											
	倦怠感	■														■																											
	口内炎	■														■																											
	骨髄抑制	■														■																											
	下痢	■														■																											
	皮膚障害・手足症候群	■														■																											
	脱毛	■														■																											
日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火							

備考 涙の中に治療薬が出てくる場合があります。涙が増えて視界がかすむ、涙がこぼれるなどの症状が出ましたら診察時にお知らせください。可能なら薬局で人工涙液(サンティア)を購入し、1日6-10回程度点眼してください。症状が治まらない場合は眼科を受診してください。副作用の出方には個人差があり、上の表以外の副作用が出ることもあります。詳しくは小冊子を参照してください。副作用は不快なものですが、対処の仕方、気持ちの持ち方によって感じ方は異なってきます。患者さんご自身で工夫をされるとともに、辛いこと、困ったこと等ありましたら、医療者(医師・看護師・薬剤師)にご相談ください。

千葉県がんセンター 薬剤部
 千葉市中央区仁戸名町666-2
 TEL:(代)043-264-5431

CHIBA CANCER CENTER