

ID: [REDACTED]

消化器内科

様

性別 [REDACTED]

生年月日 [REDACTED]

治療と処方薬の確認のため薬局窓口でこの説明書を提示してください。

【mFOLFIRINOX】

スケジュール： 2週間以上あけて治療を繰り返します。(患者さんによってはスケジュールを変更する場合があります。)

今回のサイクル														次サイクル													
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		4														5																											
日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
点滴	エルプラット (オキサリプラチン)	[Icon]														[Icon]																											
	イリノテカン	[Icon]														[Icon]																											
	レボホリナート	[Icon]														[Icon]																											
	フルオロウラシル(持続)	[Icon]														[Icon]																											
副作用	過敏症 まれにアナフィラキシーショック	[Green]																																									
	悪心・食欲不振	[Green]																																									
	倦怠感	[Green]																																									
	口内炎	[Green]																																									
	骨髄抑制	[Green]																																									
	便秘	[Green]																																									
	下痢	[Green]																																									
	脱毛	[Green]																																									
	末梢神経障害	[Green]																																									
備考	副作用の出方には個人差があり、上の表以外の副作用が出ることもあります。詳しくは小冊子を参照してください。副作用は不快なものですが、対処の仕方、気持ちの持ち方によって感じ方は異なってきます。患者さんご自身で工夫をするとともに、辛いこと、困ったこと等ありましたら、医療者(医師・看護師・薬剤師)にご相談ください。																																										



千葉県がんセンター 薬剤部
千葉市中央区仁戸名町666-2
CHIBA CANCER CENTER TEL:(代)043-264-5431