


4. 第1子の育児について

(1) 生後1か月までの授乳の内訳




生後1か月までの授乳について聞いたところ、「母乳のみ」が31.4%、「母乳と粉ミルクの併用」は64.3%、「粉ミルクのみ」は4.2%となっている。

過去の調査と比較すると、「母乳と粉ミルクの併用」は平成24年度より9.1ポイント増加している。一方、「母乳のみ」は平成24年度より7.3ポイント減少している。

(2) 母乳のみにしなかった理由

問35で「母乳と粉ミルクの併用」「粉ミルクのみ」「特殊ミルクのみ」と答えた方へ
問35-1 母乳のみにしなかった理由は何ですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。

図表4-2-1 母乳のみにしなかった理由（経年比較）[複数回答]




生後1か月までの授乳について、「母乳と粉ミルクの併用」「粉ミルクのみ」「特殊ミルクのみ」と答えた人(842人)に、母乳のみにしなかった理由を聞いたところ、「母乳があまりでなかったから」が61.3%で最も高く、次いで「母乳をどのくらい飲んでいるかわからなかったから」(39.7%)、「医師に言われたから」(6.9%)、「母乳で育てようと思わなかったから」(6.5%)となっている。

過去の調査と比較すると、「ミルクがよいと思ったから」は平成24年度より4.0ポイント、「母乳で育てようと思わなかったから」は平成24年度より3.4ポイント、それぞれ増加している。

(3) 子どもの寝かせ方

問36 お子さんが生まれてからの寝かせ方はどうでしたか。

図表4-3-1 子どもの寝かせ方（経年比較）




子どもの寝かせ方を聞いたところ、「おむねあお向け寝だった」が97.4%、「おむねうつ伏せ寝だった」は1.7%となっている。

過去の調査と比較すると、「おむねあお向け寝だった」は平成12年度以降増加傾向にある。

(4) うつ伏せ寝にした理由

問36で「おおむねうつ伏せ寝だった」と答えた方へ
問36-1 どのような理由でそうしましたか。

図表 4-4-1 うつ伏せ寝にした理由（経年比較）




子どもの寝かせ方が「おおむねうつ伏せ寝だった」と答えた人（21人）に、その理由を聞いたところ、「自然にしていた」が61.9%で最も高く、次いで「生まれた病院・産院でしていたから」と「うつ伏せ寝がいいと思ったから」（ともに4.8%）となっている。

過去の調査と比較すると、「自然にしていた」は平成12年度以降増加傾向にある。「うつ伏せ寝がいいと思ったから」は平成24年度より4.8ポイント増加している。

(5) 乳幼児突然死症候群（SIDS）の知識

問37 うつ伏せ寝が乳幼児突然死症候群（SIDS）の危険因子のひとつといわれていることを知っていますか。

図表4-5-1 乳幼児突然死症候群（SIDS）の知識（経年比較）




うつ伏せ寝が乳幼児突然死症候群（SIDS）の危険因子のひとつといわれていることを知っているか聞いたところ、「知っている」が97.9%、「知らない」は0.9%となっている。

過去の調査と比較すると、「知っている」は平成17年度以降増加傾向にある。

(6) BCG接種

問38 BCG接種を受けましたか。

図表4-6-1 BCG接種（経年比較）



※平成12年度は「わからない(0.1%)」があり、その値は「無回答」に含めて表記している

BCG接種を受けたか聞いたところ、「はい」が99.4%、「いいえ」は0.5%となっている。


過去の調査と比較すると、平成24年度と比べて大きな傾向の変化はみられない。

(7) BCG接種時期

問38で「はい」と答えた方へ

問38-1 接種したのはいつごろですか。

図表4-7-1 BCG接種時期（経年比較）



BCG接種を「受けた」と答えた人(1,221人)に、接種したのはいつごろか聞いたところ、「生後6ヶ月以内」が69.5%で最も高く、次いで「6ヶ月～1歳未満」(28.3%)、「1歳以降」(0.7%)となっている。


過去の調査と比較すると、「6ヶ月～1歳未満」は平成24年度より22.7ポイント増加している。一方、「生後6ヶ月以内」は平成24年度より23.0ポイント減少している。

(8) BCG接種を受けなかった理由

問38で「いいえ」と答えた方へ

問38-2 受けなかった理由で最もあてはまるのは何ですか。

図表4-8-1 BCG接種を受けなかった理由（経年比較）




BCG接種を「受けなかった」と答えた人（6人）に、受けなかった理由を聞いたところ、「副作用などが心配で受けさせたくないから」が50.0%で最も高く、次いで「子どもの風邪などのために機会を逃したから」（16.7%）となっている。

過去の調査との比較は、基数が少ないため参考に図示する。

(9) 四種混合接種

問39 四種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）の1期の4回を受けましたか。

図表4-9-1 四種混合接種（経年比較）



※平成24年度以前の設問では、「三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）の1期の3回を受けましたか。」としていた

四種混合の1期の4回を受けたか聞いたところ、「はい」が94.5%、「いいえ」は4.6%となっている。


過去の調査との比較は、設問文が異なるため参考に図示する。

(10) 四種混合接種が済んだ時期

問39で「はい」と答えた方へ

問39-1 1期4回が済んだのはいつですか。

図表4-10-1 四種混合接種が済んだ時期（経年比較）



※平成24年度の設問では、「1期3回が済んだのはいつですか。」としていた

四種混合の1期の4回を「受けた」と答えた人(1,161人)に、1期4回が済んだのはいつか聞いたところ、「1歳6か月まで」が47.5%で最も高く、次いで「1歳6ヶ月～2歳」(43.8%)、「2歳以降」(5.8%)となっている。


過去の調査との比較は、設問文や選択肢が異なるため参考に図示する。

(11) 四種混合接種を受けなかった理由

問39で「いいえ」と答えた方へ

問39-2 受けなかった理由で最もあてはまるのは何ですか。

図表4-11-1 四種混合接種を受けなかった理由（経年比較）



四種混合の1期の4回を「受けなかった」と答えた人（57人）に、受けなかった理由を聞いたところ、「子どもの風邪などのために機会を逃したから」が10.5%で最も高くなっている。

過去の調査との比較は、基数が少ないため参考に図示する。


※令和2年度「その他」の主な理由

『三種混合+ポリオを受けた』『これから4回目を受ける予定』

(12) 麻しん・風しん（MR）の接種

問40 麻しん・風しん（MR）の予防接種を受けましたか。

図表4-12-1 麻しん・風しん（MR）の接種（経年比較）



※平成24年度以前の設問では、「麻しん（はしか）の予防接種を受けましたか。」としていた

麻しん・風しん（MR）の予防接種を受けたか聞いたところ、「はい」が98.9%、「いいえ」は0.5%となっている。


過去の調査との比較は、設問文が異なるため参考に図示する。

(13) 麻しん・風しん（MR）の接種時期

問40で「はい」と答えた方へ

問40-1 接種したのはいつですか。

図表4-13-1 麻しん・風しん（MR）の接種時期（経年比較）



※平成24年度の設定では、「麻しん（はしか）の予防接種したのはいつですか。」としていた

麻しん・風しん（MR）の予防接種を「受けた」と答えた人（1,214人）に、接種したのはいつか聞いたところ、「1歳～1歳3ヶ月」が84.5%で最も高く、次いで「1歳3ヶ月～1歳6ヶ月」（8.7%）、「1歳6ヶ月以降」（3.7%）となっている。


過去の調査との比較は、設問文や選択肢が異なるため参考に図示する。

(14) 麻しん・風しん（MR）の接種を受けなかった理由

問40で「いいえ」と答えた方へ

問40-2 受けなかった理由で最もあてはまるのは何ですか。

図表4-14-1 麻しん・風しん（MR）の接種を受けなかった理由（経年比較）



※平成24年度以前は「受ける前に麻疹（はしか）にかかってしまったから（平成24年度：7.1%、平成17年度：6.0%、平成12年度：8.1%）」があり、その値は「その他」に含めて表記している

麻しん・風しん（MR）の接種を「受けなかった」と答えた人（6人）に、受けなかった理由を聞いたところ、「副作用などが心配で受けさせられなかったから」が50.0%で最も高くなっている。

過去の調査との比較は、基数が少ないため参考に図示する。