

### 13. 受動喫煙の防止

#### (1) 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知度

問44 受動喫煙とは、「自分の意思とは関係なく他人のたばこの煙を吸ってしまうこと」を言います。あなたは、喫煙者だけでなく、非喫煙者にも受動喫煙により健康への影響があることを知っていますか。(〇はひとつ)

全体では、「知っている」が80.7%と最も高く、次いで「だいたい知っている」が14.2%、「知らない」が3.1%となっている。(図13-1-1)

性別にみると、「知っている」は女性(81.8%)が男性(79.5%)より2.3ポイント高くなっている。(図13-1-1)

性・年齢別にみると、「知っている」は、男性では30~39歳(85.7%)、女性では20~29歳(91.5%)で最も高くなっている。また、女性の20歳~39歳ではいずれも9割台と高くなっている。

(図13-1-2)

図13-1-1 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知度(全体/性別)





図13-1-2 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知度(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、平成29年度とほぼ同じ状況となっている。(図13-1-3)

性別で過去の調査と比較すると、男性の「知っている」(79.5%)は平成29年度(78.5%)より1.0ポイント増加している。(図13-1-4)

図13-1-3 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知度(過去の調査との比較)





図13-1-4 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知度(過去の調査との比較・性別)



(2) 望まない受動喫煙の機会の有無

問45 あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。(〇はひとつ)

全体では、「はい」が52.0%、「いいえ」が45.9%となっている。(図13-2-1)

性別にみると、「はい」は、男性(57.3%)が女性(47.8%)より9.5ポイント高くなっている。

(図13-2-1)

性・年齢別にみると、「はい」は、男性の20~49歳で特に高く、いずれも7割を超えている。「いいえ」は、男性の70歳以上と女性の60歳以上で5割半ばを超えて高くなっている。(図13-2-2)

図13-2-1 受動喫煙の機会の有無(全体/性別)





図13-2-2 受動喫煙の機会の有無(性・年齢別)



(3) 受動喫煙があった場所

問46 あなたはこの1ヶ月間に、下のアからコで望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。アからコそれぞれの場所で最もあてはまる番号を選んでください。（○はそれぞれひとつ）

※ 過去1ヶ月間にその場所に行かなかった場合は「6」を選択してください。

※ 学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ職場」欄に記入してください。

ア 自宅

全体では、「ほぼ毎日」は7.4%となっており、「週に数回程度」(3.1%)、「週に1回程度」(1.2%)、「月に1回程度」(2.1%)の4つを合わせた《あった》は、13.8%となっている。(図13-3-1) 性別にみると、《あった》は、女性(16.7%)が男性(10.0%)より6.7ポイント高くなっている。(図13-3-1)

性・年齢別にみると、《あった》は、男性では20~29歳(19.9%)、女性では40~49歳(23.9%)で最も高くなっている。また、いずれの年齢でも女性が男性より高い傾向がみられる。(図13-3-2)

図13-3-1 受動喫煙があった場所 ア 自宅(全体/性別)




図13-3-2 受動喫煙があった場所 ア 自宅(性・年齢別)




図13-3-3 受動喫煙があった場所 ア 自宅（過去の調査との比較）





図13-3-4 受動喫煙があった場所 ア 自宅（過去の調査との比較・性別）



※平成23年度調査では、この質問をしていない。

※平成29年度は、回答条件が異なる（受動喫煙の機会があった方のみ回答した）ため、参考情報とする。

イ 職場

全体では、「ほぼ毎日」は6.3%となっており、「週に数回程度」(5.5%)、「週に1回程度」(2.8%)、「月に1回程度」(3.4%)の4つを合わせた《あった》は、18.1%となっている。(図13-3-5)  
性別にみると、《あった》は、男性(24.3%)が女性(12.9%)より11.4ポイント高くなっている。

(図13-3-5)

性・年齢別にみると、《あった》は、男性では30~39歳(48.0%)、女性では20~29歳(29.4%)で最も高くなっている。男性の30~49歳では4割を超えて、特に高くなっている。(図13-3-6)

図13-3-5 受動喫煙があった場所 イ 職場(全体/性別)




図13-3-6 受動喫煙があった場所 イ 職場(性・年齢別)




図13-3-7 受動喫煙があった場所 イ 職場（過去の調査との比較）





図13-3-8 受動喫煙があった場所 イ 職場（過去の調査との比較・性別）



※平成23年度調査では、この質問をしていない。

※平成29年度は、回答条件が異なる（受動喫煙の機会があった方のみ回答した）ため、参考情報とする。

## ウ 学校

全体では、「ほぼ毎日」は0.1%となっており、「週に数回程度」(0.3%)、「週に1回程度」(0.3%)、「月に1回程度」(0.4%)の4つを合わせた《あった》は、1.1%となっている。(図13-3-9)

性別にみると、《あった》は大きな差はみられない。「その場所に行ったが全くなかった」は、女性(15.1%)が男性(11.2%)より3.9ポイント高くなっている。(図13-3-9)

性・年齢別にみると、《あった》は男性の15~19歳(10.7%)で唯一1割を超えて高くなっている。次いで、男性の20~29歳(9.8%)、女性の20~29歳(4.3%)と続いている。(図13-3-10)

図13-3-9 受動喫煙があった場所 ウ 学校 (全体/性別)




図13-3-10 受動喫煙があった場所 ウ 学校 (性・年齢別)






図13-3-11 受動喫煙があった場所 ウ 学校（過去の調査との比較）





図13-3-12 受動喫煙があった場所 ウ 学校（過去の調査との比較・性別）



※平成23年度調査では、この質問をしていない。

※平成29年度は、回答条件が異なる（受動喫煙の機会があった方のみ回答した）ため、参考情報とする。

エ 飲食店

全体では、「ほぼ毎日」は0.5%となっており、「週に数回程度」(2.6%)、「週に1回程度」(5.7%)、「月に1回程度」(17.3%)の4つを合わせた《あった》は、26.2%となっている。(図13-3-13)  
性別にみると、《あった》は男性(30.3%)が女性(22.8%)より7.5ポイント高くなっている。

(図13-3-13)

性・年齢別にみると、《あった》は男女ともに20~29歳で高く、男性が45.3%、女性が47.4%となっている。(図13-3-14)

図13-3-13 受動喫煙があった場所 エ 飲食店 (全体/性別)




図13-3-14 受動喫煙があった場所 エ 飲食店 (性・年齢別)




図13-3-15 受動喫煙があった場所 エ 飲食店（過去の調査との比較）





図13-3-16 受動喫煙があった場所 エ 飲食店（過去の調査との比較・性別）



※平成23年度調査では、この質問をしていない。

※平成29年度は、回答条件が異なる（受動喫煙の機会があった方のみ回答した）ため、参考情報とする。

オ 遊技場（ゲームセンター、パチンコ、競馬など）

全体では、「ほぼ毎日」は0.4%となっており、「週に数回程度」（1.5%）、「週に1回程度」（2.2%）、「月に1回程度」（3.9%）の4つを合わせた《あった》は、8.0%となっている。（図13-3-17）性別にみると、《あった》は男性（11.8%）が女性（4.8%）より7.0ポイント高くなっている。

（図13-3-17）

性・年齢別にみると、《あった》は男女ともに20～29歳で高く、男性が27.9%、女性が12.8%となっている。また、いずれの年齢でも男性が女性より高い傾向がみられた。（図13-3-18）

図13-3-17 受動喫煙があった場所 オ 遊技場（全体／性別）




図13-3-18 受動喫煙があった場所 オ 遊技場（性・年齢別）




図13-3-19 受動喫煙があった場所 オ 遊技場（過去の調査との比較）





図13-3-20 受動喫煙があった場所 オ 遊技場（過去の調査との比較・性別）



※平成23年度調査では、この質問をしていない。

※平成29年度は、回答条件が異なる（受動喫煙の機会があった方のみ回答した）ため、参考情報とする。

カ 行政機関（市役所、役場など）

全体では、「ほぼ毎日」は0.1%となっており、「週に数回程度」（0.1%）、「週に1回程度」（0.2%）、「月に1回程度」（1.0%）の4つを合わせた《あった》は、1.4%となっている。（図13-3-21）性別にみると、《あった》は男性で1.9%、女性で1.1%となり、大きな差はみられない。

（図13-3-21）

性・年齢別にみると、《あった》は男性の50～59歳（2.7%）で最も高いが、男女いずれの年齢でも非常に低い割合となっている。「その場所に行かなかった」は男女ともに15～19歳で高く、6割半ばとなっている。（図13-3-22）

図13-3-21 受動喫煙があった場所 カ 行政機関（全体／性別）




図13-3-22 受動喫煙があった場所 カ 行政機関（性・年齢別）




図13-3-23 受動喫煙があった場所 カ 行政機関（過去の調査との比較）





図13-3-24 受動喫煙があった場所 カ 行政機関（過去の調査との比較・性別）



※平成23年度調査では、この質問をしていない。

※平成29年度は、回答条件が異なる（受動喫煙の機会があった方のみ回答した）ため、参考情報とする。

## キ 医療機関

全体では、「ほぼ毎日」は0.1%となっており、「週に数回程度」(0.2%)、「週に1回程度」(0.2%)、「月に1回程度」(1.7%)の4つを合わせた《あった》は、2.1%となっている。(図13-3-25)  
性別にみると、《あった》は男性で2.5%、女性で1.8%となり、大きな差はみられない。

(図13-3-25)

性・年齢別にみると、《あった》は女性の20~29歳(3.4%)で最も高いが、男女いずれの年齢でも非常に低い割合となっている。「その場所に行ったが全くなかった」は女性の30~49歳で6割を超え、高くなっている。(図13-3-26)

図13-3-25 受動喫煙があった場所 キ 医療機関 (全体/性別)




図13-3-26 受動喫煙があった場所 キ 医療機関 (性・年齢別)






図13-3-27 受動喫煙があった場所 キ 医療機関（過去の調査との比較）





図13-3-28 受動喫煙があった場所 キ 医療機関（過去の調査との比較・性別）



※平成23年度調査では、この質問をしていない。

※平成29年度は、回答条件が異なる（受動喫煙の機会があった方のみ回答した）ため、参考情報とする。

ク 公共交通機関

全体では、「ほぼ毎日」は0.5%となっており、「週に数回程度」(1.2%)、「週に1回程度」(1.7%)、「月に1回程度」(4.5%)の4つを合わせた《あった》は、7.9%となっている。(図13-3-29)  
性別にみると、《あった》は男性で7.8%、女性で8.0%となり、大きな差はみられない。

(図13-3-29)

性・年齢別にみると、《あった》は男女ともに15~19歳で高く、男性が(23.6%)、女性が(18.8%)となっている。「その場所に行ったが全くなかった」は、女性の15~19歳(61.2%)で唯一6割を超えて、最も高くなっている。(図13-3-30)

図13-3-29 受動喫煙があった場所 ク 公共交通機関 (全体/性別)




図13-3-30 受動喫煙があった場所 ク 公共交通機関 (性・年齢別)




図13-3-31 受動喫煙があった場所 ク 公共交通機関（過去の調査との比較）





図13-3-32 受動喫煙があった場所 ク 公共交通機関（過去の調査との比較・性別）



※平成23年度調査では、この質問をしていない。

※平成29年度は、回答条件が異なる（受動喫煙の機会があった方のみ回答した）ため、参考情報とする。

## ケ 路上

全体では、「ほぼ毎日」は2.5%となっており、「週に数回程度」(6.6%)、「週に1回程度」(8.3%)、「月に1回程度」(12.9%)の4つを合わせた《あった》は、30.2%となっている。(図13-3-33)  
性別にみると、《あった》は男性で31.5%、女性で29.1%となり、大きな差はみられない。

(図13-3-33)

性・年齢別にみると、《あった》は男性では30~39歳(48.5%)、女性では15~19歳(62.4%)で最も高くなっている。また、女性では年齢が低くなるほど、割合が高い傾向がみられる。

(図13-3-34)

図13-3-33 受動喫煙があった場所 ケ 路上 (全体/性別)





図13-3-34 受動喫煙があった場所 ケ 路上 (性・年齢別)



コ 子供が利用する屋外の空間

全体では、「ほぼ毎日」は0.6%となっており、「週に数回程度」(1.5%)、「週に1回程度」(1.8%)、「月に1回程度」(3.2%)の4つを合わせた《あった》は、7.1%となっている。(図13-3-35)  
性別にみると、《あった》は男性で6.4%、女性で7.7%となり、大きな差はみられない。

(図13-3-35)

性・年齢別にみると、《あった》は男性では15~19歳(21.2%)、女性では30~39歳(20.3%)で最も高くなっている。(図13-3-36)

図13-3-35 受動喫煙があった場所 コ 子供が利用する屋外の空間 (全体/性別)





図13-3-36 受動喫煙があった場所 コ 子供が利用する屋外の空間 (性・年齢別)



(4) 原則屋内禁煙の認知度

問47 あなたは、望まない受動喫煙の防止を目的として、飲食店や職場等において、原則屋内禁煙となることを知っていますか。(○はひとつ)  
 ※ 健康増進法の改正により、学校・行政機関・医療機関等は令和元年7月1日から原則敷地内禁煙、職場・飲食店・遊技場・公共交通機関等は令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務化されます。

全体では、「知っている」が71.8%、「知らない」が24.8%となっている。(図13-4-1)  
 性別にみると、「知っている」では男性(75.3%)が女性(69.0%)より6.3ポイント高くなっている。(図13-4-1)  
 性・年齢別にみると、「知っている」は男性30~39歳で80.1%、男性60~69歳で77.6%と高くなっている。(図13-4-2)

図13-4-1 原則屋内禁煙の認知度(全体/性別)




図13-4-2 原則屋内禁煙の認知度(性・年齢別)

