

あわつと感染症情報(2026-38)

千葉県安房保健所発
2026年9月25日配信

☆今週のトピックス☆

安房管内で「日本紅斑熱」の発生届が増えています！

第38週の届出数は6件であり、引き続き日本紅斑熱の動向に注意が必要です。

日本紅斑熱は、日本紅斑熱リケッチアを保有するマダニに刺されることで感染するダニ媒介感染症です。マダニに刺されてから、2日から8日程度の潜伏期間を経て発症します。

主な症状は、発熱、発疹、マダニの刺し口にできる痂皮です。

診断が遅れると、重症化することがあるため注意が必要とされています。



予防

肌の露出が
少ない服装忌避剤、
防虫スプレーの
使用帰宅したら
着替えて洗濯帰宅したら体を
洗いましょう<参考>・日本紅斑熱について(千葉県) <https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/eiseikenkyuu/virus/madani.html>

☆安房管内の感染症発生状況☆

激増	増加	増減なし	減少

感染症名		定点医療機関当たりの 報告数 (人)		前週との比較	
		第38週	第37週		
新型コロナウイルス感染症	安房	0.00	0.50	減少	
	千葉県	2.83	1.98	増加	
<参考>・新型コロナウイルス感染症について(千葉県) https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/covid19-chiba-index.html					
インフルエンザ	安房	2.33	2.83	減少	
	千葉県	14.36	8.63	増加	
<参考>インフルエンザから身を守る(千葉県) https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/influenza/influenza-yobou.html インフルエンザ注意報の発令について(千葉県) https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/press/2026/influ-chuiho2026.html					



感染症名		定点医療機関当たりの 報告数 (人)		前週との比較	
		第38週	第37週		
手足口病	安房	0.50	0.25	増加	
	千葉県	1.65	1.56	増加	
<参考>・手足口病(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html ・手足口病の流行について(千葉県) https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/press/2026/handfootmouth-disease.html					

感染症名		定点医療機関当たりの 報告数 (人)		前週との比較	
		第38週	第37週		
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	安房	3.25	1.00	増加	
	千葉県	1.76	1.37	増加	
<参考>・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-17.html					
伝染性紅斑	安房	0.75	0.00	増加	
	千葉県	0.10	0.02	増加	
<参考>・伝染性紅斑(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/fifth_disease.html					

❀ 安 房 管 内 の 全 数 届 出 疾 患 ❀

全ての医師の方は、対象の感染症の診断を行った際に、最寄りの保健所に届け出る必要があります。

<2 類感染症>

★結核 1件

結核とは、結核菌を出している人のせきやくしゃみなどの「しぶき」と一緒に、結核菌が空気中に飛び散り、それを周りの人が直接吸い込むことで人から人にうつります。

結核に感染しても、すべての人が発病するわけではありません。発病するのは、感染した人の 1～2 割といわれています。持病などで免疫力が低下している場合などは、発病しやすくなります。

発病すると、結核菌が体の中で増殖し、せき、たん、発熱などの症状が現れます。

<参考>

・結核について(結核予防会) https://www.jatahq.org/about_tb/

・結核(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index.html

<4類感染症>

★日本紅斑熱 6件

日本紅斑熱リケッチアを保有するマダニに刺されることで感染するダニ媒介感染症です。

マダニに刺されてから、2日から8日程度の潜伏期間を経て発症します。主な症状は、発熱、発疹、マダニの刺し口にできる痂皮です。診断が遅れると、重症化することがあるため注意が必要とされています。

<参考>・日本紅斑熱について(千葉県) <https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/eiseikenkyuu/virus/madani.html>

【配信元】

千葉県安房保健所(安房健康福祉センター)

あわつと感染症情報

awat-news@mz.pref.chiba.lg.jp