

あわつと感染症情報(2026-39)

千葉県安房保健所発
2026年10月2日配信

☆今週のトピックス☆


千葉県で「インフルエンザ注意報」が発令されました！

千葉県では、2026年第38週(9月14日から9月20日)におけるインフルエンザ定点当たり患者報告数が **14.36人** となり、国が定める注意報基準値(10)を超えたため、インフルエンザの予防対策を更に徹底いただくことを目的に、「**インフルエンザ注意報**」を発令しました。

インフルエンザは、突然の高熱、頭痛、関節痛など、普通の風邪に比べて全身症状が強く、気管支炎や肺炎などを合併し重症化することがあるため、体力のない高齢者や乳幼児などは、特に注意が必要です。

インフルエンザの予防のため、**手洗い**や**咳エチケット**の励行に努めましょう。また、重症化を防ぐため、**予防接種を受ける**ことも検討しましょう。

図：千葉県の流行シーズン別インフルエンザ定点当たり患者報告数



<参考>・インフルエンザ注意報の発令について(令和8年9月25日)(千葉県)

<https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/press/2026/influ-chuiho2026.html>・インフルエンザから身を守る(千葉県) <https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/influenza/influenza-yobou.html>

☆安房管内の感染症発生状況☆

激増	増加	増減なし	減少
😡	😞	😐	😊

感染症名		定点医療機関当たりの報告数(人)		前週との比較	
		第39週	第38週		
新型コロナウイルス感染症	安房	1.17	0.00	増加	😞
	千葉県	1.35	2.83	減少	😊

<参考>・新型コロナウイルス感染症について(千葉県) <https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/covid19-chiba-index.html>

感染症名		定点医療機関当たりの 報告数 (人)		前週との比較	
		第39週	第38週		
インフルエンザ	安房	2.17	2.33	減少	😊
	千葉県	9.76	14.21	減少	😊

<参考>インフルエンザから身を守ろう(千葉県) <https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/influenza/influenza-yobou.html>
 インフルエンザ注意報の発令について(千葉県) <https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/press/2026/influ-chuiho2026.html>

手足口病	安房	0.00	0.50	減少	😊
	千葉県	1.05	1.65	減少	😊

<参考>・手足口病(厚生労働省) <https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html>
 ・手足口病の流行について(千葉県) <https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/press/2026/handfootmouth-disease.html>

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	安房	0.50	3.25	減少	😊
	千葉県	0.90	1.76	減少	😊

<参考>・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(厚生労働省) <https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-17.html>

❀ 安房管内の全数届出疾患 ❀

全ての医師の方は、対象の感染症の診断を行った際に、最寄りの保健所に届け出る必要があります。

<2 類感染症>

★結核 1件

結核とは、結核菌を出している人のせきやくしゃみなどの「しぶき」と一緒に、結核菌が空気中に飛び散り、それを周りの人が直接吸い込むことで人から人にうつります。

結核に感染しても、すべての人が発病するわけではありません。発病するのは、感染した人の1～2割といわれています。持病などで免疫力が低下している場合などは、発病しやすくなります。

発病すると、結核菌が体の中で増殖し、せき、たん、発熱などの症状が現れます。

<参考>

・結核について(結核予防会) https://www.jatahq.org/about_tb/

・結核(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index.html

<4類感染症>

★日本紅斑熱 4件

日本紅斑熱リケッチアを保有するマダニに刺されることで感染するダニ媒介感染症です。

マダニに刺されてから、2日から8日程度の潜伏期間を経て発症します。主な症状は、発熱、発疹、マダニの刺し口にできる痂皮です。診断が遅れると、重症化することがあるため注意が必要とされています。

<参考>・日本紅斑熱について(千葉県) <https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/eiseikenkyuu/virus/madani.html>

【配信元】

千葉県安房保健所(安房健康福祉センター)

あわつと感染症情報

awat-news@mz.pref.chiba.lg.jp