

家畜衛生だより

令和7年度第22号（鶏）令和7年11月発行



南部家畜防疫協議会
(公社)千葉県畜産協会
千葉県南部家畜保健衛生所
〒296-0033 鴨川市八色52
電話 04(7092)2304
FAX 04(7092)1434



北海道、新潟県の農場で 高病原性鳥インフルエンザ発生！(国内家きん2、3例目)

【2例目】

所在地：北海道恵庭市

飼養状況：約23.6万羽（採卵鶏）

経緯：

11月1日(土)

北海道恵庭市の農場から通報を受け、
県が立入検査を実施。簡易検査で陽性
を確認。

11月2日(日)

遺伝子検査の結果、高病原性鳥イン
フルエンザの疑似患畜であることを確認

【3例目】

所在地：新潟県胎内市

飼養状況：約63万羽（採卵鶏）

経緯：

11月3日(月)

新潟県胎内市の農場から通報を受け、
県が立入検査を実施。簡易検査で陽性
を確認。

11月4日(火)

遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフ
ルエンザの疑似患畜であることを確認



衛生管理・防疫対策を徹底し、農場を鳥インフルエンザから守りましょう！！

- 卫生管理区域に立ちに入る者の手指消毒等
- 卫生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- 卫生管理区域に立ちに入る車両の消毒等
- 家きん舎に立ちに入る者の手指消毒等
- 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
- 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
- ねずみ及び害虫の駆除

千葉県南部家畜保健衛生所 TEL 04-7092-2304 FAX 04-7092-1434

※急性悪性家畜伝染病（高病原性鳥インフルエンザ等）の早期対応のため、疑わしい症状があれば速やかに連絡してください。
※夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください。

塵埃侵入防止対策を徹底しましょ！

昨シーズンでは、乾燥し塵埃が舞いやすい環境下において換気をした後に入気口周辺に死亡鶏が分布していた事例が見られました。

鶏舎への塵埃侵入防止対策も、農場の「隙」を埋める対策として重要と考えられます。

【塵埃対策例】

□ 入気口フィルターの設置

□ 乾燥環境下の鶏舎及び、ドアの開閉時、空気が強く吸い込まれる場所(前室や外に面したドア付近等)への散水・消毒



↑入気口フィルター



↑細霧装置

高病原性鳥インフルエンザの症状

疑わしい症状は直ちに通報を！



チアノーゼ・うずくまり



同一鶏舎内での死亡



脚部皮下の出血

○死亡率の急激な上昇
(通常の2倍以上)

○鳥インフルエンザを疑う症状
(チアノーゼ、沈うつ、産卵率低下、うずくまり)
を発見した場合は、
直ちに家畜保健衛生所まで
御連絡下さい！