

家畜衛生だより

令和7年度第29号（鶏） 令和7年12月発行



南部家畜防疫協議会
(公社)千葉県畜産協会
千葉県南部家畜保健衛生所
〒296-0033 鴨川市八色52
電話 04(7092)2304
FAX 04(7092)1434



岡山県の採卵鶏農場で 高病原性鳥インフルエンザ発生！(国内家きん8例目)

【所在地】岡山県津山市

【飼養状況】約43万羽(採卵鶏)

【経緯】

(1)12月19日(金)

当該農場からの通報を受け、県が立ち入り検査を実施。簡易検査で陽性を確認。


(2)12月20日(土)

遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。

(3)12月22日(月)現在

殺処分を継続中。

殺処分鶏等の焼却を開始。



(野鳥発生状況:令和7年12月18日時点)
(家きん発生状況:令和7年12月22日時点)

衛生管理・防疫対策を徹底し、農場を鳥インフルエンザから守りましょう！！

- 卫生管理区域に立ちに入る者の手指消毒等
- 卫生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- 卫生管理区域に立ちに入る車両の消毒等
- 家きん舎に立ちに入る者の手指消毒等
- 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
- 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
- ねずみ及び害虫の駆除

千葉県南部家畜保健衛生所 TEL 04-7092-2304 FAX 04-7092-1434

※急性悪性家畜伝染病（高病原性鳥インフルエンザ等）の早期対応のため、疑わしい症状があれば速やかに連絡してください。
※夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください。

正しく消毒できていますか？ ～消石灰～

消石灰は家きん舎周囲及び農場外縁部に散布しましょう。

【散布量目安】

- ・日常
→床面が白くなるように
十分に散布
- ・伝染病発生時
→1m²あたり1kgを目安に
均一に散布



【効果】

- ・水を加えると**強アルカリ**になり、病原体が死滅する。
- ・屋外の土壤上など、**周りに水分がある環境下**では待ち受け消毒として効果が出る。 ※1、2
- ・野生動物の忌避効果がある。 ※3

※1 乾燥したコンクリート上への散布時は**消石灰1袋(20kg)に3~4Lの水**を散布すると効果的です。

※2 消毒したい対象に含まれる水分量で作用時間が変化します。

※3 長期間は作用しないため、侵入防止の柵や、防鳥ネットの設置等別途野生動物対策を適切に行う必要があります。

【注意】

- ・粉の状態では**強アルカリ**ではないため、**瞬時に病原体を殺滅できない**。

石灰帯を車や長靴で通過することにより消毒効果を得る為には、
あらかじめ消毒槽や水でタイヤや長靴を濡らし

消石灰と水を接触させましょう！

- ・**雨で濡れたり、野外散布後、長期間放置**すると炭酸カルシウムに変化し、殺菌効果が減弱する。

野生動物侵入対策の徹底をお願いします！

- ・野生動物を誘因するような環境が農場内にある場合は、早急に対策を！
餌こぼれ 実のなる樹木 水場 廃棄卵の放置 など
- ・野生動物が家きん舎に入れない環境づくりの徹底を！
防鳥ネットの設置
バーコンシャッター、除糞ベルトの蓋などの隙間対策