令和６年度第４０号（２月）発行

衛生だより

東部・北部家畜防疫獣医師会
（公社）千葉県畜産協会
千葉県東部家畜保健衛生所
電話　０４７５（５２）４１０１
ＦＡＸ　０４７５（５２）３３３５
http://www.pref.chiba.lg.jp/kh-toubu/index.html

地域でランピースキン病を流行させないために
春先に向け、吸血昆虫対策（特にサシバエ対策）を!

①卵・幼虫・さなぎの対策

サシバエはさなぎの状態で越冬します！

対策として堆肥の適切な発酵処理による殺虫、牛舎の隙間等への昆虫成長制御剤の散布等が有効です。

②成虫の対策

春先の比較的涼しい時期に活動が活発化します！

対策として防虫ネットやハエ取り紙の設置、牛舎周辺の草刈り等が有効です。

※特に寒い時期は温かい車内へサシバエ等が集まりやすいので対策が必要と考えられます（車両がウイルスを運ばないために）。

※対策の詳細は、別紙リーフレットを参照してください※



まん延防止に向けて

□定期的に観察し、本病を疑う場合は速やかに隔離して獣医師又は家保に連絡
□殺虫剤散布、粘着シート設置等により吸血昆虫対策を行う
□他の畜産施設で使用した器具は原則として農場内に持ち込まない
□血液を介しての感染防止のため、注射針、人工授精用器具その他体液（生乳を除く。）が付着する物品の１頭ごとの交換及び消毒

「畜産の2024年問題」

畜産業界においても他品目に比べ飼料輸送で人材不足等の声があります。
飼料運搬が効率的に・安全に・適切に行えるように以下の取組をお願いします。
①飼料関係設備の効率化・安全確保　例：ストックポイント活用、残量センサー導入
②附帯業務の再検討→契約外の作業をお願いをする際は今一度検討を。

飼料の安定供給維持のために、皆様のより一層のご協力をお願いします！

東部家畜保健衛生所　　Tel.0475-52-4101

※夜間・休日は転送されますので、必ず５回以上コールしてください

春先に向けたサシバエ対策で牛を病気・ストレスから守りましょう！

農林水産省
九州農政局

はて？冬季のサシバエ対策？春・秋よりサシバエ見ないけど・・・

成虫がいる＝幼虫はもっと潜んでいる



目に見える
成虫20%

発生源
80%
成虫は氷山の一角！

温度とサシバエが卵から成虫になるまでの発育日数の関係



冬季は気温が低いので、発育速度が遅い！
幼虫対策をすれば、殺虫剤を撒く回数も減少！

九州の冬季サシバエ対策は、寒いうちから！

スタートが遅れると、ハエの数は爆発的に増加します・・・

1．幼虫対策は、堆肥等の管理とIGR剤の散布！

堆肥の切り返しは
隅々まで！

牛舎隅など牛が踏まない・糞の取り残しがある場所、
カーフペンなど子牛のいる牛床にIGR剤を散布！

つなぎ牛舎は
バーンクリーナーへ散布！

2．成虫対策は、防虫ネットや殺虫剤ローテーションで！

地面や床から２ｍは防虫ネットで
覆えるようにしましょう！
隙間や穴がないか確認を！

殺虫剤は
サシバエが飛ぶより
上を狙って噴霧！



殺虫剤はローテーションを！
噴霧量が十分か確認！

3．対策は地域ぐるみで！関係業者もご一緒に！

写真協力：鹿児島県内酪農家、（独）家畜改良センター宮崎牧場、住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社、エランコジャパン株式会社

裏面もチェック

サシバエ対策、ここをチェック！

農林水産省
九州農政局

1 堆肥・敷料・残餌はしっかり管理できている！

・切り返し等により堆肥発酵時の中心温度が65度になることを確認
・牛床は清潔に保たれ、汚れた敷料や残餌は片付いている

はい → すばらしい！

いいえ ↓

IGR剤を撒き、幼虫対策をしている！

・バーンスクレーパーが通る前にバーンクリーナーに散布
・牛の踏まない所を中心に散布（特に牛舎隅など）

はい → その調子！

いいえ ↓

サシバエ幼虫は、堆肥等の管理＋IGR剤で限りなく減らそう

サシバエの成虫１匹は、生涯600個もの卵を産む。**冬の成虫１匹は来シーズンの１万匹に相当すると言われるほど、冬季対策が重要**。サシバエの活動が低下している冬季だからこそ、地域ぐるみで幼虫対策をしましょう！



2 牛舎内でハエ成虫をほぼ見ない

はい → みんなのお手本！

いいえ ↓

サシバエ成虫を、牛舎内で見かけたら、対策徹底！

サシバエは農場内でも発生するし、他所からも飛んだり運ばれたりしてやってくる。地域ぐるみでの対策が重要。サシバエの持ち出しや持ち込みがないよう農場出入り業者にも**車内の殺虫を**お願いしましょう。

サシバエ成虫対策 ３つのポイント

１．殺虫剤は ローテーション

同じ殺虫剤を連用していると、生き延びたサシバエが耐性を持つことがある。
殺虫剤が効きにくくなる前に、**系統が異なる殺虫剤とローテーションで回していこう**。
十分な濃度・噴霧量で散布しているかも要チェック。

２．防虫ネットの設置

地面から2mの高さまで床から天井に向けて設置。**穴が開いてないか**定期的にチェック。

３．下草刈りゃ防草シートの設置

サシバエが日中休息する**牛舎周辺の下草を刈ろう**。**防草シート設置も効果的**。

問合せ先：千葉県東部家畜保健衛生所　0475-52-4101

令和６年度号外

衛生だより

東部・北部家畜防疫獣医師会
（公社）千葉県畜産協会
千葉県東部家畜保健衛生所
電話　０４７５（５２）４１０１
ＦＡＸ　０４７５（５２）３３３５
http://www.pref.chiba.lg.jp/kh-toubu/index.html

東部家畜保健衛生所が移転します！（4月1日以降）

移転先の住所（4月1日以降）

住所　〒289-3182　匝瑳市今泉7142
TEL　0479-85-8900
FAX　0479-85-5932

注:4月1日以降はこちらへ

※3月31日以前にこちらへ連絡（郵送等）された場合、対応できないため、お間違いないようご注意ください！

【現在】

現在の住所（3月31日以前）

【こちらへ】

住所　〒283-0064　東金市川場1105-3
TEL　0475-52-4101
FAX　0475-52-3335

注:3月31日以前はこちらへ

※4月1日以降にこちらへ連絡（郵送等）された場合、対応できないため、お間違いないようご注意ください！

【イメージ】移転のタイミングにご注意ください！（4月1日移転）



※移転日は約1か月後の2025年4月1日です。移転までにまだ時間があるため連絡先等にご注意ください。

東部家畜保健衛生所　Tel.0475-52-4101
※夜間・休日は転送されますので、必ず５回以上コールしてください