

令和3年8月18日

千葉県農林総合研究センター長

## I 向こう1か月の予報

発生量及び発生時期は平年との比較で表す。予想発生量は「多」「やや多」「並」「やや少」「少」で表している。また、予報の根拠の(+)は多発要因、(-)は少発要因であることを示す。並〔発生なし〕は平年並で、今年発生がないことを示す。

なお、「並」とは平年値を中心にして40%の度数に入る幅、「やや多」「やや少」は「並」の外側20%の度数に入る幅、「多」「少」は上記3者の外側10%の度数に入る幅である。

作物名	病害虫名	予想発生量	予報の根拠	防除上の注意事項
イネ	いもち病 (穂いもち)	多	7月下旬発生量：多(+) 気象予報：気温高(-) 降水量並	
	紋枯病	やや多	7月下旬発生量：やや多(+) 気象予報：気温高(+) 降水量並	
	ごま葉枯病	並	7月下旬発生量：並 気象予報：気温高(+)	・ 発生が多い場合は、収穫前使用日数に注意して薬剤防除する。
	大型のカ メムシ類	やや多	7月下旬発生量：やや多(+) 気象予報：気温高(+) 降水量並	・ 多発ほ場では、収穫前使用日数に注意して薬剤防除する。 ・ <u>令和3年度病害虫発生予報第4号P7「これから注意を要する病害虫」も参考にする。</u>
	カスミカ メムシ類 (アカヒ ゲホソミ ドリカス ミカメと アカスジ カスミカ メ)	少	7月下旬発生量：少(-) 気象予報：気温高(+) 降水量並	

作物名	病害虫名	予想発生量	予報の根拠	防除上の注意事項
サツマイモ	ナカジロシタバ	並	8月上旬発生量：やや少（－） 気象予報：気温高（＋） 降水量並	<ul style="list-style-type: none"> <li>早期発見に努め、多発ほ場では収穫前使用日数に注意して薬剤防除する。</li> </ul>
	イモキバガ（イモコガ）	並	8月上旬発生量：やや少（－） 気象予報：気温高（＋） 降水量並	
ラッカセイ	褐斑病	並	8月上旬発生量：並 気象予報：気温高（－） 降水量並	<ul style="list-style-type: none"> <li>収穫前使用日数に注意して薬剤防除する。</li> </ul>
秋冬ネギ	白絹病	並	8月上旬発生量：並[発生なし] 気象予報：気温高（＋） 降水量並	<ul style="list-style-type: none"> <li>発生初期から薬剤防除する。</li> </ul>
	ネギアザミウマ	並	8月上旬発生量：並 気象予報：気温高（＋） 降水量並	<ul style="list-style-type: none"> <li>多発ほ場では、防除効果の持続性が期待できる粒剤の土壌処理と併せて、即効性が期待できる薬剤の地上部処理などにより、防除する。</li> </ul>
	ネギハモグリバエ	並	8月上旬発生量：やや少（－） 気象予報：気温高（＋） 降水量並	
サトイモ	アブラムシ類	やや少	8月上旬発生量：少（－） 気象予報：気温高（＋）	<ul style="list-style-type: none"> <li>葉裏に発生が多いので、薬剤散布は、葉裏にも十分かかるよう丁寧に行う。</li> </ul>
	ハダニ類	並	8月上旬発生量：並 気象予報：気温高（＋）	
野菜共通	ハスモンヨトウ	並	8月上旬発生量 サツマイモ：並[発生なし] 夏秋トマト：並[発生なし] 秋冬ネギ：並[発生なし] サトイモ：並[発生なし] 7月フェロモントラップ誘殺数 ：やや少（－） 気象予報：気温高（＋） 降水量並	<ul style="list-style-type: none"> <li>早期発見に努め、卵塊及び集団状態の幼虫を捕殺する。</li> <li>幼虫が大きくなると薬効が低下するので、幼虫が分散する前の若齢期に薬剤防除する。</li> </ul>

作物名	病害虫名	予想発生量	予報の根拠	防除上の注意事項
ナシ	シンクイムシ類	やや多	7月下旬被害果率 : やや多 (+) 7月フェロモントラップ誘殺数 : 多 (+) 気象予報: 気温高 (+)	<ul style="list-style-type: none"> <li>収穫時期を迎えているので、収穫前使用日数に注意して薬剤防除する。</li> </ul>
	ハマキムシ類	並	7月下旬 被害葉率: やや少 (-) 被害果率: 多 (+) 7月フェロモントラップ誘殺数 : 並 気象予報: 気温高 (+)	
	ハダニ類	やや少	7月下旬発生量: やや少 (-) 気象予報: 気温高 (+) 降水量並	
温州ミカン	ミカンハダニ	やや少	7月下旬発生量: やや少 (-) 気象予報: 気温高 (-) 降水量並	<ul style="list-style-type: none"> <li>8月以降の発生は果実にも寄生し、外観品質を損なうので園内を見回り発生に注意する。</li> </ul>
果樹共通	カメムシ類	やや少	7月下旬発生量 ナシ : やや少 (-) カンキツ: 並[発生なし] 7月予察灯誘殺数 : 並 7月フェロモントラップ誘殺数 : やや少 (-) 気象予報: 気温高 (+)	<ul style="list-style-type: none"> <li>多目的防災網(9mmクロス)や防虫網(4mm目)などで園全体を被覆する。</li> <li>カメムシ類の発生量は、地域間差が大きいいため、果樹園への飛来状況は地域や園地により大きく異なる。そのため、園内外をこまめに見回り、発生を認めたら、飛来が多い夕方か活動の鈍い早朝に薬剤防除する。</li> <li>薬剤防除する場合は、収穫前使用日数に注意する。</li> </ul>

## II 参考資料

### ○主要病害虫の発生状況

巡回調査結果 (水稲・夏秋トマト・果樹：7月下旬、サツマイモ・ラッカセイ・サトイモ・秋冬ネギ：8月上旬)

作物名 (調査地域)	病害虫名	調査項目	調査結果			備考	
			本年値	平年値	前年値		
イネ (県内全域)	いもち病(穂いもち)	発病穂率(%)	0.15	0.01	0.01		
		紋枯病	発病度	1.29	0.88	3.07	
		縞葉枯病	発病株率(%)	0.00	0.47	0.81	
		ごま葉枯病	発病度	1.69	1.25	0.74	
	イネクロカメムシ フタオビコヤガ イネヨトウ ニカメイガ イチモンジセセリ コブノメイガ	25株当たり寄生成幼虫数	0.03	0.71	0.17		
		25株当たり寄生幼虫蛹数	0.00	0.01	0.00		
		被害株率(%)	0.00	0.01	0.00		
		被害株率(%)	0.00	0.02	0.18		
		25株当たり被害包数	0.00	0.01	0.01		
		上位2葉被害株率(%)	0.00	0.03	0.18		
		セジロウンカ トビイロウンカ ヒメトビウンカ ツマグロヨコバイ コバナイナゴ ササキリ類	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数	0.94	3.91	1.89	
	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数		0.00	0.02	0.14		
	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数		16.28	22.10	11.27		
	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数		15.66	21.13	56.01		
	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数		1.02	2.26	2.02		
	20回振りすくい取り捕獲成幼虫数		1.83	2.38	1.80		
	クモヘリカメムシ ホソハリカメムシ イネカメムシ シラホシカメムシ類 大型のカメムシ類 アカヒゲホソミドリカスミカメ アカスジカスミカメ ミナミアオカメムシ		20回振りすくい取り捕獲成幼虫数	0.47	0.82	0.99	
		20回振りすくい取り捕獲成幼虫数	0.09	0.22	0.14		
		20回振りすくい取り捕獲成幼虫数	1.19	0.14	0.52		
20回振りすくい取り捕獲成幼虫数		0.10	0.04	0.01			
20回振りすくい取り捕獲成幼虫数		1.85	1.23	1.71			
20回振りすくい取り捕獲成幼虫数		0.00	0.11	0.04			
20回振りすくい取り捕獲成幼虫数		0.50	1.15	0.79			
20回振りすくい取り捕獲成幼虫数		0.00	0.01	0.04			
サツマイモ (印旛、香取)		ナカジロシタバ	寄生幼虫数	0.00	0.40	2.00	
	イモキバガ	寄生幼虫数	0.40	0.85	1.40		
	ハスモンヨトウ	寄生幼虫数	0.00	0.00	0.00		
ラッカセイ (千葉、君津)	そうか病	発病度	0.00	0.00	0.00		
	褐斑病	発病度	11.70	11.02	14.50		
	黒渋病	発病度	0.00	0.09	0.00		
	白絹病	発病株率(%)	0.00	0.65	0.00		
サトイモ (印旛、香取、君津)	汚斑病	発病葉率(%)	1.00	1.38	9.66		
	アブラムシ類	成幼虫寄生程度	8.87	16.53	16.97		
	ハスモンヨトウ	幼虫寄生株率(%)	0.00	0.08	0.00		
	ハダニ類	雌成虫寄生程度	11.72	14.70	1.64		
秋冬ネギ (長生、山武)	黒斑病	発病度	0.10	2.07	0.40		
	さび病	発病度	0.10	0.18	0.13		
	白絹病	発病株率	0.00	0.04	0.00		
	ネギアザミウマ	被害度	18.80	25.10	7.63		
	ハスモンヨトウ	被害株率(%)	0.00	0.04	0.00		
	シロイチモジヨトウ	被害株率(%)	0.00	0.00	0.00		
	ネギコガ	被害株率(%)	0.40	0.16	0.80		
	ネギハモグリバエ	被害度	0.70	3.51	0.50		
夏秋トマト(印旛)	タバコガ類	被害株率(%)	0.00	0.08	0.00		
	ハスモンヨトウ	幼虫寄生株率(%)	0.00	0.00	0.00		

作物名 (調査地域)	病害虫名	調査項目	調査結果			備考
			本年値	平年値	前年値	
ナシ (県内全域)	黒星病	発病葉率 (%)	0.76	1.90	1.74	サビ症状
	シンクイムシ類	被害果率 (%)	0.03	0.01	0.00	
	ハマキムシ類	被害葉率 (%)	0.00	0.07	0.03	
	ハマキムシ類	被害果率 (%)	0.12	0.01	0.00	
	ハダニ類	雌成虫寄生葉率 (%)	0.00	0.54	0.00	
	アブラムシ類	成幼虫寄生新梢率 (%)	1.21	2.42	1.11	
	ニセナシサビダニ	成若虫被害新梢率 (%)	0.00	1.07	0.03	
	カメムシ類	被害果率 (%)	0.00	0.05	0.11	
温州ミカン (安房)	そうか病	果実発病度	0.84	0.31	1.32	
	かいよう病	果実発病度	0.00	0.00	0.00	
	黒点病	果実発病度	0.00	0.03	0.00	
	カメムシ類	被害果率 (%)	0.00	0.02	0.00	
	ヤノネカイガラムシ	成幼虫寄生葉率 (%)	0.00	0.00	0.00	
	ミカンハダニ	雌成虫寄生葉率 (%)	0.20	12.94	0.20	
	アブラムシ類	成幼虫寄生新梢率 (%)	0.00	0.50	0.00	
	ミカンハモグリガ	幼虫寄生葉率 (%)	0.00	0.36	0.00	

トラップ月間誘殺数 (7月) \*種類別の単位の違いに注意

区分	調査害虫名	トラップ設置場所	誘殺数			備考
			本年値	平年値	前年値	
水稻予察灯	イネミズゾウムシ	千葉、香取、安房	174.0	91.9	153.0	頭/月
	セジロウンカ	〃	1.3	7.5	0.7	
	トビイロウンカ	〃	1.0	0.1	0.0	
	ヒメトビウンカ	〃	5.0	8.1	3.0	
	ツマグロヨコバイ	〃	17.7	199.8	233.3	
	フタオビコヤガ	〃	4.7	27.7	18.3	
	イネヨトウ	〃	7.3	4.6	1.0	
	ニカメイガ	〃	0.7	2.1	3.3	
	コブノメイガ	〃	0.0	0.0	0.0	
	イネクロカメムシ	〃	3.0	11.8	9.7	
	クモヘリカメムシ	〃	3.0	1.5	1.3	
	ホソハリカメムシ	〃	1.0	0.9	1.0	
	イネカメムシ	〃	57.0	13.0	19.3	
	アカヒゲホソミドリカスミカメ	〃	7.3	48.2	1.7	
	アカスジカスミカメ	〃	40.7	167.6	35.3	
ミナミアオカメムシ	〃	3.7	3.3	4.0		
(果樹等カメムシ類)	チャバネアオカメムシ	〃	2.0	4.8	2.7	頭/月
	クサギカメムシ	〃	0.3	2.0	0.0	
	ツヤアオカメムシ	〃	0.0	0.8	3.0	
	アオクサカメムシ	〃	0.0	1.1	0.3	
	イチモンジカメムシ	〃	1.3	1.5	0.3	
	ホソハリカメムシ	〃	0.0	0.2	0.3	
(コガネムシ類)	アカビロウドコガネ	〃	10.3	32.0	10.7	頭/月
	オオビロウドコガネ	〃	1.3	5.3	2.7	
	ヒメコガネ	〃	1.3	3.2	5.3	
	ドウガネブイブイ	〃	4.3	4.7	3.3	
	オオクロコガネ	〃	5.0	22.9	3.0	
	アオドウガネ	〃	46.3	11.1	25.3	
果樹予察灯	チャバネアオカメムシ	安房	2.0	10.5	5.0	頭/月
	クサギカメムシ	〃	5.0	9.1	2.0	
	ツヤアオカメムシ	〃	2.0	5.9	0.0	
	カメムシ類	〃	9.0	25.5	7.0	
	アオクサカメムシ	〃	0.0	0.0	0.0	
	ミナミアオカメムシ	〃	0.0	0.0	0.0	

区分	調査害虫名	トラップ設置場所	誘殺数			備考
			本年値	平年値	前年値	
性フェロモン	ドウガネブイブイ	印旛、香取	4.9	3.0	3.6	頭/日
	ヒメコガネ	印旛、香取	15.8	13.2	13.7	
	コナガ	海匝	1.6	1.6	1.1	
	ハスモンヨトウ	県内全域	4.6	6.2	9.9	
	シロイチモジヨトウ	県内全域	0.6	0.3	0.2	
	オオタバコガ	県内全域	1.8	1.4	0.7	
	タバコガ	県内全域	0.5	0.9	0.3	
	ナシヒメシンクイ	東葛飾、印旛	2.0	1.1	1.0	
	モモシンクイガ	東葛飾、印旛	0.0	0.0	0.0	
	シンクイムシ類	東葛飾、印旛	2.0	1.1	1.0	
	チャハマキ	東葛飾、印旛	1.1	0.4	0.5	
	チャノコカクモンハマキ	東葛飾、印旛	1.1	1.4	1.1	
	ハマキムシ類	東葛飾、印旛	2.2	1.8	1.7	
	チャバネアオ	チャバネアオカメムシ	県内全域	0.4	28.7	
カメムシ	ツヤアオカメムシ	〃	0.0	0.1	0.1	
集合フェロモン	クサギカメムシ	〃	0.0	0.3	0.1	
	カメムシ類	〃	0.4	29.1	22.0	
	マルボシヒラタヤドリバエ (天敵)	〃	0.0	0.3	0.5	

## ○気象予報

8月12日気象庁発表


関東甲信地方における向こう1か月間の確率(%)

要素	低い・少ない	平年並	高い・多い
気温	10	30	60
降水量	30	30	40
日照時間	40	40	20

出典：気象庁ホームページ

向こう1か月間の各気象要素の平年値  
(8月18日～9月14日)

要素	千葉	銚子	館山
気温(°C)	26.0	24.9	25.8
降水量(mm)	159.3	135.8	149.9
日照時間(hr)	148.9	176.6	173.3



## 農薬は適正に使用しましょう。無登録農薬の使用はできません。

- 農薬は、農薬取締法に基づいて、使用できる農作物の種類、適用病害虫、希釈倍数、収穫前日数、総使用回数などが定められています。
- 登録番号のない薬剤は、農薬として使用できません。登録農薬には必ず登録番号が記載されています(記載例 農林水産省登録第〇〇〇号)。
- 農薬はラベルをよく読んで適正に使用しましょう。
- 飛散しないよう工夫して散布しましょう。
- 農薬を使用したら必ず記帳するようにしましょう。
- タンクやホースは洗いもれがないようきれいに洗っておきましょう。

・病害虫発生予察情報はインターネットでもご覧いただけます。

<https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/boujo/>

・次回の発行予定は9月15日です。なお、注意報等の臨時情報は逐次発行されます。

・薬剤の選定については、最新の農薬登録情報を確認してください。

<https://pesticide.maff.go.jp/>

問い合わせ先

千葉県農林総合研究センター病害虫防除課

〒266-0014 千葉市緑区大金沢町180番地1

TEL 043(291)6077 FAX 043(226)9107

E-mail cafrc-bojo@mz.pref.chiba.lg.jp

