

- 1499 *Syrnola hasimotoi* Nomura, 1937
分布: 日本海(佐渡島・但馬), 相模湾
- 1500 *Syrnola hyalina* (Dunker, 1860)
分布: 太平洋側(33~35° N)
- 1501 *Syrnola kurumana* (Yokoyama, 1927)
分布: 太平洋側(35° N)
- 1502 *Syrnola lischkei* (Dall & Bartsch, 1906)
分布: 太平洋側(29~35° N)
- 1503 *Syrnola longiaperturata* Nomura, 1938
分布: 太平洋側(35° N)
- 1504 *Syrnola mira* (Yokoyama, 1922)
分布: 太平洋側(35° N)
- 1505 *Syrnola modica* (Sowerby II, 1878) ヒメホソクチキレ
分布: 相模湾
- 1506 *Syrnola onagawaensis* Nomura, 1938
分布: 太平洋側(35~39° N)
- 1507 *Syrnola pupina* A. Adams, 1860
分布: 太平洋側(35° N) 日本海(35° N)
- 1508 *Syrnola solidula* (Dunkre, 1860)
分布: 太平洋側(33° ~35° N)
- 1509 *Syrnola taeniata* (A. Adams, 1863)
分布: 太平洋側(26~35° N), 日本海(36° N)
- 1510 *Syrnola take* Nomura, 1938
分布: 太平洋側(35° N)
- 1511 *Syrnola tenuisculpta* (Lischke, 1868-1873)
分布: 太平洋側(35° N) 日本海(35° N)
- 1512 *Syrnola typica* (A. Adams, 1863)
分布: 太平洋側(35° N)
- 1513 *Syrnola vitrea* A. Adams, 1860
分布: 太平洋側(34~35° N), 日本海側(35° N)
- 1514 *Syrnola zona* Nomura, 1937
分布: 太平洋側(35° N)
- 1515 *Syrnola (Costosyrnola) luteomaculosa* Nomura, 1938 イトカケホソクチキレ
分布: 太平洋側(34~35° N)
- 1516 *Iphiana tenuisculpta* (Lischke, 1872) スノメホソクチキレ
分布: 房総半島・但馬沖以南, 四国, 瀬戸内海, 九州北西岸(玄界灘, 博多湾)(水深10~30m, 砂泥底)
- 1517 *Syrnola (Iphiana) lischkei* Dall & Bartsch, 1906 リシケクチキレ
分布: 房総半島・山口県北部以南, 瀬戸内, 四国, 九州(潮間帯~水深30m, 砂泥底)
- 1518 *Syrnola (Iphiana) mira* (Yokoyama, 1922) ミラヌノメクチキレ
タイプ産地: 千葉県市原市市東(化石)
分布: 太平洋側(35° N)
- 1519 *Syrnola (Iphiana) siva* (Yokoyama, 1922) シバヌノメクチキレ
タイプ産地: 千葉県市原市市東(化石)
- 1520 *Tibersyrnola serotina* (A. Adams, 1863) ヤセクチキレ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
分布: 房総半島・但馬沖以南, 瀬戸内, 四国, 九州(潮間帯~水深30m, 砂泥地)
- 1521 *Tibersyrnola cinnamomea* (A. Adams, 1863) コゲチャチビクチキレ
産地: 館山湾(奥谷ら*), 勝浦(大島1993=コゲチャクチキレ), 銚子(櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 三陸沿岸・男鹿半島以南, 瀬戸内海, 四国, 九州北西岸(水深10~140m, 砂泥底)
- 1522 *Puposyrnola terebroides* (Kuroda & Kawamoto in Kawamoto, 1956) タケノコクリムシクチキレ
産地: 銚子(渡辺1988)
分布: 銚子沖以南, 紀伊, 瀬戸内, 四国, 九州(潮間帯~水深30m, 砂泥地)
- 1523 *Puposyrnola inturbida* (Yokoyama, 1927) ウチマキクチキレ
分布: 房総半島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深20m, 砂底)
- 1524 *Agatha virgo* A. Adams, 1860 ミガキクチキレ
産地: 館山湾(村越1998)
分布: 北海道南部・但馬以南, 本州, 四国, 九州西北岸(水深10~30m, 砂泥地)
- 1525 *Bacteridium vittatum* (A. Adams, 1861) イトカゲゴウナ
分布: 房総半島・霧灘~九州, 中国(水深5~20m, 砂泥底)
- 1526 *Ptycheulimella misella* (Yokoyama, 1922) ミカヅキイトカケギリ
タイプ産地: 千葉県印旛郡八生村大竹(化石)
産地: 銚子(櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988)
分布: 銚子沖・山口県北部以南, 瀬戸内海(柳井沖, 周防大島・呉沖・伊予), 四国, 九州(水深10~60m, 砂泥底)
- 1527 *Derjuginella hanagaiensis* (Nomura, 1938) ハデクチキレ
産地: 銚子(渡辺1988)
分布: 銚子沖以北, 北海道(水深10~50m, 砂底); 若狭湾以北, 粟島沖(水深200~300m, 砂底)
- 1528 *Eulimella (Eulimella) hinomotoensis* Nomura, 1938
分布: 太平洋側(35N°)

- 1529 *Eulimella (Ebala) obscura* (Yokoyama, 1922) ウスセトモノクチキレ
 タイプ産地:千葉県原門市市東(化石)
- 1530 *Turbonilla (Ptycheulimella) rikuzenica* Nomura, 1936
 分布:岩手県宮古湾, 塩釜湾, 太平洋側(35~40° N), 日本海側(40~41° N)
- 1531 *Turbonilla (Ptycheulimella) sp.*
 産地:房総半島沖水深507-578m泥底(土田ら1995)
- 1532 *Turbonilla edoensis* Yokoyama, 1927 エドイトカケギリ
 分布:相模湾・山口県北部~九州
- 1533 *Turbonilla multigrata* (Dunker, 1882) シロイトカケギリ
 産地:盤洲沖(飯島ら1999), 館山湾(奥谷ら*), 勝浦, 御宿(大島1993), 銚子(櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988)
 分布:三陸沿岸(宮古湾・大槌湾, 末崎村泊里・気仙沼)・佐渡島・能登半島以南, 銚子沖, 瀬戸内海, 四国, 九州(水深10~150m, 砂泥底)
- 1534 *Turbonilla kidoensis* (Yokoyama, 1922) キドイトカケギリ
 タイプ産地:千葉県東葛飾郡沼南村手賀(化石)
 産地:勝浦(大島1993)
 分布:三陸沿岸(大槌湾)以南, 相模湾(水深10~50m, 砂泥底)
- 1535 *Turbonilla kesennumana* Nomura, 1938 フトイトカケギリ
 産地:館山湾(奥谷ら*・サミグレイトカケギリ)
- 1536 *Turbonilla cura* Nomura, 1937 ウスズミイトカケギリ
 分布:相模湾, 瀬戸内海, 山口県(潮間帯, 岩礁間の砂泥底)
- 1537 *Turbonilla miurana* Nomura, 1937 ミウライトカケギリ
 分布:相模湾
- 1538 *Turbonilla kagamigawana* Nomura, 1938 サザナミイトカケギリ
 タイプ産地:館山湾(鏡ヶ浦)
 産地:館山湾(奥谷ら*・インイトカケギリ)
- 1539 *Turbonilla pseudocura* Nomura, 1938 スイショウイトカケギリ
 産地:館山湾(奥谷ら*)
- 1540 *Turbonilla exilissima* Nomura, 1938
 タイプ産地:千葉県館山市北条
- 1541 *Turbonilla metula* (A. Adams, 1860) カタヒジイトカケギリ
 分布:相模湾, 瀬戸内海西部, 山口県
- 1542 *Turbonilla punicea* Okutani, 1964
 分布:本州中部沖(水深500~800m, 砂底)
- 1543 *Turbonilla hashimotoi* Nomura, 1937 ミダレウネイトカケギリ
 分布:相模湾, 山口県萩市
- 1544 *Turbonilla kanagawana* Nomura, 1938
 分布:相模湾, 若狭湾(水深50~200m)
- 1545 *Turbonilla sagamiana* Yokoyama, 1922 サガミマキミノイトカケギリ
 タイプ産地:千葉県印旛郡大竹(化石)
 分布:三陸沿岸(大槌湾)・佐渡島以南, 瀬戸内海, 四国, 九州(富岡湾)(潮間帯下部~水深60m, 砂泥底)
- 1546 *Turbonilla (Chemnitzia) abseida* Dall & Bartsch, 1906 ナガイトカケギリ
 分布:岩手県気仙沼以南, 相模湾, 瀬戸内海, 四国, 山口県北部, 九州(水深10~60m, 砂泥底)
- 1547 *Turbonilla (Chemnitzia) approximata* Dall & Bartsch, 1906 ニヨリイトカケギリ
 分布:宮古湾以南, 瀬戸内海, 四国, 九州, 山口県北部(水深10~60m, 砂泥底)
- 1548 *Turbonilla (Chemnitzia) immana* Yokoyama, 1922 インバイトカケギリ
 タイプ産地:千葉県印旛郡大竹村(新生代, 化石)
 分布:太平洋側(35~38° N, 潮下部~水深30m)
- 1549 *Turbonilla (Chemnitzia) sematana* Yokoyama, 1922 セマタイトカケギリ
 タイプ産地:千葉県原門市市東(化石)
- 1550 *Turbonilla (Chemnitzia) humilis* Yokoyama, 1922 スジボソイトカケギリ
 タイプ産地:千葉県館山市沼(サンゴ層, 化石)
- 1551 *Turbonilla (Chemnitzia) teganumana* Yokoyama, 1922 テガヌマイトカケギリ
 タイプ産地:千葉県沼南町手賀(化石)
- 1552 *Turbonilla (Pyrgiscus) tateyamensis* Nomura, 1938
 タイプ産地:千葉県安房郡館山(新世代, 化石)
- 1553 *Ptycheulimella misella* Yokoyama, 1922 ミカヅキイトカケギリ
 タイプ産地:千葉県印旛郡八生村大竹(化石)
 産地:銚子(櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988)
 分布:銚子沖・山口県北部以南, 瀬戸内海(柳井沖, 周防大島・呉沖・伊予), 四国, 九州(水深10~60m, 砂泥底)
- 1554 *Turbonilla (Ptycheulimella) rikuzenica* Nomura, 1936
 分布:岩手県宮古湾, 塩釜湾, 太平洋側(35~40° N), 日本海側(40~41° N)
- 1555 *Turbonilla (Ptycheulimella) sp.*
 産地:房総半島沖水深507-578m泥底(土田ら1995)
- 1556 *Turbonilla (Strioturbonilla) pacifica* Yokoyama, 1922 タイヘイヨウイトカケギリ
 タイプ産地:千葉県原門市市東(化石)
 分布:三陸沿岸(宮古湾・末崎村泊里・女川町江ノ島, 鮎川沖)・佐渡島(真野湾)(潮間帯下部~水深30m, 砂泥底)
- 1557 *Pyrgolampros hiradoensis* (Pilsbry, 1904) ホソイトカケギリ
 産地:館山湾(奥谷ら*), 銚子沖(肥後・後藤1993)
 分布:銚子沖・佐渡島以南, 瀬戸内海, 但馬沖, 四国, 九州(水深10~60m, 砂泥底)

- 1558 *Pyrgolampros hiradoensis badia* (Pilsbry, 1904) チャイロホソイトカケギリ
産地: 銚子(櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 銚子沖・但馬沖以南, 瀬戸内海, 四国, 九州(水深10~60m, 砂泥底)
- 1559 *Pyrgolampros fulvizonata* (Nomura, 1938) フタオビイトカケギリ
産地: 銚子(神奈川県博1972; 渡辺1988)
分布: 三陸沿岸(大槌湾)以南, 銚子沖, 志摩半島沖, 瀬戸内海, 九州北西岸, 山口県北部(水深10~100m, 砂泥底)
- 1560 *Pyrgolampros mumia* (A. Adams, 1861) ハブタエイトカケギリ
分布: 房総半島以南, 瀬戸内海, 四国, 九州, 山口県北部(水深10~100m, 砂泥底)
- 1561 *Turbonilla (Pyrgolampros) planicostata* Yokoyama, 1922 ヒライトカケギリ
タイプ産地: 千葉県印旛郡酒々井(化石)
分布: 三陸沿岸(大槌湾); 佐渡島(真野湾), 瀬戸内海(水深10~60m, 砂泥底)
- 1562 *Turbonilla (Pyrgolampros) subplanicostata* Yokoyama, 1927 ニヨリヒラウネイトカケギリ
分布: 太平洋側(34~35° N)
- 1563 *Pyrgiscus hataiana* (Nomura, 1937) ベニシシュウイトカケギリ
分布: 相模湾
- 1564 *Pyrgiscus aureocincta* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 キンスジハブタエチヨウジガイ
産地: 銚子(渡辺1988)
分布: 銚子沖~土佐沖, 若狭湾以南(水深50~200m, 砂底)
- 1565 *Pyrgiscus yoritomoi* (Nomura, 1938) イソイトカケギリ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
- 1566 *Pyrgiscus goma* (Nomura, 1937) ハシゴマイトカケギリ
分布: 相模湾
- 1567 *Paramormula aulica* (Dall & Bartsch, 1906) チャイロイトカケギリ
産地: 館山湾(奥谷ら*), 銚子(渡辺1988)
分布: 三陸沿岸(末崎村泊里)・但馬沖以南, 瀬戸内海, 四国, 九州(水深10~60m, 砂泥底)
- 1568 *Paramormula paucicostulata* (Tokunaga, 1906) フトスジイトカケギリ
タイプ産地: 千葉県市原市市東(化石)
分布: 三陸沿岸(大槌湾), 九州(博多湾)
- 1569 *Paramormula scrobiculata* (Yokoyama, 1922) ウネイトカケギリ
タイプ産地: 千葉県印旛郡大竹(化石)
産地: 木更津沖(風呂田1983), 勝浦(大島1993), 大原(清水), 銚子(渡辺1988)
分布: 銚子沖・但馬沖以南, 瀬戸内海, 四国(柏島), 九州(博多湾)(水深10~100m, 砂泥底)
- 1570 *Paramormula aspera* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 トクサイトカケギリガイ
産地: 銚子(渡辺1988)
分布: 相模湾, 銚子沖
- 1571 *Cingulina cingulata* (Dunker, 1860) ヨコイトカケギリ
産地: 浦安(千葉水試1957), 新浜(風呂田1980), 小櫃川河口(干潟(大嶋ら1980)), 館山湾(奥谷ら*), 勝浦(大島1993), 銚子(渡辺1988)
分布: 三陸沿岸(宮古湾, 赤崎村須ノ浦, 江ノ島沖, 鮎川)・佐渡(真野湾)以南, 但馬沖, 志摩半島, 瀬戸内, 四国, 九州(潮下部~60mm砂泥底)
- 1572 *Cingulina laticingulata* (Dall & Bartsch, 1906) ヒロヨコイトカケギリ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
分布: 房総半島・若狭湾以南, 志摩半島, 四国, 九州(潮間帯~水深20m, 砂泥底)
- 1573 *Cingulina circinata* A. Adams, 1860 イトマキシロギリ
産地: 勝浦(大島1993), 銚子(櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 銚子沖・粟島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深20m, 砂泥底)
- 1574 *Cingulina (Puncticingulina) puncticingulata* Nomura, 1938 キザミメイトカケギリ
分布: 太平洋側(35° N)
- 1575 *Lancella bella* (Dall & Bartsch, 1906) オオチリメンギリ
分布: 房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(水深30~100m, 粗砂底)
- 1576 *Paracingulina terebra* (Dunker, 1860) ヨコイトカケギリダマシ
産地: 館山湾(奥谷ら*: フコイトカケギリ)
分布: 房総半島・但馬沖以南, 志摩半島, 四国, 九州(水深5~20m, 砂泥底)
- 1577 *Paracingulina tiarata* (Pilsbry, 1904) ミスジヨコイトカケギリ
産地: 館山湾(奥谷ら*), 小湊(猪野1942b), 勝浦(大島1993), 名洗(千葉県1977a), 銚子(櫻井1964; 神奈川県博1972)
分布: 三陸沿岸(宮古湾)以南, 四国, 九州; 男鹿半島以南, 佐渡島, 但馬沖, 瀬戸内, 九州西岸・中国沿岸(潮間帯~水深150m, 砂泥底)
- 1578 *Paracingulina onzikuensis* (Nomura, 1938) オンジユクヨコイトカケギリ
タイプ産地: 千葉県御宿
産地: 勝浦(大島1993), 御宿(Nomura 1938) 分布: 同
- 1579 *Herviera gliriella* (Melville & Standen, 1899) キンイロサナギクチキレ
産地: 館山湾(奥谷ら*: ガーネットチキレ)
- 1580 *Rugadentia manzakiana* (Yokoyama, 1922) クチビルクチキレ
産地: 相模湾
- 1581 *Odostomia desimana* (Dall & Bartsch, 1906) クチキレモドキ
産地: 小湊(猪野1942b), 勝浦(大島1993), 銚子(渡辺1988)
分布: 三陸沿岸・佐渡島以南, 四国, 九州(水深30~110m, 砂泥底)
- 1582 *Odostomia culta* Dall & Bartsch, 1906 ハブタエクチキレモドキ
産地: 銚子(櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988)
分布: 三陸沿岸南部・但馬沖以南, 四国, 九州(潮間帯, 砂泥地)
- 1583 *Odostomia hirotamurana* Nomura, 1937 レモンクチキレモドキ

- 産地: 館山湾(奥谷ら*)
1584 *Odostomia inabana* Nomura, 1938 アワユキクチキレモドキ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
- 1585 *Odostomia cinelloides* Clessin, 1902
分布: 太平洋側(35° N)
- 1586 *Odostomia gordonis* Yokoyama, 1922 ゴルドンクチキレモドキ
タイプ産地: 千葉県印旛郡大竹町(化石) 分布: 但馬沖
- 1587 *Odostomia kizakiensis* Yokoyama, 1922
タイプ産地: 千葉県東葛飾郡沼南町手賀(印旛層, 化石)
- 1588 *Odostomia shimosensis* Yokoyama, 1922
タイプ産地: 千葉県印旛郡大竹町(化石)
分布: 千葉県(潮間帯下部~水深20m)
- 1589 *Odostomia sublimpida* Yokoyama, 1920
分布: 房総半島以北, 三陸, 青森県(潮間帯~水深20m, 砂底)
- 1590 *Odostomia yokoyamai* Nomura, 1936
分布: 太平洋側(35° ~41° N), 日本海側(41° N)
- 1591 *Odostomia anegasakienensis* Ikebe, 1936
タイプ産地: 千葉県姉ヶ崎町豊成(豊成層, 更新世, 化石)
- 1592 *Odostomia toyonariensis* Ikebe, 1936
タイプ産地: 千葉県姉ヶ崎町豊成(豊成層, 更新世, 化石)
- 1593 *Megastomia tenera* (A. Adams, 1860) スカシクチキレモドキ
分布: 但馬沖以南, 山口県北部, 太平洋側(35° N)
- 1594 *Megastomia sagamiana* (Nomura, 1937) サガミクチキレモドキ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
分布: 相模湾
- 1595 *Megastomia turukoae* Nomura, 1938 オオホタルクチキレモドキ
分布: 相模湾
- 1596 *Odostomia (Megastomia) rusticella* Yokoyama, 1927 ヒロクチキレモドキ
タイプ産地: 千葉県市川市(化石)
- 1597 *Odostomia toneana* Yokoyama, 1922 トネイオウクチキレモドキ
タイプ産地: 千葉県成田市大竹(印旛層群, 化石)
- 1598 *Odostomia tenera* A. Adams, 1860 クチヒダクチキレモドキ
分布: 相模湾以南, 四国, 九州(水深30~100m, 砂底)
- 1599 *Odostomia subangulata* A. Adams, 1860 ホソオリレクチキレモドキ
分布: 相模湾・対馬沖(水深50~100m, 砂底)
- 1600 *Brachystomia omaensis* (Nomura, 1938) アワジクチキレモドキ
産地: 勝浦(大島1993), 銚子(渡辺1988)
分布: 青森県・三陸沿岸沖・但馬沖以南, 瀬戸内海, 四国, 九州(潮間帯~100m, 砂底)
- 1601 *Simatodostomia nomurai* Corgan & van Aarsten, 1996 イオウクチキレモドキ
産地: 勝浦(大島1993)
分布: 三陸沿岸・若狭湾以南, 四国, 九州(潮間帯下部~水深60m, 砂泥地)
- 1602 *Aartsenia japonica* (A. Adams, 1860) コシダカドウマルクチキレ
産地: 銚子(渡辺1988)
分布: 三陸沿岸(大槌湾)・見島沖以南, 銚子沖, 相模湾
- 1603 *Pyrgulina casta* A. Adams, 1861 カゴメイトカケクチキレ
産地: 鷹ノ島(Adams 1861)
分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(潮間帯, 砂泥地の海藻上)
- 1604 *Pyrgulina shigeyasui* (Yokoyama, 1927) シゲヤスイカケギリ
産地: 房総半島(Oyama 1973 in 黒住2009), 本県では絶滅(黒住2000)
分布: 房総半島以南, 四国, 九州(水深10~60m, 砂泥底)
- 1605 *Pyrgulina pulchella* (A. Adams, 1860) オトギクチキレ
分布: 三陸・若狭湾~九州(水深41~139m, 砂底, 砂泥底)
- 1606 *Pyrgulina littoralis* A. Adams, 1861 ワラベクチキレ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
- 1607 *Pyrgulina pseudalveata* (Nomura, 1936) ムシロイトカケクチキレ
分布: 北海道忍路湾, 三陸, 房総半島, 山口県北部(潮間帯, 岩礁間の砂泥底, 石灰藻中)
- 1608 *Pyrgulina pupula* (A. Adams, 1861) サナギイトカケクチキレ
産地: 勝浦(大島1993)
分布: 相模湾・佐渡島以南, 瀬戸内海, 四国, 九州(潮間帯~水深30m, 岩礁・礫地)
- 1609 *Pyrgulina plicata* (A. Adams, 1860) キヌジクチキレ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
分布: 房総半島・見島沖以南, 瀬戸内海, 四国, 九州(潮間帯~水深20m, 砂泥地)
- 1610 *Pyrgulina affectuosa* (Yokoyama, 1927) ヨコスジギリ
分布: 北海道忍路湾, 三陸, 房総半島~伊豆半島, 山口県(潮間帯, 転石帯のヤッコカンザシ群集中)
- 1611 *Pyrgulina quantoana* (Nomura, 1937) カントウタテヒダギリ
分布: 三陸, 相模湾, 佐渡島, 山口県北部(水深5~100, 砂泥底)
- 1612 *Pyrgulina pagodula* (A. Adams, 1860) マキミノイトカケギリ
分布: 三陸・山形県飛鳥~九州(水深10~60m, 砂泥底)

- 1613 *Pyrgulina consobrina* (A. Adams, 1861) イトコクチキレ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
分布: 房総半島・粟島以南, 瀬戸内海, 四国, 九州(潮間帯~水深30m, 岩礁・礫地)
- 1614 *Pyrgulina alveata* (A. Adams, 1861) フトイトカケクチキレ
産地: 腐ノ島(Adams 1861)
分布: 宮城県(女川町)・若狭湾以南, 瀬戸内海, 四国, 九州(潮間帯~水深30m, 岩礁・礫地)
- 1615 *Pyrgulina ovumformis* (Nomura, 1938)
分布: 相模湾, 瀬戸内海(潮間帯~水深30m, 岩礁・礫地)
- 1616 *Pyrgulina brenda* (A. Adams, 1860)
分布: 太平洋側(34~35° N), 見島
- 1617 *Chrysallida erucella* A. Adams, 1863
分布: 太平洋側(33~35° N)
- 1618 *Chrysallida alveatoides* Nomura, 1938
分布: 太平洋側(35~40° N)
- 1619 *Chrysallida caelata* (A. Adams, 1863)
分布: 太平洋側(34~37° N), 日本海側(37° N)
- 1620 *Chrysallida consobrina* A. Adams, 1861
分布: 太平洋側(34~35° N), 日本海側(39° N)
- 1621 *Chrysallida ovumformis* Nomura, 1938
分布: 太平洋側(35~38° N)
- 1622 *Chrysallida pura* A. Adams, 1861
分布: 太平洋側(35° N), 日本海側(38° N)
- 1623 *Chrysallida tantilla* (A. Adams, 1863)
分布: 太平洋側(33~35° N)
- 1624 *Chrysallida tantilloides* Nomura, 1938
分布: 太平洋側(35~38° N)
- 1625 *Chrysallida takinogavensis* (Tokunaga, 1906)
分布: 千葉県市原市(瀬又層, 化石)
- 1626 *Chrysallida (Salassia) manzakiana* (Yokoyama, 1922) オリイレクチキレ
タイプ産地: 千葉県成田市大竹(印旛層群, 化石)
分布: 房総半島・若狭湾以南, 瀬戸内海, 四国, 九州(潮間帯下部~水深70m, 岩礁・礫地の海藻上)
- 1627 *Chrysallida yabei* Nomura, 1936 ヤベクサズリクチキレ
分布: 塩釜湾以南, 駿河湾, 瀬戸内海(潮間帯下部~水深30m, 岩礁・礫地の海藻上)
- 1628 *Chrysallida (Partuliola) marielloides* (Yokoyama, 1922) サキシダクチキレ
タイプ産地: 千葉県印旛郡酒々井(化石)
分布: 三陸沿岸(江ノ島沖, 大槌湾, 水深40m, 岩礁・礫地)
- 1629 *Chrysallida semiplicata* A. Adams, 1860
分布: 太平洋側(33~35° N), 日本海(35° N)
- 1630 *Chrysallida tantilla* A. Adams, 1863
分布: 三陸沿岸(江ノ島沖), 相模湾(水深40m, 砂泥底)
- 1631 *Numaegilina gloria* (Nomura, 1938) ミサカエクチキレ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
- 1632 *Numiola tessellata* (A. Adams, 1863) タイルバリクチキレ
産地: 勝浦(大島1993)
分布: 房総半島; 駿河湾・佐渡島以南, 四国, 九州西岸(潮間帯~水深30m, 岩礁・岩礫底)
- 1633 *Babella caelator* (Dall & Bartsch, 1906) クサズリクチキレ
産地: 館山湾(奥谷ら*), 勝浦(大島1993), 名洗(千葉県1977a)
分布: 房総半島・佐渡島以西, 瀬戸内海, 四国, 九州(潮間帯下部~水深30m, カンザシゴカイ・ヤッコカンザシ等の棲管付近に寄生)
- 1634 *Miralda diadema* (A. Adams, 1860) アラレクチキレ
分布: 房総半島・若狭湾以西, 大阪湾, 瀬戸内海, 四国, 九州(水深10~30m, 岩礁・礫底)
- 1635 *Miralda gemma* (A. Adams, 1861) ホソアラレクチキレ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
分布: 房総半島以南, 瀬戸内海, 四国, 九州(水深10~30m, 岩礁・礫底)
- 1636 *Miralda scitula* (A. Adams, 1860) ワダチクチキレ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
- 1637 *Miralda amabilis* (A. Adams, 1867) トウガタチリメンクチキレ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
- 1638 *Miralda affectuosa* (Yokoyama, 1927)
分布: 太平洋側(33~38° N)
- 1639 *Miralda cingulata* (A. Adams, 1861)
分布: 太平洋側 35° N
- 1640 *Miralda diademaeformis* (Nomura, 1938)
分布: 鎌倉, 千葉県
- 1641 *Miralda felix* (Dall & Bartsch, 1906)
分布: 太平洋側(35~38° N)
- 1642 *Amaura fulva* (A. Adams, 1853) ドウマルクチキレ
分布: 房総半島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深30m, 砂底)
- 1643 *Amaura sagamiensis* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 サガミドウマルクチキレ

- 分布:相模湾,能登半島沖(水深50~106m)
- 1644 *Amaura martensi* (Dall & Bartsch, 1906) ニセドウマルクチキレ
分布:房総半島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深20m, 砂底)
- 1645 *Oscilla circinata* (A. Adams, 1867) イトマキクチキレモドキ
タイプ産地:鷹ノ島
産地:鷹ノ島(Adams 1867)
分布:房総半島・佐渡島以南, 瀬戸内海, 四国, 九州(水深10~30m, 岩礁・礫の海藻上)
- 1646 *Oscilla tricordata* (Nomura, 1938) ヨコイトカケクチキレ
分布:房総半島以南, 瀬戸内海, 四国, 九州(水深10~60m, 砂泥底)
- 1647 *Oscilla perfelix* (Nomura, 1938) ネジマキクチキレ
分布:相模湾以南, 瀬戸内海(水深10~30m, 岩礁・礫底)
- 1648 *Oscilla mutuensis* Nomura, 1938
分布:陸奥湾以南, 宮城県女川町出島
- 1649 *Odetta lirata* (A. Adams, 1860) イトマキクチキレ
分布:房総半島・但馬沖以南, 瀬戸内海, 四国, 九州(水深10~30m, 砂泥底)
- 1650 *Odetta tenpei* (Nomura, 1937) オオレールマキクチキレ
分布:相模湾, 山口県(潮間帯~水深10m, 岩礁間の砂泥底)
- 1651 *Odetta bosyuensis* (Nomura, 1937) レールマキクチキレ
タイプ産地:千葉県館山市沼(化石)
産地:館山湾(奥谷ら*)
分布:房総半島・若狭湾以南, 四国, 九州(玄界灘)(水深10~140m, 砂泥底)
- 1652 *Iolaea scitula* (A. Adams, 1860) ハチマキクチキレ
分布:太平洋側(33~35° N), 対馬
- 1653 *Iolaea neofelixoides* (Nomura, 1936) トウダカチリメンクチキレ
分布:三陸・北海道忍路湾~九州(潮間帯~水深30m, 岩礁, 海藻中)
- 1654 *Iolaea amicalis* (Yokoyama, 1927) ハオリクチキレ
分布:三陸~九州(水深10~30m, 砂泥底)
- 1655 *Kleinella amicalis* (Yokoyama, 1929) ハリオレクチキレ
産地:勝浦(大島1993)
分布:三陸沿岸以南, 四国, 九州(水深10~30m, 砂泥底)
- 1656 *Kleinella sulcata* A. Adams, 1862 チリメンクチキレ
分布:房総半島以南, 瀬戸内海, 四国, 九州(水深10~30m, 砂泥底)
- 1657 *Kleinella scitula* (A. Adams, 1860)
分布:太平洋側(33~35° N), 日本海側(35° N)
- 1658 *Phasianema lirata* (A. Adams, 1860) ツトクチキレ
分布:三浦半島, 山口県見島, 三陸・北海道忍路湾~沿海州, サハリン(潮間帯~潮下帯, 岩礁, 海藻間)
- 1659 *Monotygmia eximia* (Lischke, 1872) ヒメゴウナ
タイプ産地:東京湾
産地:東京湾(Lischke 1872), 勝浦(大島1993), 九十九里浜水深10m(清水), 銚子(櫻井1964; 宇野ら1965; 神奈川県博1972; 渡辺1988)
分布:房総半島以南, 志摩半島, 瀬戸内海, 九州北西岸・男鹿半島以南, 佐渡島, 但馬沖, 山口県見島(潮間帯~水深60m, 砂泥底)
- 1660 *Monotygmia lauta* (A. Adams, 1853) ホソマキギヌ
産地:銚子(渡辺1988)
分布:房総半島・但馬沖以南, 瀬戸内, 志摩半島, 四国, 九州(潮間帯~140m, 砂泥底)
- 1661 *Monotygmia pareximia* (Nomura, 1936) アラボリホソマキギヌ
分布:房総半島以南, 瀬戸内, 四国, 九州(北西岸)(水深10~60m, 砂泥底)
- 1662 *Actaeopyramis digitalis* (Dall & Bartsch, 1906) チビマキギヌ
産地:銚子(渡辺1988)
分布:房総半島以南, 瀬戸内, 四国, 九州(水深10~60m, 砂泥底)
- Family Amathinidae
- 1663 *Amathina tricarinata* (Linnaeus, 1767) イソチドリ科
産地:鴨川, 小湊(大島1993), 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(水深10~50m, タイラギ・イタボガキ等に付着)
- 1664 *Amathina yokoyamai* (Oyama in Taki & Oyama, 1954) ヨコヤマカセンチドリ
タイプ産地:千葉県印旛郡亀成(化石)
分布:東京湾, 香港(内湾)
- 1665 *Leucotina diana* (A. Adams in H. & A. Adams, 1853) マキモノガイ
タイプ産地:東京湾
産地:東京湾(A. Adams 1853), 勝浦(大島1993), 銚子(櫻井1964; 渡辺1988)
分布:房総半島以南, 瀬戸内海, 四国, 九州; 佐渡島以南, 九州北西岸(水深10~50m, 砂泥底)
- 1666 *Leucotina adamsi* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 シロヒメゴウナ
産地:館山湾(奥谷ら*, 清水), 銚子沖(肥後・後藤, 1993)
分布:銚子沖・相模湾以西, 遠州灘(水深50~150m, 砂底)
- 1667 *Leucotina sagamiensis* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 タママキモノ
産地:銚子(渡辺1988)
分布:銚子沖・相模湾~銚子沖(水深50~200m, 砂底); 佐渡島(水深16m)
- 1668 *Leucotina nomurai* Habe, 1991 コガタマキモノガイ
タイプ産地:銚子沖(水深150m)
産地:銚子沖(Habe 1991; 神奈川県博1991; 渡辺1988)

- Subclass Opisthobranchia
Order Cephalaspidia
Superfamily Acteonoidea
Family Acteonidae
- 1669 *Acteon sieboldi* (Reeve, 1842)
産地: 館山湾(村越1998;奥谷ら*), 小湊(大島1993), 銚子(渡辺1988)
分布: 三陸沿岸(宮古湾)以南, 銚子沖, 瀬戸内, 四国, 九州北西岸(水深10~300m, 砂底)
- 1670 *Acteon soyoae* Habe, 1961
産地: 銚子(渡辺1988)
分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(水深50~300m, 細砂底)
- 1671 *Acteon archibenthicola* Habe, 1955
産地: 銚子(稲葉1963;渡辺1988)
分布: 房総半島以南, 土佐沖(水深100~200m, 細砂底)
- 1672 *Acteon subincisus* Okutani, 1968
産地: 房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995)
分布: 房総半島沖(水深507~578m), 三宅島沖(水深1,080~1,205m)
- 1673 *Punctacteon fabreanus* (Crosse, 1874)
産地: 館山湾(堀越1990;奥谷ら*), 銚子(渡辺1988)
分布: 房総半島・佐渡島以南, 志摩半島, 但馬沖, 四国, 九州(北西岸), 奄美, 沖縄, 中西太平洋(水深10~300m, 細砂底)
- 1674 *Punctacteon flammeus* (Gmelin, 1791)
分布: 相模湾以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, フィリピン, 西太平洋(水深10~50m, 細砂底)
- 1675 *Punctacteon kirai* (Habe, 1949)
産地: 銚子(稲葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布: 房総半島・但馬沖以南, 志摩半島, 紀伊半島, 四国, 九州(水深50~150m, 砂泥底); 燃島(化石)
- 1676 *Punctacteon teramachii* Habe, 1950
産地: 銚子(稲葉1963;渡辺1988)
分布: 房総半島・粟島沖以南, 土佐沖(水深50~200m, 細砂底)
- 1677 *Punctacteon kavamurai* (Habe, 1952)
産地: 銚子(稲葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布: 房総半島沖, 九州五島沖(水深100~200m, 砂泥底)
- 1678 *Punctacteon sagamiensis* (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)
分布: 房総半島沖, 九州五島沖(水深100~200m, 砂泥底)
- 1679 *Japanacteon nipponensis* (Yamakawa, 1911)
産地: 浦安(千葉水試1957)
分布: 房総半島・若狭湾以南, 志摩半島, 紀伊, 瀬戸内, 四国, 九州(北西岸)(潮間帯下部~30m, 砂底)
- 1680 *Crenilabium pacificus* (Kuroda & Habe in Habe, 1958)
タイプ産地: 銚子沖
産地: 銚子沖(Kuroda & Habe 1958;稲葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布: 房総半島・佐渡島以南, 九州西岸(水深100~300m, 砂底)
- 1681 *Pupa clathrata* Yokoyama, 1922
タイプ産地: 千葉県市原市津村瀬又(化石)
- 1682 *Pupa strigosa* (Gould, 1859)
産地: 竹岡(清水), 館山湾(堀越1990;佐々木1990;村越1998;奥谷ら*;清水), 小湊(猪野1942c), 勝浦(大島1993), 銚子(稲葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布: 房総半島・能登半島東岸以南, 志摩半島, 瀬戸内海, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~100m, 砂底)
- 1683 *Pupa strigosa sekii* Habe, 1958
タイプ産地: 銚子沖
産地: 銚子沖(Habe 1958;稲葉1963;渡辺1988)
分布: 銚子沖(水深100m)
- 1684 *Rictaxiella choshiensis* Habe, 1958
タイプ産地: 銚子沖(水深50m) 産地・分布: 同
Family Bullinidae
- 1685 *Bullina lineata* (Gray, 1825)
産地: 竹岡(清水), 館山湾(佐々木1990;村越1998;奥谷ら*), 小湊(猪野1942c), 勝浦(大島1993), 銚子(渡辺1988)
分布: 房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深30m, 海藻の間)
- 1686 *Bullina nobilis* Habe, 1950
産地: 銚子(稲葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布: 房総半島・但馬沖以南, 四国, 九州, (水深10~50m, 砂底)
- 1687 *Bullina virgo* Habe, 1950
産地: 銚子(渡辺1988)
分布: 房総半島以南, 志摩半島, 四国, 九州(西岸)(水深50~150m, 砂底)
- 1688 *Bullina callizona* Sakurai & Habe in Habe, 1961
タイプ産地: 千葉県銚子沖
産地: 銚子沖(Sakurai & Habe 1961;稲葉1963;渡辺1988;長谷川・斎藤1995)
分布: 銚子沖, 相模湾, 紀伊半島, 九州西岸(水深10~100m, 細砂底)
Family Hydatinidae
- 1689 *Hydatina physis* (Linnaeus, 1758)
- 後鰓亜綱
頭橋目
オオシイノミガイ科
オオシイノミガイ科
オオシイノミガイ
- ソウヨウキジビキガイ
- フカミキジビキガイ
- ツボミキジビキガイ
- キジビキガイ
- アカフキジビキガイ
- オオキジビキガイ
- ワタソコキジビキガイ
- カワムラキジビキガイ
- タママキモノガイ
- ムラクモキジビキガイ
- ハチノコガイ
- ヌノメカヤノミガイ
- コシイノミガイ
- セキコシイノミガイ
- ウスムラサキキジビキガイ
- ベニシボリガイ科
ベニシボリ
- オオベニシボリ
- ヤカタンボリ
- コイトガイ
- ミスガイ科
ミスガイ

- 産地:竹岡,秋生(清水),館山湾(沖ノ島:お茶大館山1973;村越1998;奥谷ら*,清水),太海(大島1993),天津(清水),小湊(猪野1942c;福井市博1962;小池1994;清水),銚子(渡辺1988)
分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~20m, 岩礁上の海藻上:)
- 1690 *Hydatina albocincta* (van der Hoeven, 1811) ヤカタガイ
産地:小湊(清水),安房(福井市博1962)
分布:房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 中国, フィリピン, オーストラリア(潮間帯~10~100m, 砂底)
- 1691 *Hydatina zonata* (Lightfoot, 1786) ヒメヤカタガイ
産地:竹岡(清水),館山湾(村越1998;奥谷ら*)
分布:房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(水深10~50m, 細砂底)
Superfamily Ringiculoidea
Family Ringiculidae マメウラシマガイ上科
マメウラシマガイ科
ニイノマメウラシマ
- 1692 *Ringicula niinoi* Nomura, 1938
産地:銚子(稲葉1963;櫻井1964;神奈川県博1972;渡辺1988)
分布:房総半島・若狭湾以南, 志摩半島, 四国, 九州, 東シナ海(水深40~410m, 細砂底)
- 1693 *Ringicula doliaris* (Gould, 1860) マメウラシマ
産地:浦安(千葉水試1947),盤洲沖(飯島ら1999),木更津沖(風呂田1983),館山湾(村越1998),小湊(猪野1942c),大原(清水),銚子(稲葉1963;渡辺1988)
分布:北海道南部・佐渡島以南, 本州, 瀬戸内海, 四国, 九州, 朝鮮, 中国(水深5~150m, 砂泥底)
- 1694 *Ringicula kurodai* (Takeyama, 1935) クロダマメウラシマ
産地:銚子(稲葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州, 老岐(水深50~150m, 砂泥底)
- 1695 *Ringicula yokoyamai* (Takeyama, 1935) ヨコヤマメウラシマ
タイプ産地:千葉県成田市大竹(化石)
産地:館山湾(村越1998)
分布:房総半島・若狭湾以南, 四国, 九州(対馬・長崎沖)(水深50~150m, 砂泥底)
- 1696 *Ringicula takeyamai* Habe, 1950 タケヤマメウラシマ
分布:房総半島以西, 四国, 九州(水深5~100m, 砂底)
- 1697 *Ringicula teramachii* Habe, 1950 テラマチマメウラシマ
産地:銚子(渡辺1988)
分布:銚子沖, 駿河湾, 土佐湾
- 1698 *Ringicula pilula* Habe, 1950 シラタマメウラシマ
産地:館山湾(村越1998),銚子(稲葉1963;神奈川県博1972;1991;渡辺1988)
分布:銚子沖以西, 志摩半島沖, 土佐沖(水深250~500m, 砂底)
- 1699 *Ringicula tosaensis* (Habe, 1950) トサマメウラシマ
産地:銚子(稲葉1963;櫻井1964)
分布:銚子~土佐湾
- 1700 *Ringiculopsis nipponica* Kuroda, 1961 ワダツミマメウラシマ
産地:銚子(稲葉1963;櫻井1964)
分布:銚子沖, 相模湾, 駿河湾, 土佐湾(水深100~200m, 細砂底)
- 1701 *Microglyphis japonicus* (Habe, 1952) ワラベマメウラシマ
産地:銚子(稲葉1963;櫻井1964;神奈川県博1972;渡辺1988)
分布:銚子沖・粟島沖以西, 遠州灘, 志摩半島沖, 但馬沖, 土佐沖, 九州西岸沖(水深100~300m, 細砂底)
Superfamily Diaphanoidea
Family Diaphanidae アワツブガイ上科
アワツブガイ科
- 1702 *Diaphana sakuraii* Habe, 1952 ヘコマアワツブガイ
分布:鹿島灘(水深200~400m)
Superfamily Philinoidea
Family Scaphanderidae キセワタガイ上科
スイフガイ科
オオスイフガイ
- 1703 *Eoscaplander fragilis* Habe, 1952
産地:銚子(稲葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:駿河湾以北, 東北東岸沖, 北海道(水深100~300m, 泥底)
- 1704 *Nipponoscaphander japonica* (A. Adams, 1862) スイフガイ
産地:銚子(稲葉1963)
分布:房総半島・若狭湾以西, 相模湾, 志摩半島, 紀伊沖, 土佐沖, 九州西岸, 東シナ海(水深50~300m, 細砂底)
- 1705 *Nipponoscaphander (Bucconia) cumingii* (A. Adams, 1862) クビレスイフガイ
分布:相模湾・若狭湾以南, 土佐沖, 九州西岸(水深100~200m, 細砂底)
- 1706 *Nipponoscaphander (Bucconia) cumingii ventricosa* (Habe, 1954) ヒロクチスイフガイ
分布:房総半島沖以西, 駿河湾, 土佐沖, 九州西南沖(水深50~200m, 細砂底)
- 1707 *Nipponoscaphander (Bucconia) teramachii* (Habe, 1954) テラマチスイフガイ
産地:銚子(稲葉1963)
分布:房総半島沖以西, 駿河湾, 志摩半島沖, 土佐沖(水深50~300m, 細砂底)
- 1708 *Roxania punctulata* (A. Adams, 1852) コキザミコダマガイ
産地:銚子(櫻井1964;神奈川県博1972;渡辺1988)
分布:三陸沿岸(大槌湾)・陸前沖以南, 銚子沖, 相模湾, 能登半島, 富山湾, 但馬沖, 四国, 九州(水深50~210m, 砂底)
- 1709 *Leucophysema japonica* Habe, 1976 ワタゾコブドウガイ
タイプ産地:銚子沖(水深約250m)
産地:銚子沖(Habe 1976;渡辺1988) 分布:同
- 1710 *Adamnestia rimata* (A. Adams, 1862) トサクダタマガイ
産地:銚子(稲葉1963;櫻井1964;渡辺1988)

- 分布:房総半島沖・相模湾・山口県北部以西, 志摩半島, 四国(土佐沖), 九州山口県北部(水深50~350m, 砂底)
- 1711 *Adamnestia japonica* (A. Adams, 1862) クダタマガイ
産地:館山湾(村越1998), 銚子(渡辺1988)
分布:房総半島・能登半島以南, 志摩半島, 瀬戸内海, 四国, 九州, 奄美沖(水深10~400m, 細砂底)
- 1712 *Adamnestia teramachii* Habe, 1954 テラマチクダタマガイ
分布:房総半島・若狭湾以西, 駿河湾, 土佐沖(水深40~200m, 砂底)
- 1713 *Eocylichna musashiensis* (Tokunaga, 1906) セキヒツクダタマガイ
産地:館山湾(村越1998), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988)
分布:房総半島・若狭湾以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深20~200m, 細砂底)
- 1714 *Eocylichna venustula* (A. Adams, 1862) ソウヨウクダタマガイ
産地:銚子(渡辺1988)
分布:津軽海峡・若狭湾以南, 銚子沖, 四国, 九州, 東シナ海(水深50~450m, 細砂底)
- 1715 *Eocylichna braunsi* (Yokoyama, 1920) ツマベニクダタマガイ
産地:銚子(櫻井1964; 渡辺1988)
分布:三陸沿岸・山形県沖以南, 四国, 九州, 東シナ海, 中国, フィリピン(水深10~50m, 砂泥底)
- 1716 *Cylichna consobrina* Gould, 1859 イトコカイコガイダマシ
産地:銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
分布:房総半島・山口県北部沖以北, 但馬沖, 佐渡島, 粟島沖, 北海道, カムチャッカ, ベーリング(水深50~300m, 砂泥底)
- 1717 *Cylichnium matsumotoi* Habe, 1955 ズングリクダタマガイ
産地:銚子沖(肥後・後藤, 1993)
分布:銚子沖, 熊野灘(水深100~200m, 砂底)
- 1718 *Cylichnella kawamurai* Habe, 1958 ヒダカイコガイ
タイプ産地:千葉県銚子沖
分布:銚子沖, 山口県見島沖(水深86~88m, 砂底)
- 1719 *Didontoglossa koyasuensis* (Yokoyama, 1927) コヤスツララガイ
分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州(潮間帯~水深30m, 内湾の砂泥底)
- 1720 *Truncateocina oyamai* Kuroda & Habe, 1954 ワタゾコメツブガイ
産地:銚子(渡辺1988)
分布:銚子沖・若狭湾以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深30~150m, 細砂底)
- 1721 *Acteocina decorata* (Pilsbry, 1904) ツララガイ
産地:銚子(渡辺1988)
分布:三陸(大槌湾)・男鹿半島以南, 四国, 九州西北岩(水深5~30m, 砂泥底)
- 1722 *Acteocina exilis* (Dunker, 1859) ヨソコメツブガイ
産地:館山湾(奥谷ら*; 村越1998), 勝浦(大島1993), 銚子(櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988)
分布:三陸(大槌湾)・男鹿半島以南, 四国, 九州(水深5~115m, 細砂底)
- 1723 *Acteocina gordonis* (Yokoyama, 1927) ゴルドンコメツブガイ
タイプ産地:千葉県松戸市(化石)
分布:三陸(大槌湾)・若狭湾以南, 四国, 九州西岸(潮間帯~水深30m, 細砂底)
- 1724 *Acteocina truncatoides* (Nomura, 1939)
分布太平洋側(34~38°N), 日本海側(36~37°N)
- 1725 *Cylichmatys angusta* (Gould, 1859) カミスジカイコガイダマシ
産地:銚子(渡辺1988)
分布:北海道南部・能登半島以南, 本州, 四国, 九州北西岸(内湾の水深5~100m, 泥底)
- 1726 *Cylichmatys pellucidus* Habe (MS) ウスカミスジカイコガイダマシ
分布:東北~四国, 日本海
- Family Retusidae
へコミツララガイ科
- 1727 *Retusa (Semiretusa) gordonis* (Yokoyama, 1927)
タイプ産地:関東地方(下総層, 化石)
分布太平洋側(32~35°N), 日本海側(36°N)
- 1728 *Retusa (Decolifer) insignis* (Pilsbry, 1904) コメツブガイ
産地:小櫃川河口干潟(秋山1974), 館山湾(奥谷ら*), 勝浦(大島1993)
分布:三陸沿岸・男鹿半島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深30m, 砂底)
- 1729 *Retusa (Decolifer) longispirata* (Yamakawa, 1911) クビマキコメツブ
タイプ産地:千葉県市原市津村瀬又(成田層, 化石)
分布:三陸南部・島根県沖以南, 瀬戸内海(水深10~60m, 泥底)
- 1730 *Retusa (Decolifer) matsusima* (Nomura, 1940) マツシマコメツブ
産地:釜淵(飯島ら1999), 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
分布:三陸(大槌湾)・佐渡島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深60m, 泥底)
- 1731 *Retusa (Decolifer) globosus* (Yamakawa, 1911) ドングリコメツブ
タイプ産地:千葉県成田市大竹及び東京都港区芝車町(化石)
産地:銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
分布:三陸(大槌湾)以南, 四国, 九州(水深10~60m, 砂底)
- 1732 *Retusa (Decolifer) fontinalis* (Yokoyama, 1927)
タイプ産地:千葉県千駄ヶ町隠田(化石)
- 1733 *Retusa (Pyrunculus) pyriformis obesus* (Habe, 1950) ブドウノタネガイ
産地:銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
分布:銚子沖・若狭湾以南, 四国, 九州, 中国, 東シナ海(水深100~200m, 細砂底)
- 1734 *Retusa (Pyrunculus) teramachii* (Habe, 1952) カドシリプトカイコガイ

- 分布:房総半島以南, 四国, 九州(水深50~200m, 砂底)
- 1735 *Retusa (Pyrunculus) phialus* A. Adams, 1862 シリプトカイコガイダマシ
産地: 鎌子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 北海道南部・佐渡島以南, 四国, 九州(水深20~400m, 砂底)
- 1736 *Retusa (Pyrunculus) tokyoensis* (Habe, 1950) トウキョウシリプトカイコ
タイプ産地: 東京湾
産地: 東京湾(Habe 1950)
分布: 東京湾, 相模湾, 瀬戸内海(水深10~60m, 砂底)
- 1737 *Retusa (Coleophysis) succincta* A. Adams, 1862 ヘコミツラガイ
分布: 北海道西南部・佐渡島以南, 四国, 九州(水深10~400m, 砂泥底)
- 1738 *Retusa (Coleophysis) sakuraii* (Habe, 1958) サクライコモツブガイ
タイプ産地: 千葉県鎌子沖
産地: 鎌子沖(長谷川・斉藤1995) 分布: 同
- 1739 *Retusa (Coleophysis) cucurbitina* Yokoyama, 1927 ヒョウタンヘコミツラ
分布: 北海道南部以南, 本州, 四国, 九州(水深10~50m, 砂泥底)
- 1740 *Retusa (Sulcoretusa) minima* (Yamalkawa, 1911) ヒメコモツブ
産地: 鎌子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 三陸(大槌湾)・佐渡島以南, 四国, 九州, 中国(水深10~100m, 砂泥底)
- 1741 *Rhizorus eburneus* (A. Adams, 1850) マメヒガイ
分布: 三陸(大槌湾)・佐渡島以南, 四国, 九州, シナ海(潮間帯下部~水深115m, 砂底)
- 1742 *Rhizorus tokunagai* (Makiyama, 1927) トクナガマメヒガイ
タイプ産地: 東京都北区王子(東京層, 化石)
分布: 三陸・粟島以南, 四国, 九州(水深5~115m, 砂底)
- 1743 *Rhizorus ovalinus* (A. Adams, 1862) タマゴマメヒガイ
産地: 鎌子(櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 北海道南部・佐渡島以南, 本州, 四国, 九州(水深10~410m, 細砂底)
- 1744 *Rhizorus radiolus* (A. Adams, 1862) アオモリマメヒガイ
産地: 鎌子(櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988)
分布: 伊勢湾・但馬沖以北, 三陸沿岸, 山形県沖(水深10~200m, 砂泥底)
Family Philinidae キセワタガイ科
キセワタ
- 1745 *Philine argentata* Gould, 1859
産地: 江戸川放水路(市川市博1993), 浦安(浜田・猪野1957), 新浜(風呂田1977), 船橋沖(風呂田1983), 千葉(浜田・猪野1957), 五井沖(風呂田1984), 中ノ瀬(風呂田1986a), 盤洲沖(浜田・猪野1957; 風呂田1984), 木更津沖(浜田・猪野1957; 風呂田1983; 清水), 富津沖(浜田・猪野1957; 水深6.5m; 清水), 富津(千葉県企業庁1977-1979), 富津岬南水深5.6~8.7m, 第1海堡南西水深21.5m, 磯根埼南西水深10.2m, 竹岡北西水深25.0m, 竹岡水深3.0m(清水), 磯根埼水深11.0m(砂底, 截生水深15.0m粗砂底, 保田水深51.0m砂泥底, 富山水深22.5~48.5m砂泥底(水産庁1982), 館山湾(水深11.0-11.5m粗砂・砂泥底: 水産庁1982; 村越1998; 奥谷ら*), 小湊(猪野1942c; 林ら1988), 勝浦(大島1993), 九十九里浜(清水), 名洗(千葉県1977a), 鎌子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 北海道南部, 男鹿半島以南, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 中国(潮間帯~水深110m, 砂泥底)
- 1746 *Philine kurodai* Habe, 1946 クロダキセワタ
産地: 鎌子(稲葉1963; 渡辺1988)
分布: 鎌子沖・能登半島以南, 四国, 九州(水深30~160m, 砂底)
- 1747 *Philine vitrea* Gould, 1859 ウスキセワタ
分布: 房総半島・山口県以南, 四国, 九州(水深30~100m, 砂泥底)
- 1748 *Globophilina kawamurai* Habe, 1958 カワムラキセワタ
タイプ産地: 鎌子沖
産地: 鎌子沖(Habe 1958; 稲葉1963; 櫻井1964)
分布: 鎌子沖
- 1749 *Philine orca* Gosliner, 1988 モンガラキセワタ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
- 1750 *Philine rubrata* Gosliner, 1988 アカキセワタ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
- 1751 *Hermania infantilis* Habe, 1950 チゴキセワタ
分布: 房総半島, 紀伊半島, 但馬沖, 山口県見島沖, 南シナ海(潮間帯~水深50m, 砂底)
- 1752 *Yokoyamaia ornatissima* (Yokoyama, 1927) ヨコヤマキセワタ
産地: 新浜(風呂田1980)
分布: 北海道西南部以南, 本州, 四国, 九州(水深5~30m, 泥底)
- 1753 *Choshiphilina pygmaea* (Yokoyama, 1922) クサリキセワタ
タイプ産地: 千葉県成田市大竹(化石)
産地: 鎌子(稲葉1963)
分布: 鎌子沖以南, 四国, 九州西岸(水深50~100m, 砂泥底)
Family Doridiidae
- 1754 *Philinopsis lineolata* (H. & A., Adams, 1854) カノコキセワタガイ科
分布: 相模湾(水深10~50m), インド洋, オーストラリア ヨコジマキセワタ
- 1755 *Philinopsis gigliolii* (Tapparone-Canefri, 1874) カノコキセワタ
産地: 木更津沖(風呂田1983)
分布: 房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州(潮間帯, 内湾のアマモ帯, 砂泥底)
- 1756 *Philinopsis cyaneum* (v. Martens, 1879) カラスキセワタガイ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
- 1757 *Aglaja orientale* Baba, 1949 トウヨウキセワタ

- 分布:房総半島, 相模湾, 富山湾, 越前沖, 五島列島
- 1758 *Aglaja iwasai* (S. Hirase, 1936) ツノナシオオクロガイ
分布:相模湾(水深10~50m), インド洋, オーストラリア
- 1759 *Chelidonura hirundinina* (Quoy & Gaimard, 1832) ニシキツバメガイ
分布:相模湾・佐渡島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 小笠原, インド・太平洋(潮間帯~水深20m, 砂泥底)
- 1760 *Chelidonura inornata* Baba, 1949 オハグロツバメガイ
分布:相模湾, 小笠原(潮間帯~水深30m)
- 1761 *Chelidonura fulvipunctata* Baba, 1938 アカボシツバメガイ
分布:相模湾・能登半島以南, 熱帯海域
- 1762 *Philineorbis teramachii* Habe, 1950 カガミキセワタ
産地:銚子(福葉1963;櫻井1964)
分布:銚子, 紀伊半島, 土佐湾
- 1763 *Nakamigawaia spiralis* Kuroda & Habe in Habe, 1961 ウズマキキセワタ
分布:相模湾以南, 四国, 九州(潮間帯~水深30m, 砂泥底)
Family Gastropterida
- 1764 *Gastropteron japonicum* Tokioka & Baba, 1964 ウミコチョウガイ科
分布:相模湾 ヤマトウミコチョウ
- 1765 *Gastropteron flavum* Tokioka & Baba, 1964 キイロウミコチョウ
分布:相模湾, 九州西岸
- 1766 *Gastropteron viride* Tokioka & Baba, 1964 ミドリウミコチョウ
分布:相模湾
- 1767 *Sagaminopteron ornatum* Tokioka & Baba, 1964 ムラサキウミコチョウ
分布:相模湾, 紀伊半島, オーストラリア南部
Superfamily Haminoeidea
Family Haminoeidae
- 1768 *Haloa japonica* (Pilsbry, 1895) ブドウガイ上科
タイプ産地:千葉県安房郡白浜町根本 ブドウガイ科
産地:富津(千葉県企業庁1977-1979), 竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(お茶大館山1973;堀越1990;佐々木1990;村越1998;奥谷ら*, 清水), 布良(清水), 白浜(根本; Pilsbry, 1895; 清水), 千倉(清水), 鴨川(大島1993; 清水), 小湊(清水), 勝浦(大島1993; 清水), 銚子(渡辺1988) ブドウガイ
分布:北海道南部・男鹿半島以南, 四国, 九州, 朝鮮半島(潮間帯~水深50m, 岩礁底)
- 1769 *Haloa margaritoides* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 マダマブドウガイ
分布:三陸沿岸~相模湾(潮間帯, 海藻の間)
- 1770 *Haloa rotundata* (A. Adams, 1850) ウスカワブドウガイ
分布:房総半島以南, 四国, 九州, 朝鮮, フィリピン(潮間帯, 海藻上)
- 1771 *Haminoea cymbalum* (Quoy & Gaimard, 1835) ミガキブドウガイ
産地:館山湾(村越1998)
分布:奄美諸島以南, 沖縄, 台湾, 西南太平洋(潮間帯, 海藻上)
- 1772 *Liloa porcellana* (Gould, 1859) カイコガイダマシ
産地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(村越1998), 勝浦(大島1993), 銚子(渡辺1988)
分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州(水深10~100m, 砂底)
- 1773 *Liloa translucens* A. Adams, 1862 スカシカイコガイダマシ
分布:房総半島以南, 四国, 九州(水深10~60m, 砂底)
- 1774 *Limulatyis ooformis* Habe, 1952 ホソタマゴガイ
分布:相模湾・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(水深10~30m, 砂底)
- 1775 *Limulatyis constrictus* Habe, 1952 クビレタマゴガイ
産地:飯岡(渡辺1988)
分布:銚子以南, 四国, 九州, 対馬(水深10~60m, 砂泥底)
- 1776 *Limulatyis muscarius* (Gould, 1859) ミドリタマゴガイ
産地:江見沖水深287m(蒼鷹丸St.A:波部1952a)
分布:相模湾・佐渡島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 中国(水深10~30m, 砂泥底)
Family Smaragdinellidae
- 1777 *Smaragdinella sieboldi* A. Adams, 1864 ミドリガイ科
タイプ産地:館山湾, 鷹ノ島 タテジワミドリガイ
産地:館山湾・鷹ノ島(A. Adams 1864), 房総半島(波部1965)
分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾(潮間帯, 海藻の間)
Superfamily Bulloidea
Family Bullidae
- 1778 *Bulla vermicosa* Gould, 1859 ナツメガイ上科
産地:竹岡, 萩生, 富浦(清水), 館山湾(お茶大館山1973;佐々木1989;村越1998;清水), 布良, 白浜, 千倉, 太海(清水), 鴨川(大島1993; 清水), 小湊(猪野1942c; 大島1993; 小池1994; 清水) ナツメガイ科
分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, フィリピン, ニュージーランド(潮間帯~水深30m, 岩礁底) ナツメガイ
- 1779 *Bulla ampulla* Linnaeus, 1758 タイワンナツメ
産地:館山湾(村越1998)
分布:九州南部以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯, アマモ帯)
- 1780 *Bulla punctulata* A. Adams, 1850 コナツメガイ
産地:竹岡, 萩生, 千倉水深5m(清水), 房総半島(奥谷・波部1975)
分布:奄美諸島以南, 沖縄, 台湾(潮間帯付近)
- Order Achochlidiaacea スナウミウシ目

- Superfamily Acochlidioidea
Family Dorididae
1781 *Metaruncina setoensis* (Baba, 1954)
産地: 館山湾(奥谷ら*)
Order Sacoglossa
Superfamily Oxynoacea
Family Oxynoidae
1782 *Oxynoe viridis* (Pease, 1861)
分布: 相模湾・富山湾以南, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(ヘライワツタ, センナリツタ等に着生)
1783 *Lobiger souverbii* Fischer, 1856
分布: 相模湾以南, 九州西岸, 奄美, 沖縄, インド・太平洋, 大西洋(ヘライワツタ, センナリツタ, スリコギツタ等の上)
Superfamily Juliacea
Family Juliidae
1784 *Julia japonica* Kuroda & Habe, 1951
産地: 館山湾(佐々木1990;奥谷ら*), 房総半島(波部1952a)
分布: 伊豆半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 八重山諸島(イワツタ類, センナリツタ, アミモヨウ等の上); 喜界島(化石)
Family Bertheliiniidae
1785 *Tamanovalva limax* Kawaguti & Baba, 1959
分布: 東京湾・富山湾以西, 能登半島, 紀伊半島, 瀬戸内海, 石垣島(フサイワツタ, センナリツタ等に着生)
Superfamily Limapontioidea
Family Cavoliniidae
1786 *Polybranchia orientalis* (Kelaart, 1858)
分布: 相模湾以南, 奄美, 沖縄, 熱帯太平洋(イワツタ類に着生)
Family Hermaeidae
1787 *Placida dendritica* (Alder & Hancock, 1843)
産地: 江戸川放水路(市川市博1993), 新浜(風呂田1976), 館山湾(奥谷ら*)
1788 *Ercolania boodlea* (Baba, 1938)
産地: 小湊(林・堀越1988; 平野1991)
1789 *Ercolania smaragdinus* Baba, 1949
分布: 相模湾, 富山湾(潮間帯, フサイワツタに着生)
1790 *Ercolania aubviridis* (Baba, 1959)
産地: 小湊(平野1991)
1791 *Aplysiopsis nigra* (Baba, 1949)
産地: 小湊(林・堀越1988; 平野1991)
1792 *Aplysiopsis* sp.
産地: 小湊(平野1991)
1793 *Hermaeina (Hermaeina) orientalis* Baba, 1949
産地: 小湊(林・堀越1988; 平野1991), 興津(馬場1949; 林・堀越1988)
分布: 房総半島・山形県以南, 相模湾(潮下部, 岩礁底)
1794 *Calliopaea pusilla* (Baba, 1959)
分布: 相模湾, 瀬戸内海(潮間帯~水深30m, 砂底)
Superfamily Elysiacea
Family Elysiidae
1795 *Elysia obtusa* Baba, 1938
分布: 相模湾以南, 瀬戸内海; 青森県種作埼以南, 九州西岸(シオグサ等に着生)
1796 *Elysia ornata* (Swainson, 1840)
産地: 館山湾(林・堀越1988; 奥谷ら*), 小湊(林・堀越1988)
1797 *Elysia splendens* Baba, 1949
分布: 相模湾・富山湾以南, 九州西岸, 石垣島(潮間帯~水深30m, 海藻上)
1798 *Elysia trisinuata* Baba, 1949
分布: 相模湾以南, 菅島, 鳥羽, 紀伊南部, 大阪湾; 佐渡島, 富山湾, 能登半島, 岩波, 対馬, 九州西岸(潮間帯~水深20m, ミル類に着生)
1799 *Elysia livida* Baba, 1955
分布: 相模湾・富山湾(潮間帯~水深30m, 海藻上)
1800 *Elysia abei* Baba, 1955
産地: 館山湾(奥谷ら*)
分布: 相模湾以南, 大阪湾, 瀬戸内海; 青森県種作埼以南, 九州西岸(緑藻類やウミトラノオの上)
1801 *Elysia hirasei* Baba, 1955
産地: 小湊(林・堀越1988)
1802 *Elysia amakusana* Baba, 1955
分布: 相模湾・能登半島以南, 九州, 瀬戸内海(潮間帯下部~水深30m, アジモの葉上)
1803 *Elysia sugashimae* Baba, 1955
分布: 相模湾以南, 志摩, 佐渡島以南, 富山湾, 能登半島, 敦賀湾, 九州西岸(潮間帯~水深30m, 海藻上)
1804 *Elysia atroviridis* Baba, 1955
分布: 相模湾・佐渡島以南, 九州西岸(潮間帯~水深30m, 海藻上)
1805 *Elysia marginata minor* Baba, 1960
分布: 相模湾・富山湾以南, 紀伊半島, 敦賀湾(潮間帯~水深30m, 海藻上)
Order Aplysiomorpha
Superfamily Akeroidea
- スナウミウシ上科
ハネエラミズムシウミウシ科
クロヒメウズムシ
囊舌目
ナギサノツユガイ上科
ナギサノツユガイ科
ナギサノツユ
フリソデミドリガイ
ユリヤガイ上科
ユリヤガイ科
ユリヤガイ
タマノミドリガイ科
タマノミドリガイ
カンランウミウシ上科
カンランウミウシ科
カンランウミウシ
ミドリアマモウミウシ科
ミドリアマモウミウシ
アリモウミウシ
タマミルウミウシ
ウスミドリモウミウシ
クロモウミウシ
トウヨウモウミウシ
コツブモウミウシ
ゴクラクミドリガイ上科
ゴクラクミドリガイ科
オトメミドリガイ
コノハミドリガイ
ハナミドリガイ
ヒラミルミドリガイ
チゴミドリガイ
アベミドリガイ
ゴクラクミドリガイ
アズキウミウシ
スガシマミドリガイ
クロミドリガイ
ヒメコノハミドリガイ
アメフラシ目
ウツセミガイ上科

- Family Akeridae
 1806 *Akera soluta* Gmelin, 1791
 産地:房総(黒田・波部1965)
 分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄(潮間帯下部~水深30m, 砂泥底)
 Superfamily Aplysioidea
 Family Aplysiidae
- 1807 *Aplysia (Aplysia) juliana* Quoy & Gaimard, 1832
 産地:竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(お茶大館山1973; 奥谷ら*; 清水), 白浜, 千倉, 鴨川, 小湊, 勝浦, 御宿, 大原(清水), 銚子(稲葉1963)
 分布:北海道南部・男鹿半島以南, 本州, 四国, 九州, 台湾, 世界の環赤道海域(潮間帯~水深10m, 褐藻類上)
- 1808 *Aplysia (Varria) kurodai* (Baba, 1937)
 産地:三番瀬(飯島ら1999), 富津(千葉県企業庁1977-1979), 富津干潟, 竹岡, 萩生, 保田, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(お茶大館山1973; 奥谷ら*; 清水), 洲崎(お茶大館山1973), 布良, 白浜, 千倉, 鴨川(清水), 小湊(猪野1942c; 林・堀越1988; 小池1994; 清水), 勝浦(千葉水試1980a; 清水), 御宿, 大原(清水), 銚子(稲葉1963; 鶴岡ら1994)
 分布:北海道南部・男鹿半島以南, 本州, 四国, 九州, 台湾, 中国, ヲトナム, タイ, マレーシア(潮間帯~水深20m, 褐藻類上)
- 1809 *Aplysia (Varria) dactylomela* Rang, 1828
 産地:沖ノ島(お茶大館山1973),
 分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯, 海藻の間)
- 1810 *Aplysia (Varria) oculifera* Adams & Reeve, 1850
 産地:館山湾(奥谷ら*), 千倉(清水), 小湊(林・堀越1988; 小池1994; 清水), 房総半島(奥谷・波部1975)
 分布:相模湾・青森県西南部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾, インド・太平洋(潮間帯, 岩礁の海藻間)
- 1811 *Aplysia (Varria) sagamiensis* Baba, 1949
 産地:館山湾(奥谷ら*)
 分布:相模湾(水深10~20m, 海藻の間)
- 1812 *Aplysia (Pruvotaplysia) parvula* Guilding in Mörch, 1863
 産地:館山湾(お茶大館山1973; 奥谷ら*; 清水), 千倉(清水), 小湊(猪野1942c; 林・堀越1988; 小池1994; 清水), 銚子(鶴岡ら1994)
 分布:北海道南部・男鹿半島以南, 本州, 四国, 九州(潮間帯, 岩礁の褐藻上)
- 1813 *Bursatella leachii leachii* de Blainville, 1817
 産地:小湊(林・堀越1988; フレゲアマテシ)
 分布:相模湾・佐渡島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, フィリピン(潮間帯~水深30m, 砂底, 砂泥底, 海藻上)
- 1814 *Notarchus punctatus* Philippi, 1836
 産地:小湊(林・堀越1988)
 分布:千葉県小湊, 相模湾, 紀伊半島, 富山湾(水深5~10m)
- 1815 *Syphonata geographica* (Adams & Reeve, 1850)
 分布:相模湾, 富山湾, 東インド諸島
- 1816 *Stylocheilus longicauda* (Quoy & Gaimard, 1824)
 分布:相模湾・佐渡島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, ニューカレドニア(潮間帯~水深30m, 海藻上)
- 1817 *Stylocheilus risbeci* Engel, 1936
 分布:相模湾, 富山湾からニューカレドニア
- 1818 *Dolabella auricularia* (Lightfoot, 1786)
 産地:萩生(清水), 館山湾(お茶大館山1973; 村越1998; 奥谷ら*; 清水), 白浜(清水), 天津(大島1993; 清水), 小湊(猪野1942c; 林・堀越1988; 小池1994; 清水), 安房(馬場1949), 房州(馬場1947), 銚子(稲葉1963), 房総半島(奥谷・波部1975)
 分布:房総半島・島根県日御碕以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深30m, 岩礁間の砂底)
- 1819 *Dolabrifera dolabrifera* (Cuvier, 1817)
 産地:館山湾(奥谷ら*), 小湊(林・堀越1988)
 分布:房総半島・富山湾以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾, インド・太平洋, 世界の環赤道海域(潮間帯, 岩礁底)
- 1820 *Petalifera punctulata* (Tapparone-Canevari, 1874)
 産地:館山湾(奥谷ら*)
 分布:青森県浅虫・新潟県沿岸以南, 四国, 九州, 中国(アマモ, アナアオサ等の海藻上)
- 1821 *Petalifera ramosa* Baba, 1959
 分布:相模湾, 天草(福岡湾)(潮間帯, アジモの葉上)
- Order Pleurobranchomorpha
 Superfamily Pleurobranchoidea
 Family Pleurobranchaeidae
- 1822 *Pleurobranchaea japonica* Thiele, 1925
 産地:五井沖, 盤洲沖(風呂田1984), 盤洲水深10.0m砂泥底(水産庁1982), 東京湾(浜田・猪野1957), 館山湾(お茶大館山1973), 小湊, 興津(林・堀越1988)
 分布:本州, 四国, 九州, 沖縄, 中国, ニューゼーランド(潮間帯~水深30m, 岩礁, 砂底)
- 1823 *Pleurobranchaea brockii* Bergh, 1897
 分布:相模湾, 紀伊半島, インドネシア, アフリカ東岸
- 1824 *Euselenops luniceps* (Cuvier, 1817)
 分布:相模湾, アンボイナ, アフリカ東岸
- Family Pleurobranchidae
- 1825 *Berthellina citrina* (Rüppell & Leuckart, 1828)
 産地:沖ノ島(お茶大館山1973), 小湊(林・堀越1988)
 分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, ポリネシア(潮間帯~水深60m, 岩礁)
- 1826 *Berthellina pellucida* (Pease, 1861)
 分布:相模湾・佐渡島以南, 四国, 九州(潮間帯, 岩礁)
- 1827 *Pleurobranchus semperi* (Vayssiere, 1896)
 分布:相模湾以南, 富山湾, 熱帯太平洋

ウツセミガイ科

ウツセミガイ

アメフラシ上科

アメフラシ科

アマクサアメフラシ

アメフラシ

ジャンメアメフラシ

ミドリアメフラシ

サガミアメフラシ

クロヘリアメフラシ

トゲアメフラシ

フウセンウミウシ

クサモチアメフラシ

クロスジアメフラシ

ヒメミドリアメフラシ

タツナミガイ

ピワガタナメクジ

ウミナメクジ

フサナメクジ

側鰓目

フシエラガイ上科

ウミフクロウ科

ウミフクロウ

ツノウミフクロウ

マダラウミフクロウ

カメノコフシエラガイ科

ホウズキフシエラガイ

シロフシエラガイ

ゼニガタフシエラガイ

- 1828 *Pleurobranchus hirasei* Baba, 1971
産地: 館山湾(お茶大館山1973), 房総半島(奥谷・波部1975)
分布: 房総半島・富山湾以南, 奄美, 沖縄(潮間帯, 岩礁)
Order Umbraculomorpha
Family Umbraculidae
- 1829 *Umbraculum umbraculum* Lightfoot, 1786
産地: 千倉(清水), 天津(大島1993), 小湊(猪野1942c; 林・堀越1988; 清水), 銚子(渡辺1988), 房総半島(奥谷・波部1988)
分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美(潮間帯~水深30m, 岩礁底)
Order Thecosomata
Suborder Euthecosomata
Family Limacinidae
- 1830 *Limacina (Thilea) inflata* (d'Orbigny, 1836)
分布: 黒潮水域, 世界の温・熱帯海域
- 1831 *Limacina (Munthea) trochiformis* (d'Orbigny, 1836)
分布: 世界の温・熱帯海域
- 1832 *Limacina (Munthea) bulinoides* (d'Orbigny, 1836)
分布: 世界の温帯・熱帯海域から混合水域
- 1833 *Limacina lesueurii* (d'Orbigny, 1836)
分布: 世界の温・熱帯海域
Family Cavoliniidae
- 1834 *Diacria trispinosa* (Blainville, 1821)
分布: 世界の温・熱帯海域
- 1835 *Diacria quadridentata* (Blainville, 1821)
分布: 黒潮水域およびその付近
- 1836 *Cavolinia uncinata* form *pulsata* Spoel, 1969
産地: 館山湾(村越1998; 奥谷2000), 銚子(渡辺1988) 分布: 世界の温・熱帯海域
- 1837 *Cavolinia tridentata* form *teschi* Spoel, 1974
分布: 世界の温・熱帯海域
- 1838 *Cavolinia globulosa* (Gray, 1850)
分布: 黒潮水域およびその付近, 世界の温・熱帯海域
- 1839 *Cavolinia gibbosa* (d'Orbigny, 1836)
分布: 世界の温・熱帯海域
- 1840 *Cavolinia inflexa* form *labiata* (d'Orbigny, 1836)
分布: 世界の温・熱帯海域
- 1841 *Cavolinia longirostris longirostris* (Blainville, 1821)
産地: 勝浦(大島1993), 銚子(渡辺1988) 分布: 黒潮水域およびその付近, 世界の温・熱帯海域
- 1842 *Cavolinia longirostris* form *augulosa* (Gray, 1850)
分布: 黒潮水域およびその付近, インド・西太平洋の温・熱帯海域
Family Clioidae
- 1843 *Creseis acicula* (Rang, 1828)
分布: 世界の温・熱帯海域
- 1844 *Creseis virgula* (Rang, 1828)
分布: 世界の温・熱帯海域
- 1845 *Styliola subula* (Quoy & Gaimard, 1827)
分布: 世界の温・熱帯海域
- 1846 *Hyalocylis striata* (Rang, 1828)
分布: 世界の温・熱帯海域
- 1847 *Clio pyramidata* Linnaeus, 1758
産地: 銚子(渡辺1988) 分布: 黒潮水域から混合水域, 世界の温・熱帯海域
- 1848 *Clio chaptali* Gray, 1850
分布: 地中層
- 1849 *Clio recurva* (Childern, 1823)
分布: 世界の温・熱帯海域
- 1850 *Clio cuspidata* (Bosc, 1802)
分布: 東太平洋を除く世界の温・熱帯海域
- 1851 *Clio fulcata* (Bonnevie, 1913)
分布: 世界の温・熱帯海域
Family Cuvierinidae
- 1852 *Cuvierina columnella* (Rang, 1827)
産地: 沖ノ山(神奈川県1972) 分布: 世界の温・熱帯海域~混合水域
- 1853 *Cuvierina columnella* form *urceolaris* (Mörch, 1852)
分布: 世界の温・熱帯海域~混合水域
Suborder Pseudotheosomata
Family Peracillidae
- 1854 -
分布: 黒潮水域を含む世界の温・熱帯水域
- 1855 *Peraclis reticulata* (d'Orbigny, 1836)
分布: 世界の温熱帯海域(水深100m以深の中層)
- カメノコフシエラガイ
傘殻目
ヒトエガイ科
ヒトエガイ
有殻翼足目
真有殻亜目
ミジンウキマイマイ科
ヒラウキマイマイ
コマガタウキマイマイ
セイタカウキアイマイ
カメガイ科
ヒラカメガイ
キヨコカメガイ
クイロカメガイ
カメガイ
マルカメガイ
シロカメガイ
マサコカメガイ
ササノツユ
マルセササノツユ
ウキビシガイ科
ウキツノガイ
ツメウキツノガイ
スジウキツノガイ
ガラスウキツノガイ
ウキビシガイ
フカミウキビシガイ
ダイオウウキビシガイ
トゲウキビシガイ
ミガキウキビシガイ
ウキツツガイ科
ウキツツガイ
ツボウキツツ
擬有殻亜目
アミメウキマイマイ科
アミメウキマイマイ

- Family Cymbuliidae
 1856 *Cymbulia sibogae* Tesch, 1903
 分布:黒潮水域, 太平洋の温・熱帯海域
- 1857 *Cymbulia ovata* (Quoy & Gaimard, 1832)
 分布:西太平洋, 大西洋
- 1858 *Corolla spectabilis* Dall, 1871
 分布:黒潮水域
- Order Gymnosomata
 Family Desmopteridae
 1859 *Desmopterus papilio* Chun, 1889
 分布:黒潮水域およびその付近
- Family Cliopsidae
 1860 *Cliopsis krohnii* Troschel, 1854
 分布:全世界の温・熱帯海域
- Family Hydromyliidae
 1861 *Hudromyles globulosa* (Rang, 1825)
 分布:黒潮水域を含む太平洋の温・熱帯海域
- Order Nudibranchia
 Suborder Doridacea
 Superfamily Anadoroidea
 Family Goniodeididae
 1862 *Goniodoris castanea* Alder & Hancock, 1845
 産地:館山湾沖ノ島(馬場1930b),房州(馬場1955)
 分布:房総半島・青森県深浦以南, 四国, 九州西岸, 大西洋, 地中海, 紅海, ニュージーランド(潮間帯~水深30m,海藻上)
- 1863 *Goniodoridella savignyi* Pruvot-Fol, 1931
 分布:相模湾・飛鳥以南, 志摩, 佐渡島, 富山湾, 越前, 隠岐(潮間帯~水深30m,岩礁)
- 1864 *Goniodoris glabra* Baba, 1937
 分布:相模湾・粟島以南, 大阪湾, 瀬戸内海, 九州西岸(潮下部~水深30m,海藻上)
- 1865 *Goniodoris felis* Baba, 1949
 分布:相模湾(潮間帯~水深30m,海藻上)
- 1866 *Hopkinsia hiroi* (Baba, 1938)
 分布:相模湾・北海道忍路以南, 紀伊, 瀬戸内海, 能登半島, 九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁・礫底)
- 1867 *Okenia distincta* Baba, 1940
 分布:陸奥湾(浅虫), 相模湾, 大阪湾, 能登半島
- 1868 *Okenia pellucida* Burn, 1961
 分布:相模湾(ホンダワラコケムシに共生)
- 1869 *Okenia japonica* Baba, 1949
 分布:相模湾・越前沿岸以南, 紀伊, 瀬戸内海, 富山湾, 敦賀湾(潮間帯~水深30m,海藻上)
- 1870 *Okenia echinata* Baba, 1949
 分布:相模湾・越前沿岸以南, 瀬戸内海, 富山湾(潮間帯~水深30m,海藻上)
- 1871 *Ancula (Eucrairia) kariyana* Baba, 1990
 分布:相模湾, 青森県深浦, 富山湾
- Family Triophidae
 1872 *Kalinga ornata* Alder & Hancock, 1864
 産地:館山湾(馬場1930a;安部1964),館山(Baba 1933),小湊(林・堀越1988;清水),房州(馬場1955)
 分布:房総半島・山形県以南, 九州西岸, インドネシア, アフリカ南部(潮間帯~水深50m,岩礁底)
- 1873 *Plocamopherus tileseii* Bergh, 1877
 産地:館山湾(高ノ島;馬場1930a;奥谷ら*),館山湾(Baba 1933)
 分布:青森県浅虫・富山湾以南, 九州西岸(潮間帯~水深30m, 岩礁の海藻上)
- 1874 *Plocamopherus imperialis* Angas, 1864
 分布:相模湾・富山湾以南, 九州, オーストラリア(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上)
- 1875 *Crinora lutea* Baba, 1949
 産地:相模湾
- Family Aegiretidae
 1876 *Aegires villosus* Farran, 1905
 分布:相模湾, 紀伊, インド洋, ニューカレドニア(水深10~50m)
- Family Polyceridae
 1877 *Tambja sagamiensis* (Baba, 1955)
 分布:相模湾
- 1878 *Euphurus ornatus* Baba, 1937
 分布:館山湾~紀伊半島(潮間帯~水深30m,岩礁底)
- 1879 *Polycera fujitai* Baba, 1937
 分布:東京湾口・能登外浦以南, 九州西岸(潮間帯~水深30m, 岩礁底)
- 1880 *Polycera hedgpethi* Marcus, 1964
 分布:房総半島以南
- 1881 *Polycera japonica* Baba, 1949
 分布:相模湾, 九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁底)
- 1882 *Kaloplocamus acutus* Baba, 1955
- ヤジリカンテンカメガイ科
 ヤジリカンテンカメガイ
- カンテンカメガイ
- ウチワカンテンカメガイ
- 裸殻翼足目
 コチョウカメガイ科
 コチョウカメガイ
- クリオブシス科
 タルガタハダカカメガイ
- マメツブハダカカメガイ科
 マメツブハダカカメガイ
- 裸鰓目
 ドーリス亜目
 類ウミウシ上科
 ネコジタウミウシ科
 ネタジタウミウシ
- コトヒメウミウシ
- コネコウミウシ
- サガミコネコウミウシ
- ヒロウミウシ
- ムツイバラウミウシ
- セスジイバラウミウシ
- シロイバラウミウシ
- クロイバラウミウシ
- カリヤウミウシ
- ハナサキウミウシ科
 ハナデンシヤ
- ヒカリウミウシ
- ベッコウヒカリウミウシ
- ヤグルマウミウシ
- センヒメウミウシ科
 センヒメウミウシ
- フジタウミウシ科
 サガミリュウグウウミウシ
- カンザシウミウシ
- フジタウミウシ
- クロコソデウミウシ
- オオカンウミウシ
- ヒメエダウミウシ

- 分布:相模湾以西,九州(潮間帯~水深30m)
- 1883 *Kaloplocamus ramosus* (Cantraine, 1835) エダウミウシ
産地:館山湾沖ノ島(馬場1930b),安房(馬場1949;安部1964),房州(馬場1947),房総半島(奥谷・波部1975)
分布:房総半島・山形県以南,九州西岸,地中海(潮間帯~水深30m,岩礁底)
- 1884 *Thecacera pennigera* (Montagu, 1815) ミズタマウミウシ
分布:相模湾,鳥羽,富山湾,瀬戸内海,大西洋,地中海(潮間帯~水深30m,海藻上)
Family Gymnodorididae キヌハダウミウシ科
キヌハダウミウシ
- 1885 *Gymnodoris inornata* (Bergh, 1880)
産地:安房(馬場1949),沖ノ島(お茶大館山1973),房総半島(奥谷・波部1975)
分布:房総半島・青森県雄作崎以南,四国,九州,東インド,アフリカ東岸(潮下部~水深30m,岩礁底)
- 1886 *Gymnodoris alba* (Bergh, 1877) アカボシウミウシ
産地:館山湾(沖ノ島:馬場1930b;奥谷ら*),安房(馬場1949)
分布:館山湾・敦賀湾以南,九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁)
- 1887 *Gymnodoris citrina* (Bergh, 1877) キヌハダモドキ
分布:青森県浅虫以南,四国,九州,インド・太平洋(潮下部~水深30m,砂礫・岩礁底)
- 1888 *Gymnodoris nigricolor* Baba, 1960 スミノメキヌハダウミウシ
分布:相模湾,瀬戸内海(潮間帯下部~水深30m,砂礫・岩礁底)
- 1889 *Gymnodoris subflava* Baba, 1949 ウスギヌウミウシ
分布:相模湾,瀬戸内海(潮下部~水深30m,砂礫・岩礁底)
- 1890 *Gymnodoris ceylonica* (Kelarrt, 1858) オオエラキヌハダウミウシ
分布:相模湾,インド・太平洋
- 1891 *Roboastrea gracilis* (Bergh, 1877) リュウグウウミウシ
分布:相模湾以南,与論島
- 1892 *Tambja sagamiana* (Baba, 1955) サガミリュウグウウミウシ
分布:相模湾,紀伊半島
Family Acanthodorididae トゲウミウシ科
- 1893 *Diaphodoris mitsui* (Baba, 1938) ミツイラメウミウシ
分布:相模湾・能登半島以南,伊豆半島,瀬戸内海,富山湾(潮下部~水深30m,岩礁の海藻上)
Family Vayssiereidae オカダウミウシ科
オカダウミウシ
- 1894 *Okadaia elegans* Baba, 1930
タイプ産地:館山湾沖ノ島・洲崎・江ノ島・逗子
産地:館山湾(沖ノ島:Baba 1930;奥谷ら*),洲崎(Baba 1930),小湊(林・堀越1988;Iijima,1998)
分布:北海道厚岸・山形県以南,本州,四国,九州西岸,瀬戸内海(潮間帯~岩礁の海藻上)
Family Hexabranthidae ミカドウミウシ科
ミカドウミウシ
- 1895 *Hexabranthus lacela* (Cuvier, 1804) イロウミウシ科
分布:相模湾以南,熱帯海域,南アフリカ,紅海 シロウミウシ
Family Chromodorididae
- 1896 *Chromodoris orientalis* Rudman, 1983
産地:勝山(田中ら1974),館山湾(沖ノ島:お茶大館山1973;奥谷ら*;清水),小湊(林・堀越1988;小池1994;清水)
分布:陸奥湾・男鹿半島以南,四国,九州,奄美,沖縄,タヒチ(潮間帯下部~水深30m,岩礁の海藻上)
- 1897 *Chromodoris tinctoria* (Rüppell & Leuckart, 1828) サラサウミウシ
産地:館山湾(沖ノ島:お茶大館山1973;林・堀越1988;奥谷ら*),小湊(林・堀越1988)
分布:房総半島・佐渡島以南,九州西岸,インドネシア,南太平洋(潮間帯~水深30m,岩礁底)
- 1898 *Chromodoris aureopurpurea* Collingwood, 1881 コモンウミウシ
産地:房総半島(奥谷・波部1975)
分布:青森県浅虫・男鹿半島以南,相模湾,志摩,中国,飛鳥,佐渡島,敦賀湾(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上)
- 1899 *Chromodoris decora* (Pease, 1860) セトイロウミウシ
分布:相模湾,紀伊半島瀬戸
- 1900 *Chromodoris leopardus* Rudman, 1987 ヒョウモンイロウミウシ
分布:相模湾,紀伊半島,太平洋の熱帯海域
- 1901 *Chromodoris tumilifera* (Collingwood, 1881) シラライロウミウシ
産地:小湊(林・堀越1988)
分布:房総半島・能登外浦以南,九州西岸,中国(潮間帯~水深30m,岩礁底)
- 1902 *Chromodoris nona* Baba, 1953 シラウメウミウシ
分布:相模湾
- 1903 *Chromodoris verrieri* (Crosse, 1875) シラヒメウミウシ
分布:相模湾・男鹿半島以南,九州西岸,南太平洋(潮間帯下部~水深30m,岩礁底)
- 1904 *Chromodoris misakinosibogae* Baba, 1988 ジボガウミウシ
分布:相模湾,青森県雄作崎~敦賀湾,チモール島(潮間帯~水深30m,岩礁底)
- 1905 *Chromodoris quadricolor* (Rüppell & Leuckart, 1828) クロスジウミウシ
分布:相模湾,八丈島,インド・太平洋
- 1906 *Glossodoris atromarginata* (Cuvier, 1804) キイロウミウシ
分布:相模湾・飛鳥以南,九州西岸,インド・太平洋(潮間帯~水深30m,岩礁底)
- 1907 *Glossodoris pallida* (Rüppell & Leuckart, 1828) シロタエイロウミウシ
分布:相模湾赤根島水深約8m,紅海,タンザニア,インド洋,オーストラリア(クイーンズランド)
- 1908 *Chromodoris pallescens* (Bergh, 1905)
産地:小湊(猪野1942c)
分布:陸奥湾,房総半島

- 1909 *Ceratosome trilobatum* (Gray, 1827) ニシキウミウシ
産地:小湊(猪野1942a,林・堀越1988;清水),房総半島(奥谷・波部1975)
分布:房総半島以南, 対馬, 九州西岸, インド・太平洋, 紅海(潮間帯～水深30m,岩礁底)
- 1910 *Ceratosome cornigerum* Adams & Reeve in Adams, 1848 ダイニニシキウミウシ
産地:小湊(猪野1942c)
分布:房総半島以南, 九州西岸(潮間帯～水深30m,岩礁底)
- 1911 *Ceratosome bicolor* Baba, 1949 フタイロニシキウミウシ
分布:相模湾, 紀伊半島(潮間帯下部～水深30m,岩礁底)
- 1912 *Hypselodoris maritima* (Baba, 1949) リュウモンイロウミウシ
分布:相模湾～紀伊半島, 越前沿岸～九州西岸(潮間帯～水深30m,岩礁底)
- 1913 *Hypselodoris shimodaensis* Baba, 1994 シモダイロウミウシ
分布:相模湾, 駿河湾
- 1914 *Hypselodoris festiva* (A. Adams, 1861) アオウミウシ
産地:竹岡(清水), 館山湾(馬場1935;沖ノ島:お茶大館山1973;奥谷ら*;清水), 千倉(千葉水試1981a;清水), 太海(清水), 小湊(猪野1942c;林・堀越1988;小池1994;清水), 興津(林・堀越1988)
分布:青森県浅虫・山形県以南, 四国, 九州(潮間帯下部～水深30m, 岩礁底)
- 1915 *Hypselodoris maridadilus* Rudman, 1977 クチナシイロウミウシ
分布:相模湾以南
- 1916 *Hypselodoris purpureomaculosa* Hamatani, 1995 サビウライロウミウシ
分布:相模湾以南, 奄美大島
- 1917 *Hypselodoris florens* (Baba, 1949) ハナイロウミウシ
分布:相模湾・飛島以南(潮間帯～水深30m,岩礁底)
- 1918 *Hypselodoris placida* (Baba, 1949) ウスイロウミウシ
分布:相模湾・越前沿岸以南(潮間帯～水深30m,岩礁底)
- 1919 *Hypselodoris kaname* Baba, 1994 カナメイロウミウシ
分布:相模湾・紀伊田辺湾
- 1920 *Mexichromis multituberculata* (Baba, 1953) レンゲウミウシ
分布:相模湾, 駿河湾, 紀伊半島
- 1921 *Miamira sinuata* (Van Hasselt, 1824) ミアマラウミウシ
分布:相模湾以南, 紀伊半島南部, 九州西岸, ジャワ島(潮間帯～水深30m,岩礁底)
- 1922 *Noumea nivalis* Baba, 1937 シラユキウミウシ
産地:小湊(馬場1987;林・堀越1988),房州(馬場1949)
分布:相模湾・青森県釧作崎以南, 九州西岸, ニューカレドニア(潮間帯下部～水深30m, 岩礁底)
- 1923 *Noumea parva* Baba, 1949 ヒメイロウミウシ
分布:相模湾
- 1924 *Noumea purpurea* Baba, 1949 フジイロウミウシ
分布:相模湾・越前沿岸以南, 対馬, 南太平洋(潮間帯～水深30m,岩礁底)
- 1925 *Cadlinella ornatissima* (Risbec, 1928) イガグリウミウシ
分布:相模湾以南, 紀伊半島(潮間帯～水深50m,岩礁底)
- 1926 *Cadrina japonica* Baba, 1937 カドリナウミウシ
産地:館山湾(奥谷ら*)
分布:北海道厚岸以南, 四国, 九州(水深30～350m,岩礁底)
- 1927 *Cadrina sagamiensis* Baba, 1937 サガミウミウシ
分布:相模湾
- 1928 *Actinocyclus laevis variegatus* (Eliot, 1904) カワハダウミウシ
分布:相模湾, インド洋
- 1929 *Actinocyclus japonicus* (Eliot, 1913) アマクサウミウシ
産地:館山湾(奥谷ら*),小湊(林・堀越1988)
分布:房総半島以南, 九州西岸(潮間帯～水深30m,岩礁底)
- 1930 *Hallaxa indecora* (Bergh, 1905) ハラツクサウミウシ
分布:相模湾以南, 九州西岸, 富山湾, 紅海, 東インド(潮間帯～水深50m,砂底)
Family Dorididae
- 1931 *Homiodoris japonica* Bergh, 1881 ドーリス科
ヤマトウミウシ
産地:館山湾(お茶大館山1973;奥谷ら*;清水)小湊(林・堀越1988;清水)
分布:相模湾・青森県釧作崎以南, 九州西岸, ニューカレドニア(潮間帯下部～水深30m, 岩礁底)
- 1932 *Platydorid tabulata* (Abraham, 1877) ネズミウミウシ
産地:館山湾(沖ノ島:お茶大館山1973;奥谷ら*),小湊(林・堀越1988),安房(馬場1949;安部1964),房州(馬場1947)
分布:房総半島・飛島以南, 九州西岸, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯～水深30m,岩礁底)
- 1933 *Platydorid speciosa* (Abraham, 1877) クモガタウミウシ
産地:館山湾(沖ノ島:お茶大館山1973;奥谷ら*;清水),洲崎(お茶大館山1973),小湊(Eliot, 1913;猪野1942c;林・堀越1988;小池1994;清水),安房(馬場1949),勝浦(千葉水試1980a;清水),房総半島(奥谷・波部1975)
分布:房総半島・佐渡島以南, 九州西岸, インド・太平洋(潮間帯～水深30m,岩礁底)
- 1934 *Archidorid tricolor* (Baba, 1938) サンシキウミウシ
産地:洲崎(Baba 1938),小湊(林・堀越1988),安房(馬場1949)
分布:房総半島以南, 相模湾, 志摩半島, 紀伊半島(潮間帯～水深30m,岩礁底)
- 1935 *Rostanga orientalis* Rudman & Avern, 1989 イソウミウシ
産地:館山湾(お茶大館山1973;奥谷ら*),小湊(林・堀越1988)
分布:陸奥湾以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, オーストラリア, ニュージーランド, カリフォルニア(潮間帯～水深30m,岩礁・磯底)

- 1936 *Rostanga risbeci* Baba, 1991
分布:相模湾, 天草, 福井県, 奄美大島
クロイソウミウシ
- 1937 *Discodoris concinna* (Alder & Hancock, 1864)
産地:館山湾(奥谷ら*),小湊(Eliot 1913;林・堀越1988),安房(馬場 1949;安部 1964)
分布:房総半島・山形県以南, 紀伊半島, 大阪湾, 瀬戸内海, 九州西岸, インド洋, 南太平洋(潮間帯~水深30m,岩礁・礫底)
ツツレウミウシ
- 1938 *Discodoris pardalis* (Alder & Hancock, 1864)
産地:房州(馬場1955;安部1964)
分布:房総半島・佐渡島以南, 瀬戸内海, 九州西岸, インド・南太平洋(潮間帯~水深30m,岩礁・礫底)
アミメツツレウミウシ
- 1939 *Carminodoris bifurcata* Baba, 1993
分布:相模湾~南紀
センリョウウミウシ
- 1940 *Aldisa coopeiri* Robillard & Baba, 1972
産地:館山(Baba 1940),館山湾(お茶大館山1973),安房(馬場1949)
分布:陸奥湾浅虫以南, 房総半島, 相模湾, 志摩半島, 大阪湾, 九州西岸, カリフォルニア(潮間帯~水深30m,岩礁・礫底)
チシオウミウシ
- 1941 *Jouma parva* (Baba, 1938)
分布:相模湾・佐渡島以南, 紀伊半島, 瀬戸内海, 九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁・礫底)
ゴマフビロードウミウシ
- 1942 *Trippa spongiosa* (Kelaart, 1858)
分布:相模湾以南, 熱帯インド・西太平洋
ジャノメカイメンウミウシ
- 1943 *Trippa intecta* (Kelaart, 1858)
分布:相模湾以南, 熱帯インド・西太平洋
カイメンウミウシ
- 1944 *Thordisa sanguinea* Baba, 1955
分布:相模湾, 富山湾(潮間帯~水深30m,岩礁・礫底)
ヒメチシオウミウシ
- 1945 *Halgerda rubicunda* Baba, 1949
分布:相模湾以南, 紀伊半島, 瀬戸内海(潮間帯~水深30m,岩礁・礫底)
ヒオドシウミウシ
- 1946 *Halgerda japonica* Eliot, 1913
産地:館山湾(沖ノ島:お茶大館山1973;奥谷ら*),小湊(林・堀越1988),安房(馬場1949),房総半島(奥谷・波部1975)
分布:房総半島以南, 九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁底)
ニクイロウミウシ
- Superfamily Phyllidioidea
Family Phyllidiidae
- 1947 *Phyllidiella pustulosa* (Cuvier, 1804)
分布:相模湾, 紀伊半島, 沖縄諸島, 熱帯インド・太平洋
イボウミウシ上科
イボウミウシ科
コイボウミウシ
- 1948 *Phyllidia ocellata* Cuvier, 1804
産地:館山湾(Baba, 1930),館山湾(お茶大館山1973)安房(馬場1949),房州(馬場1947),房総半島(奥谷・波部1975)
分布:房総半島以南, 九州西岸, インド・太平洋(潮間帯下部から水深100m,岩礁底)
キイロイボウミウシ
- 1949 *Phyllidia coelestis* Bergh, 1905
分布:相模湾以南, 南シナ海, 熱帯インド・西太平洋, アフリカ
ソライロイボウミウシ
- 1950 *Phyllidia zebrina* Baba, 1976
分布:相模湾
ヨコジマイボウミウシ
- Family Dendrodorididae
- 1951 *Dendrodoris arborescens* (Collingwood, 1881)
産地:館山湾(お茶大館山1973;奥谷ら*;清水)小湊(林・堀越1988;平野1992;Iijima, 1998;清水),房総半島(奥谷・波部1975)
分布:青森県陸奥湾・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋, スエズ(潮間帯~水深30m,岩礁底)
クロシタナシウミウシ科
クロシタナシウミウシ
- 1952 *Dendrodoris nigra* (Stimpson, 1855)
分布:日本全体, 熱帯インド・西太平洋
ホンクロシタナシウミウシ
- 1953 *Dendrodoris rubra* (Kelaart, 1858)
産地:館山湾(沖ノ島:お茶大館山1973;林・堀越1988;奥谷ら*;清水),洲崎(お茶大館山1973),小湊(猪野1942c;林・堀越1988;平野1992;Iijima, 1998;清水),鏡子(稲葉1963)
分布:房総半島・山形県以南, 九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁底)
マダラウミウシ
- 1954 *Dendrodoris guttata* (Odhner, 1917)
産地:小湊(林ら1988;平野1992)
分布:房総半島・老枝以南, 九州西岸, オーストラリア(潮間帯~水深30m,岩礁底)
ヒメマダラウミウシ
- 1955 *Dendrodoris tuberculosa* (Quoy & Gaimard, 1832)
産地:小湊(林・堀越1988;平野1992)
分布:房総半島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深30m,岩礁底)
イシガキウミウシ
- 1956 *Dendrodoris denisoni* (Angas, 1864)
産地:小湊(林・堀越1988;平野1992)
分布:房総半島・山形県鹿ヶ岡以南, 九州西岸, インド・太平洋(潮間帯~水深30m,岩礁底)
ミヤコウミウシ
- 1957 *Dendrodoris elongata* Baba, 1936
分布:相模湾以南, 沖縄, パラオ(潮間帯~水深30m,岩礁底)
ナマコウミウシ
- 1958 *Doriopsis miniata* (Alder & Hancock, 1864)
産地:館山湾(林・堀越1988;奥谷ら*;清水),沖ノ島,洲崎(お茶大館山1973),小湊(林・堀越1988;平野1992;清水),安房(馬場1949),房州(馬場1947)
分布:房総半島以南, 九州西岸, インド洋(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上)
ダイダイウミウシ
- 1959 *Doriopsis granulosa* Pease, 1860
分布:相模湾・新潟県以南, 九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁底)
キイロクシエラウミウシ
- Suborder Dendronotacea
Family Tritoniidae
- 1960 *Tritonia festiva* (Stearns, 1891)
分布:相模湾・富山湾以北, 北海道, カナダ(バンクーバー), メキシコ(水深50~100m,砂泥底)
スギノハウミウシ亜目
ホクヨウウミウシ科
シロホクヨウウミウシ
- 1961 *Tritonia (Duvaucellia) insulae* Baba, 1955
シラヒメハナガサウミウシ

- 分布: 相模湾
- 1962 *Tritonopsis alba* Baba, 1949 シロハナガサウミウシ
分布: 相模湾以南, 紀伊半島(潮間帯~水深20m, 岩礁底)
- 1963 *Paratritonia lutea* Baba, 1949 キイロハナガサウミウシ
分布: 相模湾
- 1964 *Marionia olivacea* Baba, 1937 ミドリウミウシ
分布: 相模湾
Family Scyllaeidae
オキウミウシ科
オキウミウシ
- 1965 *Scyllaea pelagica* Linnaeus, 1758
分布: 相模湾・富山湾以南, 世界の暖流海域(漂流する海藻に着生)
- 1966 *Notobryon wardi* Odhner, 1936 ユメウミウシ
産地: 小湊, 興津(林・堀越1988), 房総半島(奥谷・波部1975)
分布: 房総半島・山形県鼠ヶ関以南, 九州西岸, オーストラリア(水深10~200m, 砂泥・岩礁底)
- 1967 *Notobryon bijecurum* Baba, 1937 ウミトンボ
分布: 相模湾
- 1968 *Notobryon clavigerum* Baba, 1937 ツメウミウシ
分布: 相模湾
Family Fimbriidae
メリベウミウシ科
ムカデメリベ
- 1969 *Melibe pilosa* Pease, 1860
産地: 富津(千葉県企業庁1979), 館山湾(沖ノ島: お茶大館山1973; 奥谷ら*; 清水), 洲崎(お茶大館山1973), 太海(林・堀越1988), 小湊(猪野1942c; 林・堀越1988; 小池1994; 清水), 興津(林・堀越1988)
分布: 房総半島・青森県越作埼以南, 九州西岸(潮間帯~水深30m, 岩礁底)
- 1970 *Melibe papillosa* (de Filippi, 1867) ヒメメリベ
産地: 洲崎(お茶大館山1973), 太海(林・堀越1988), 小湊(Eliot, 1913; 林・堀越1988), 安房(馬場1949; 安部1965)
分布: 房総半島・新潟県以南, 九州西岸(潮間帯~水深30m, 岩礁底)
- 1971 *Melibe japonica* Eliot, 1913 ヤマトメリベ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
分布: 相模湾以南, 九州西岸(潮間帯~水深30m, 岩礁底)
Family Bornellidae
ユビウミウシ科
ヤマトユビウミウシ
- 1972 *Bornella japonica* Baba, 1949
分布: 相模湾・飛鳥以南, 九州西岸(潮間帯~水深30m, 岩礁底)
- 1973 *Bornella digitata* Adams & Reeve, 1850 ユビウミウシ
産地: 安房(馬場1949), 房州(馬場1947), 館山湾(お茶大館山1973)
分布: 房総半島以南, 宍岐, 九州西岸, インド・太平洋(潮間帯~水深30m, 岩礁底)
- 1974 *Pseudobornella orientalis* Baba, 1932 イトヒキウミウシ
分布: 相模湾, 大阪湾
Family Dotoidae
マツカサウミウシ科
マツカサウミウシ
- 1975 *Doto (Doto) japonica* Odhner, 1936
分布: 相模湾・佐渡島以南, 紀伊, 九州西岸(水深10~30m, クロガヤの上)
- 1976 *Doto (Doto) rosacea* Baba, 1949 バライロマツカサウミウシ
分布: 相模湾
- 1977 *Doto bella* Baba, 1938 コガネマツカサウミウシ
分布: 相模湾・新潟県以南, 瀬戸内海, 九州西岸(水深10~30m, 岩礁の海藻上)
- 1978 *Doto purpurea* Baba, 1949 スミレマツカサウミウシ
分布: 相模湾
- 1979 *Doto albida* Baba, 1955 シロマツカサウミウシ
分布: 相模湾
- 1980 *Gellina pacifica* Baba, 1949 ヒメマツカサウミウシ
分布: 相模湾
Family Phyllirhoidae
コノハウミウシ科
ササノハウミウシ
- 1981 *Cephalopyge trematoides* (Chun, 1889)
分布: 相模湾, 紀伊, 世界の海洋(浮遊性)
- 1982 *Phylliroe bucephala* Peron & Lesueur, 1810 コノハウミウシ
産地: 小湊(猪野1942c)
分布: 世界の各海洋(浮遊性)
Suborder Arminacea
Family Arminidae
タテジマウミウシ亜目
タテジマウミウシ科
タテジマウミウシ
- 1983 *Armina japonica* (Eliot, 1913)
分布: 陸奥湾以南, 九州西岸(水深10~60m, 砂泥底)
- 1984 *Armina semperi* (Bergh, 1866) ホソハスエラウミウシ
分布: 相模湾, フィリピン
- 1985 *Armina variolosa* (Bergh, 1904) サメハダシタウミウシ
産地: 房州(馬場1955)
分布: 房総半島以南, 中国(水深10~100m, 砂泥底)
- 1986 *Armina major* Baba, 1949 ダイオウタテジマウミウシ
分布: 相模湾(水深50~150m, 砂泥底)
- 1987 *Armina papillata* Baba, 1933 ニュウトウタテジマウミウシ
産地: 房州(馬場1947)

- 分布:房総半島以南,九州西岸(水深10~30m,砂泥底)
- 1988 *Armina magna* Baba, 1955 ハスエラタテジマウミウシ
産地:館山(馬場1937),房州(馬場1955)
分布:館山湾,相模湾,紀伊(水深10~100m,砂泥底)
- 1989 *Armina appendicula* Baba, 1949 アカタテジマウミウシ
分布:相模湾
- 1990 *Armina paucifoliata* Baba, 1955 サガミハスエラウミウシ
分布:相模湾
- 1991 *Armina babai* (Tchang, 1934) シタウミウシ
分布:相模湾以南,九州西岸(水深10~30m,砂泥底)
- 1992 *Armina fallax* (Bergh, 1904) エノシマシタウミウシ
分布:相模湾,九州西岸(水深10~60m,砂泥底)
- 1993 *Dermatobranchius otome* Baba, 1992 オトメウミウシ
産地:館山湾(奥谷ら*),小湊(林・堀越1988;Iijima,1998),安房(馬場1949;安部1964),房州(馬場1947)
- 1994 *Dermatobranchius striatellus* Baba, 1949 サメジマオトメウミウシ
分布:相模湾,紀伊半島,九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁底)
- 1995 *Dermatobranchius semistriatus* Baba, 1949 サギリオトメウミウシ
分布:相模湾
- 1996 *Dermatobranchius substriatus* Baba, 1949 ナジマオトメウミウシ
分布:相模湾
- 1997 *Dermatobranchius sagamius* Baba, 1949 サガミオトメウミウシ
分布:相模湾
- 1998 *Dermatobranchius multidentatus* Baba, 1949 ヤマトオトメウミウシ
分布:相模湾
- 1999 *Dermatobranchius (Pleuroleura) ornatus* (Bergh, 1874) ハナオトメウミウシ
分布:相模湾以南,九州西岸(水深10~60m,岩礁底)
- 2000 *Dermatobranchius (Pleuroleura) nigropunctatus* Baba, 1949 ホソジマオトメウミウシ
分布:相模湾,紀伊,九州西岸(水深10~200m,岩礁底)
- Family Dironidae
- 2001 *Madrella sanguinea* (Angas, 1864) アケボノウミウシ科
分布:相模湾以南,九州西岸,オーストラリア(潮間帯~水深20m,岩礁底) ショウジョウウミウシ
- 2002 *Madrella gloriosa* Baba, 1949 ハナショウジョウウミウシ
模式産地:相模湾佐島沖(水深16m) 分布:同
- 2003 *Madrella granularis* Baba, 1949 オニショウジョウウミウシ
模式産地:相模湾佐島沖(水深16m) 分布:同
- Suborder Aeolidacea
- Superfamily Pleuroproctoidea
- Family Coryphellidae
- 2004 *Coryphella athadona* Bergh, 1875 ミノウミウシ亜目
産地:館山湾(奥谷ら*) 側肛上科
コザクラミノウミウシ科
コザクラミノウミウシ
- 2005 *Coryphella rubrolineata* (O'Donoghue, 1929) セスジミノウミウシ
産地:館山湾(奥谷ら*)
分布:相模湾・富山湾以南,紀伊半島,瀬戸内海,敦賀湾,スエズ(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上)
- Family Flabellinidae
- 2006 *Flabellina ornata* (Risbec, 1928) サキシマミノウミウシ科
分布:相模湾,富山湾(ヤギ類の上) サキシマミノウミウシ
Family Eubranchildae
- 2007 *Eubranchildus misakiensis* Baba, 1960 ホリミノウミウシ科
分布:相模湾・佐渡島以南,九州西岸,サンフランシスコ湾(潮間帯~水深30m,海藻上) ミサキヒメミノウミウシ
- 2008 *Eubranchildus horii* Baba, 1960 ホリミノウミウシ
産地:館山湾(奥谷ら*)
- 2009 *Eubranchildus virginalis* (Baba, 1949) ジョオウミノウミウシ
分布:相模湾・佐渡島以南,瀬戸内海,九州西岸(潮間帯~水深30m,海藻上)
- Family Cuthonidae
- 2010 *Cuthona ornata* Baba, 1937 オショロミノウミウシ科
分布:相模湾・富山湾以南,志摩半島,瀬戸内海,九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上) フジエラミノウミウシ
- 2011 *Cuthona pinnifera* (Baba, 1949) ツバネミノウミウシ
分布:相模湾・富山湾以南,紀伊半島,瀬戸内海,九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上)
- 2012 *Cuthona futario* (Baba, 1963) フタイロミノウミウシ
分布:相模湾・青森県浅虫以南,紀伊半島,瀬戸内海,九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上)
- 2013 *Cuthona venusta* (Baba, 1949) ハナゾミノウミウシ
分布:相模湾
- 2014 *Cuthona anulata* (Baba, 1949) ツノワミノウミウシ
分布:相模湾,九州野母崎(潮間帯~水深30m,岩礁)
- 2015 *Cuthona alpha* Baba & Hamatani, 1963 コヅチミノウミウシ
分布:相模湾・富山湾以南,瀬戸内海(潮間帯~水深30m,岩礁底)
- 2016 *Cuthona akibai* Baba, 1984 アキバミノウミウシ

- 分布:相模湾
- 2017 *Subcuthona pallida* Baba, 1949
分布:相模湾・佐渡島以南, 富山湾(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上) マツヨイミノウミウシ
- 2018 *Catriona puellula* (Baba, 1955)
分布:相模湾, 富山湾 キリヒメミノウミウシ
- 2019 *Catriona nigricolora* (Baba, 1955)
分布:相模湾 クロミノウミウシ
- 2020 *Catriona purpureoanulata* Baba, 1961
分布:相模湾・粟島以南, 紀伊半島, 九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上) ユビワミノウミウシ
- 2021 *Embleloniella paucipapillata* (Baba & Hamatani, 1963)
分布:相模湾, 瀬戸内海(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上) ヨツマダミノウミウシ
Family Fionidae
- 2022 *Fiona pinnata* (Eschscholtz, 1831)
産地:館山湾(奥谷ら*)
分布:相模湾, 紀伊半島, 富山湾, 佐渡島(暖海の浮遊性) ヒダミノウミウシ科
Family Facelinidae ヒダミノウミウシ
- 2023 *Pteraeolidia ianthina* (Angas, 1864)
産地:小湊(林・堀越1988),安房(馬場1949)
分布:房総半島以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深30m,岩礁底) ヨツスジミノウミウシ科
ムカデミノウミウシ
- 2024 *Hervielia yatai* (Baba, 1930)
分布:相模湾・佐渡島以南, 紀伊半島, 九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上) ヤツミノウミウシ
- 2025 *Facelinella quadrilineata* (Baba, 1930)
タイプ産地:館山湾高ノ島 ヨツスジミノウミウシ
産地:小湊,興津(林・堀越1988),安房(馬場1949)
分布:陸奥湾以南,宮城県女川,房総半島,相模湾,愛知県菅島,大阪湾,長崎県平戸,日本海飛島,粟島,山形県,富山湾,敦賀湾(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上)
- 2026 *Facelinella anulifera* Baba, 1949
分布:相模湾 シヤクジョウミノウミウシ
- 2027 *Facelina bilineata* Hirano, 1998
タイプ産地:千葉県安房郡天津小湊町小湊
産地:小湊(平野1998)
- 2028 *Caloria militaris* (Alder & Hancock, 1864)
分布:相模湾以南, 福井県, 能登半島, 佐渡島, ハワイ, オーストラリア, 熱帯インド・太平洋 ヒブサミノウミウシ
Family Favorinidae トモエミノウミウシ科
ハクセンミノウミウシ
- 2029 *Cratena lineata* (Eliot, 1904)
産地:館山湾高ノ島(Baba,1930),小湊,興津(林・堀越1988),安房(馬場1949)
分布:房総半島・富山湾以南, 紀伊半島, 瀬戸内海, 九州西岸, 東アフリカ(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上)
- 2030 *Cratena affinis* Baba, 1949
分布:相模湾, 富山湾, 男女群島, 九州西岸(潮間帯,岩礁の海藻上) アカミノウミウシ
- 2031 *Sakuraeolis gerberina* (Hirano, 1999)
産地:小湊(林・堀越1988;Hirano,1999)
分布:房総半島以南, 富山湾(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上) ガーベラミノウミウシ
- 2032 *Sakuraeolis enosimensis* (Baba, 1930)
産地:江戸川放水路(市川市博1993),新浜(風呂田1977),船橋,盤洲沖(風呂田1983),木更津(風呂田1984),館山湾(お茶大館山1973;奥谷ら*),興津(林・堀越1988)
分布:陸奥湾・飛島以南, 九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上) アカエラミノウミウシ
- 2033 *Sakuraeolis sakuracea* Hirano, 1999
産地:小湊(Hirano,1999)
分布:房総半島, 相模湾 サクラミノウミウシ
- 2034 *Favorinus japonicus* Baba, 1949
分布:相模湾以南, 敦賀湾(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上) チゴミノウミウシ
- 2035 *Favorinus perfoliatus* Baba, 1949
分布:相模湾 ツノヒダミノウミウシ
- 2036 *Favorinus mirabilis* Baba, 1955
分布:相模湾 ウツセミノウミウシ
Family Myrrhinidae
- 2037 *Phyllodesmium serratum* (Baba, 1949)
産地:館山湾(奥谷ら*),小湊(林・堀越1988)
分布:房総半島・富山湾以南, 九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上) クセニアウミウシ科
Family Aeolidiidae サガミノウミウシ
- 2038 *Aeolidiella papillosa* (Linnaeus, 1761)
産地:館山湾(Baba,1930),安房,(馬場1949;安部1965),銚子(稲葉1963)
分布:三陸沿岸(大槌湾)以北, 陸奥湾, 北海道, 北太平洋, 北大西洋(潮間帯~水深30m,岩礁) オオミノウミウシ科
オオミノウミウシ
- 2039 *Aeolidiella takanoshimensis* Baba, 1930
模式産地:館山湾高ノ島 ミノウミウシ
産地:館山湾(高ノ島;Baba,1930;奥谷ら*),安房(馬場1949;安部1965),房州(馬場1947),興津(林・堀越1988)
分布:房総半島・秋田県以南, 四国, 九州(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上)
- 2040 *Aeolidiella japonica* Eliot, 1913
産地:館山湾(Baba,1930),安房,(馬場1949;安部1965),銚子(稲葉1963) ヤマトミノウミウシ

- 分布:房総半島・富山湾以南,九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁の海藻上)
- 2041 *Protoaeolidiella atra* Baba, 1955 スミゾメミノウミウシ
分布:相模湾,富山湾(水深10~20m,ヤギ類の上)
- 2042 *Cerberilla asamusiensis* Baba, 1940 カスミノウミウシ
分布:陸奥湾以南,九州西岸(浅海の砂底)
- 2043 *Cerberilla albopunctata* Baba, 1976 ハンミョウカスミノウミウシ
分布:房総半島以南,九州まで(砂中)
- 2044 *Berghia japonica* (Baba, 1933) ヤマトワグシウミウシ
分布:相模湾,富山湾,宍道,九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁底)
- 2045 *Berghia major* (Eliot, 1903) ワグシミノウミウシ
産地:小湊(林・堀越1988)
分布:房総半島,相模湾,九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁底)
- 2046 *Berghia fusiformis* Baba, 1949 ホソエラワグシウミウシ
分布:相模湾以南,瀬戸内海,九州西岸(潮間帯~水深30m,岩礁の改組上)
Family Glaucidae
アオミノウミウシ科
アオミノウミウシ
- 2047 *Glaucus atlanticus* Forster, 1777
分布:房総半島以南,世界の環赤道海域(浮遊性,ギンカクラゲ・カツオノカムリ・アサガオガイ等を捕食)
Subclass Pulmonata
Order Systellommatophora
Family Onchidiidae
有肺亜綱
収斂眼目
イソアワモチ科
イソアワモチ
- 2048 *Peronia verruculata* (Cuvier, 1830)
産地:竹岡,萩生(清水),館山湾(お茶大館山1973,奥谷ら*;清水),洲崎,白浜(お茶大館山1973),小湊(林・堀越1988;小池1994;清水),興津(林・堀越1988),銚子(稲葉1963)房総(黒田・波部1965),房総半島(奥谷・波部1975)
分布:石狩湾・房総半島以南,四国,九州,奄美,沖縄,インド・太平洋(潮間帯,岩礁)
- 2049 *Onchidella kurodai* (Iw. Taki, 1935) ヒメアワモチ
産地:館山湾(奥谷ら*;清水),小湊(林・堀越1988;小池1994)
分布:房総半島以南,四国,九州(内湾の潮間帯,岩礁の海藻上)
- 2050 *Onchidella orientalis* (Iw. Taki, 1935) ヤマトヒメアワモチ
分布:相模湾以南,四国,九州,奄美(潮間帯,クロイソカイメン等に着生)
Order Basommatophora
Superfamily Trimusculoidea
Family Trimusculidae
基眼目
ユキカラマツガイ上科
ユキカラマツガイ科
チャイロカラマツガイ
- 2051 *Trimusculus yamamotoi* Habe, 1959
分布:房総半島~紀伊半島(水深10m,岩礁)
Superfamily Siphonarioidea
Family Siphonariidae
カラマツガイ上科
カラマツガイ科
キクノハナガイ
- 2052 *Siphonaria (Anthosiphonaria) sirius* Pilsbry, 1894
産地:竹岡,萩生,勝山,富山,富浦(清水),館山湾(お茶大館山1973;佐々木1989;村越1998;奥谷ら*;清水),布良,白浜,千倉(清水),太海(大島1993;清水),鴨川(清水),天津(大島1993;清水),小湊(猪野1942c;大島1993;小池1994;Iijima, 1998;清水),安房(岩川1905),浜行川(大島1993;清水),勝浦(清水),御宿(大島1993),銚子(稲葉1963;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:三陸南部・男鹿半島以南,四国,九州,奄美,沖縄,朝鮮(潮間帯,岩礁)
- 2053 *Siphonaria (Sacculosiphonaria) japonica* (Donovan, 1824) カラマツガイ
産地:竹岡,萩生,勝山,富山,富浦(清水),館山湾(佐々木1989;堀越1990;村越1998;奥谷ら*;清水),洲崎(福井市博1962),布良,白浜,千倉(清水),太海,鴨川,天津(大島1993;清水),小湊(猪野1942c;大島1993;小池1994;Iijima, 1998;清水),安房(岩川1905),勝浦,御宿,大原(大島1993;清水),銚子(稲葉1963;宇野ら1965;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:北海道南部・秋田県以南,本州,四国,九州,朝鮮,中国北部(潮間帯,岩礁)
- 2054 *Siphonaria (Planesiphon) acmaeoides* Pilsbry, 1894 シロカラマツガイ
タイプ産地:房総半島
産地:館山湾(佐々木1989;堀越1990;村越1998;奥谷ら*);天津(大島1993),銚子(稲葉1963),房総半島(Pilsbry 1894)
分布:房総半島・男鹿半島以南,四国,九州,奄美,翁湾(潮間帯,岩礁)
- 2055 *Williamia radiata* (Pease, 1860) テリカラマツ
産地:館山湾(佐々木1990;奥谷ら*)
分布:駿河湾・但馬沿岸以南,四国,九州,奄美,沖縄,台湾(潮間帯,岩礁)
Superfamily Ellobioidea
Family Ellobiidae
オカミガイ上科
オカミガイ科
マキシジコミガイ
- 2056 *Laemodonta monilifera* (H. & A. Adams, 1854)
産地:鴨川市太海(稲葉1975in成毛1999;黒住2000),銚子市(黒住2000)
分布:房総半島・三浦半島・島根半島以南,四国,九州,奄美,沖縄,熱帯インド・太平洋(潮上帯,岩礁)
- 2057 *Laemodonta exaratooides* Kuroda, 1957 ウスコミガイ
分布:東北地方から九州,朝鮮半島南部(やや内湾の潮間帯上部,転石下)
- 2058 *Allochroa layardi* (H. & A. Adams, 1854) カシノメガイ
産地:白浜町長尾川(稲葉1975;成毛1999)
分布:房総半島;紀伊半島以南,四国,九州西岸,奄美,沖縄,台湾(潮間帯,岩礁)
- 2059 *Ellobium chinense* (Pfeiffer, 1854) オカミガイ
産地:江戸川放水路(黒住・岡本1996),小櫃川河口干潟(和田ら1996),県内から絶滅(黒住1977;1997;2000)
分布:東京湾・山口県北部以南,四国,九州,奄美,沖縄,台湾(内湾干潟のアシ原や磯底)
- 2060 *Microtralia alba* (Gassies, 1865) ナギサノシタタリ
産地:千葉市(黒住2000),勝浦市(成毛1999)
分布:北海道函館,岩手県,千葉県,徳島県,山口県北部,九州(潮上帯,岩礁間)

- 2061 *Melampus nuxeastaneus* Kuroda, 1949
産地:竹岡,萩生,富浦(清水),館山湾(村越1998;黒住2000;清水),那古(成毛1999),布良(清水),白浜,鴨川(黒住2000;清水),小湊(成毛1999;黒住2000;清水),勝浦(大島1993);銚子(鶴岡ら1994)
分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, フィリピン, 太平洋(潮間帯, 岩礁)
Family Carychiidae
ケンガイ科
スジケシガイ
- 2062 *Carychium noduliferum* Reinhardt, 1877
産地:陸沢町,柳町(成毛1999)
分布:房総半島・秋田県以南, 四国, 奄美, 朝鮮, 台湾(陸産)
- 2063 *Carychium pessimum* Pilsbry, 1902
産地:銚子市(成毛1999)
分布:青森県以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 朝鮮, 台湾(陸産)
- 2064 *Carychium nipponense* Pilsbry & Hirase, 1904
産地:銚子市,東金市,鴨川市(成毛1999)
分布:奥羽地方以南, 四国, 隠岐(陸産)
Superfamily Amphiboloidea
ウミマイマイ上科
Family Lymnaeidae
モノアラガイ科
ヒメモノアラガイ
- 2065 *Austropelea ollula* (Gould, 1859)
産地:柏市(岡本1990),我孫子市,佐倉市,多古町(成毛1999)
分布:北海道, 本州, 四国, 九州, 台湾, 中国(淡水産)
- 2066 *Radix (Radix) japonia* Jay, 1857
産地:銚子市,成田市,本埜村甚兵衛沼,八日市場市,鴨川市(成毛1999)
分布:北海道, 本州, 四国, 九州(淡水産)
Family Physidae
モノアラガイ
サカマキガイ科
サカマキガイ
- 2067 *Physa acuta* Draparnaud, 1805
産地:柏市(岡本,1985),我孫子市,印旛沼,小見川町,海上町,東金市,大網白里町,長柄町,丸山町(成毛1999),岡本(1976)
分布:北海道以南, 本州, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, アジア, ヨーロッパ(淡水産)
- 2068 *Physa fontinalis* (Linnaeus, 1758)
分布:本州(淡水産)
Family Planorbidae
ウスカワヒダリマキガイ
ヒラマキガイ科
トウキョウヒラマキガイ
- 2069 *Gyraulus tokyoensis* (Mori, 1938)
産地:成田市(印旛沼),本埜村甚兵衛沼(成毛1999)
分布:東京, 千葉県, 沖縄(淡水産)
- 2070 *Gyraulus chinensis spirilus* Gould, 1859
産地:本埜村甚兵衛沼(成毛1999)
分布:北海道, 本州, 四国, 九州, 奄美, 朝鮮(淡水産)
- 2071 *Gyraulus illibatus* (Westerlund, 1883)
分布:千島, 北海道, 本州, 四国, 九州, 珠美, 沖縄, 台湾, 朝鮮(淡水産)
- 2072 *Polypylis hemisphaerula* (Benson, 1842)
産地:成田市(印旛沼)(成毛1999)
分布:北海道, 本州, 四国, 九州(淡水産)
Family Ferrissidae
ヒラマキガイモドキ
カワコザラガイ科
カワコザラ
- 2073 *Laevapex nipponica* (Kuroda, 1947)
産地:印旛村(印旛沼),東庄町,大多喜町(養老川)(成毛1999)
分布:本州, 四国, 九州(淡水産)
Order Stylommatophora
柄眼目
Suborder Orthurethra
直輸尿管亜目
Family Valloniidae
ミジンマイマイ科
ミジンマイマイ
- 2074 *Vallonia costata* (Miller, 1774)
産地:白浜町根本(成毛1999)(陸産)
Family Vertiginidae
キバサナギガイ科
ナタネキバサナギガイ
- 2075 *Vertigo eogia* Pilsbry, 1919
千葉市(黒住2000)(陸産)
- 2076 *Gastrocopta (Sinalbinula) armigerella armigerella* (Reinhardt, 1877)
産地:千葉市(黒住ら1996),白浜町根本(成毛1999)(陸産)
Family Enidae
スナガイ
キセルガイモドキ科
キセルモドキ
- 2077 *Mirus reinianus* (Kobelt, 1875)
産地:大多喜町,大栄町,館山市(成毛1999),君津市,富津市,鋸山,富山町,大網白里町,清澄山(黒住2000)(陸産)
Suborder Heterurethra
異輸尿管亜目
Family Succineidae
オカモノアラガイ科
ナガオカモノアラガイ
- 2078 *Oxyloma hirasei* (Pilsbry, 1901)
産地:印旛沼,東庄町,山田町,光町,銚子市(成毛1999),千葉市,市原市,君津市(黒住ら1996)(陸産)
- 2079 *Neosuccinea horticola* (Reinhardt, 1877)
産地:我孫子市,銚子市(成毛1999)(陸産)
Suborder Mesurethra
ヒメオカモノアラガイ
Family Clausiliidae
中輸尿管亜目
キセルガイ科
ヒカリギセル
- 2080 *Zapychopsis buschi* (Pfeiffer, 1846)
産地:県内に広く分布(成毛1999)(陸産)
- 2081 *Pinguiphaedusa hakonensis* (Pilsbry, 1900)
ハコネギセル

- 産地:市原市,君津市,長南町,大多喜町,睦沢町,鯨南町,天津小湊町,白浜町(成毛1999)(陸産)
- 2082 *Mundiphaedusa dorcas* (Pilsbry, 1902) オクガタギセル
産地:市原市(大福山:成毛1999),君津市(三石山:成毛1999),清澄山(笹生1983)(陸産)
- 2083 *Mundiphaedusa sericina* (Moellendorff, 1882) チュウゼンジギセル
産地:下総町(成毛1999),佐倉市,佐原市,長南町,君津市,鯨山,館山市(黒住2000)(陸産)
- 2084 *Mundiphaedusa kawamurai* Kuroda & Habe (MS) カワムラギセル
産地:館山市(成毛1999)(陸産)
- 2085 *Mundiphaedusa* sp.
産地:君津市(三石山:成毛1999)(陸産)
- 2086 *Vitriphaedusa micropas* (Moellendorff, 1882) ヒメギセル
産地:市原市(大福山:黒住ら1994a;成毛1999)(陸産)
- 2087 *Stereophaedusa (Stereophaedusa) japonica japonica* (Crosse, 1871) ナミギセル
産地:県内に広く分布(成毛1999)(陸産)
- 2088 *Stereophaedusa (Stereophaedusa) oostoma* (Moellendorff, 1882) ウツミギセル
産地:鯨山(稲葉1975in成毛1999)(陸産)
- 2089 *Stereophaedusa (Breviphaedusa) gouldi* (A. Adams, 1868) ヒクギセル
産地:睦沢町,市原市,君津市,大多喜町,蟬町,御宿町,富山町,館山市,白浜町(成毛1999)(陸産)
- 2090 *Euphaedusa tau tau* (Boettger, 1877) ナミコギセル
産地:成田市,下総町,千葉市,多古町,八日市場市,成東町,御宿町(成毛1999)(陸産)
- 2091 *Euphaedusa digonopyx* (Boettger, 1877) オオタキコギセル
産地:印西町,下総町,銚子市,海上町,成東町(成毛1999;黒住2000),成田市,栄町(黒住2000)(陸産)
- Suborder Sigmouretbra
Family Subulinidae
- 2092 *Allopeas javanicum* (Reeve, 1849) 曲輸尿管亜目
産地:佐倉市,山田町,銚子市,茂原市,館山市(成毛1999)(陸産) オカチョウジガイ科
トクサオカチョウジガイ
- 2093 *Allopeas pyrgula* (Schmacker & Boettger, 1891) ホソオカチョウジガイ
産地:成田市,小見川町,銚子市,木更津市,白浜町(成毛1999)(陸産)
- 2094 *Allopeas brevispira* (Pilsbry & Hirase, 1904) マルオカチョウジガイ
産地:東金市,白浜町(成毛1999)(陸産)
- Family Punctidae
2095 *Punctum ambygonum* (Reinhardt, 1877) ナタネガイ科
産地:松戸市(稲葉1975in成毛1999)(陸産) ナタネガイ
Family Discidae
2096 *Discus pauper* (Gould, 1859) パツラマイマイ科
産地:柏市(岡本1990;成毛1999),下総町,成田市,佐倉市,佐原市,小見川町,東庄町,銚子市,海上町,多古町,松尾町,白浜町(成毛1999)(陸産) パツラマイマイ
Family Arionidae
2097 *Nipponolimax carinatus* Yamaguchi & Habe, 1955 クロコウラナメクジ科
産地:市川市,長南町(稲葉1975in成毛1999)(陸産) オオコウラナメクジ
Family Philomycidae
2098 *Meghimatium bilineatum* (Benson, 1842) ナメクジ科
産地:銚子市(成毛1999)(陸産) ナメクジ
2099 *Meghimatium fruhstorferi* (Collinge, 1901) ヤマナメクジ
産地:海上町(成毛1999)(陸産)
Family Limacidae
2100 *Limax flavus* Linnaeus, 1758 コウラナメクジ科
産地:銚子市,我孫子市(成毛1999)(陸産) コウラナメクジ
2101 *Limax marginatus* Muller, 1758 チャコウラナメクジ
産地:柏市,成田市,鯨山,館山市(成毛1999)(陸産)
2102 *Deroceras varians* (A. Adams, 1868) ノコウラナメクジ
産地:柏市,袖ヶ浦町,高宕山(成毛1999)(陸産)
2103 *Deroceras reticulatum* (Müller, 1774) ノハラナメクジ
産地:我孫子市(成毛1999)(陸産)
Family Streptaxidae
2104 *Sinoennea iwakawa* (Pilsbry, 1900) タワラガイ科
産地:佐原市,佐倉市,銚子市,市原市,大多喜町,鯨南町,富山町(成毛1999)(陸産) タワラガイ
Family Zonitidae
2105 *Hwaïia minuscula* (Binney, 1840) コハクガイ科
産地:柏市,鹿野山,富山町(成毛1999)(陸産) ヒメコハクガイ
2106 *Zonitoides arboreus* (Say, 1816) コハクガイ
産地:佐倉市,千葉市,松尾町(成毛1999)(陸産)
Family Helicarionidae
2107 *Trochochlamys crenulata crenulata* (Gude, 1900) ベッコウマイマイ科
産地:佐原市,小見川町,東庄町,銚子市,海上町,芝山町,大多喜町,白浜町(成毛1999)(陸産) カサキビ
2108 *Trochochlamys praealta praealta* (Pilsbry, 1902) タカキビ
産地:富山町(稲葉1975in成毛1999)(陸産)
2109 *Trochochlamys subcrenulata subcrenulata* (Pilsbry, 1901) ヒメカサキビ
産地:君津市三石山(前田ら1972;成毛1999),木更津市(黒住2000)(陸産)
2110 *Trochochlamys fraterna* (Pilsbry, 1900) オオウエキビ

- 産地: 君津市三石山(前田ら1972; 稲葉1975; 前田ら1990; 成毛1999)(陸産)
- 2111 *Parakaliella harimensis* (Pilsbry, 1901) ハリマキビ
産地: 銚子市, 東金市, 岨町, 白浜町(成毛1999)(陸産)
- 2112 *Gastrodontella stenogyra* (A. Adams, 1868) キビガイ
産地: 銚子市, 鴨川市仁右衛門島(成毛1999)(陸産)
- 2113 *Sitalina circumcincta* (Reinhardt, 1883) コシタカシガラ
産地: 千葉市(黒住ら1996), 天津小湊町(成毛1999)(陸産)
- 2114 *Sitalina japonica* Habe, 1964 ウメムラシガラ
産地: 白浜町(成毛1999)(陸産)
- 2115 *Parasitala reinhardti* (Pilsbry, 1900) マルシガラ
産地: 我孫子市, 東庄町, 銚子市, 旭市, 市原市大福山(成毛1999)(陸産)
- 2116 *Yamatochlamys vaga vaga* (Pilsbry & Hirase, 1904) ナミヒメベッコウ
産地: 成田市, 栢市, 筑森(稲葉1975in成毛1999)(陸産)
- 2117 *Urazirochlamys doenitzii* (Reinhardt, 1877) ウラジロベッコウ
産地: 成田市, 小見川町, 東金市, 長南町, 館山市(成毛1999)(陸産)
- 2118 *Nipponochlamys semisericata* (Pilsbry, 1902) キヌツヤベッコウ
産地: 千葉市, 白浜町(成毛1999)(陸産)
- 2119 *Otiosopsis japonica* (Moellendorff, 1885) レンズガイ
産地: 市原市, 夷隅町, 和田町(成毛1999), 君津市三石山, 鋸山(黒住2000)(陸産)
Family Camaenidae
- 2120 *Satsuma (Sotsuma) japonica japonica* (Pfeiffer, 1847) ナンバンマイマイ科
産地: 県内に広く分布(成毛1999)(陸産)
ニッポンマイマイ
- 2121 *Nipponochloritis fragilis* (Gude, 1900) ケハダビロウドマイマイ
産地: 市原市, 陸沢村, 鋸南町, 勝浦市, 丸山町(成毛1999)(陸産)
- 2122 *Nipponochloritis oscitans oscitans* (Martens, 1881) ビロウドマイマイ
産地: 龜山(稲葉1975in成毛1999)(陸産)
- 2123 *Nipponochloritis oscitans kiyosumienensis* Azuma, 1982 キヨスミビロウドマイマイ
タイプ産地: 清澄山
産地: 清澄山(Azuma 1982), 市原市, 君津市, 陸沢村, 勝浦市, 鋸南町, 丸山町, 天津小湊町(黒住2000)(陸産)
- 2124 *Nipponochloritis pumila pumila* (Gude, 1902) キヌビロウドマイマイ
産地: 君津市, 岨町, 丸山町(成毛1999)(陸産)
- 2125 *Nipponochloritis pumila kantoensis* Sorita, 1986 カントウビロウドマイマイ
産地: 千葉市, 長南町, 岨町, 君津市, 丸山町(黒住2000), 三石山(成毛1999)(陸産)
Family Bradibaenidae
- 2126 *Aegista (Aegista) proba goniosoma* (Pilsbry & Hirase, 1904) オナジマイマイ科
産地: 鋸山(成毛1999), 和田町, 君津市(黒住2000)(陸産)
カドコオオベソマイマイ
- 2127 *Aegista (Aegista) tokyoensis* Sorita, 1980 トウキョウコオオベソマイマイ
産地: 佐倉市, 佐原市, 小見川町, 東庄町, 銚子市, 海上町, 旭市(成毛1999; 黒住2000)(陸産)
- 2128 *Aegista (Aegista) tokyoensis choshiensis* Sakurai & Sorita, 1983 チョウシコオオベソマイマイ
タイプ産地: 銚子市南町円福寺境内(陸産)
産地: 銚子(Sakurai & Sorita 1982; 長谷川・斎藤1995)
- 2129 *Aegista (Plectoropis) vulgivaga* (Schmacker & Boettger, 1890) オオケマイマイ
産地: 陸沢村, 長南町, 大多喜町, 鋸南町, 館山市(成毛1999)(陸産)
- 2130 *Trishoplita conospira* (Pfeiffer, 1851) エンスイマイマイ
産地: 鹿野山(成毛1999)(陸産)
- 2131 *Trishoplita commoda commoda* (A. Adams, 1868) マメマイマイ
産地: 佐原市, 海上町, 銚子市, 八日市場市, 横芝町, 千葉市, 君津市, 陸沢村, 勝浦市, 鴨川市(成毛1999)(陸産)
- 2132 *Bradybaena similis* (Ferussac, 1831) オナジマイマイ
産地: 小見川町, 銚子市, 松尾町, 葦沼町, 千葉市, 御宿町, 鴨川市, 館山市(成毛1999)(陸産)
- 2133 *Bradybaena pellucida* Kuroda & Habe in Habe, 1953 コハクオナジマイマイ
産地: 海上町(成毛1999), 館山市(岡本1992; 成毛1999)(陸産)
- 2134 *Acusta despecta sieboldiana* (Pfeiffer, 1850) ウスカワマイマイ
産地: 我孫子市, 鎌ヶ谷市, 本基村, 東庄町, 銚子市, 海上町, 八日市場市, 茂原市, 長柄町, 鴨川市(成毛1999), 館山市(清水)(陸産)
- 2135 *Euhadra peliomphala peliomphala* (Pfeiffer, 1850) ミスジマイマイ
産地: *E. brandtii* ヒタチマイマイ分布域を除く県内(成毛1999), 千葉市(神奈川県博1972)(陸産)
- 2136 *Euhadra peliomphala nimbose* (Crosse, 1868) トラマイマイ
産地: 鹿野山(成毛1999)(陸産)
- 2137 *Euhadra brandtii brandtii* (Kobelt, 1875) ヒタチマイマイ
産地: 我孫子市, 佐原市, 小見川町, 佐倉市, 成田市, 多古町, 旭市, 八日市場市, 光町(成毛1999), 銚子市(神奈川県博1972; 成毛1999)(陸産)
- 2138 *Euhadra quaesita quaesita* (Deshayes, 1850) ヒダリマキマイマイ
産地: 県内に広く分布(成毛1999)(陸産)
- 2139 *Euhadra quaesita montium* (Martens, 1879) チャイロヒダリマキマイマイ
産地: 君津市, 大多喜町(成毛1999)(陸産)

- Class Scaphopoda**
Order Dentalioida
Family Dentaliidae
- 2140 *Dentalium (Paradentalium) octangulatum* Donovan, 1804
産地: 竹岡, 萩生(清水), 保田(水深81m: 千葉水試1980b; 清水), 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(水深84m: 藤田1929a; お茶大館山1973; 堀越1990; 村越1993; 奥谷ら*; 清水), 布良, 白浜(清水), 太海, 鴨川, 天津(大島1993; 清水), 小湊(岩川1905; 猪野1942c; 大島1993; 清水), 安房(岩川1905), 浜行川(大島1993; 清水), 大原(清水), 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
分布: 北海道南部・佐渡島以南, 四国, 九州, インド・太平洋(潮下部~水深100m, 細砂泥底)
- 2141 *Fissidentalium kawamurai* Kuroda & Habe in Habe, 1961
産地: 洲崎沖2km, 水深290m(黒田ら1971)
分布: 房総半島以南, 四国, 九州南岸(水深100~400m, 砂底)
- 2142 *Picidentalium vernelei* (Sowcrby II, 1860)
産地: 小湊(猪野1942c), 安房(岩川1905), 銚子(鹿股ら1962)
分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 東シナ海, 中国(水深20~1,000m, 砂泥底)
- 2143 *Compressidentalium hungerfordi* (Pilsbry & Sharp, 1897)
産地: 竹岡, 萩生(清水), 館山湾(水深84m: 藤田1929a; 村越1993; 奥谷ら*), 小湊(猪野1942c; 清水), 銚子(渡辺1988), 房総半島(Habe 1964)
分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 東シナ海, 中国, インドネシア(水深50~1,570m, 砂泥底)
- 2144 *Antalis tibatum* (Nomura, 1940)
タイプ産地: 安房郡千倉沖
産地: 館山湾(堀越1990; 村越1998), 千倉沖(Nomura, 1940), 勝浦, 大原(大島1993), 銚子(稲葉1963), 房総半島(Habe 1964)
分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(水深10~200m, 砂底)
- 2145 *Antalis weinkauffi* (Dunker, 1877)
産地: 竹岡, 萩生, 富浦(清水), 館山湾(水深84m: 藤田1929a; 村越1993; 奥谷ら*), 太海, 鴨川, 天津(大島1993), 小湊(猪野1942c; 大島1993; 清水), 浜行川(大島1993), 銚子(鶴岡ら1994)
分布: 津軽・下北半島以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深15~550m, 砂泥底)
- 2146 *Striodentalium rhabdotum* (Pilsbry, 1905)
産地: 太海(大島1993), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 神奈川県博1991)
分布: 北海道南部・男鹿半島以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深20~620m, 泥底)
- 2147 *Graptacme buccinulum* (Gould, 1859)
産地: 館山湾(佐々木1989; 村越1998; 奥谷ら*), 安房(福井市博1962), 勝浦(大島1993)
分布: 三陸沿岸・佐渡島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 中国(潮間帯~水深150m, 砂底)
- Family Calliodentaliidae**
- 2148 *Calliodentalium crocinum* (Dall, 1907)
タイプ産地: 東京湾口(水深88fms)
産地: 小湊(大島1993)
分布: 房総半島・富山湾以南, 四国, 九州, 中国(水深80~300m, 砂泥底)
- Family Fustiariidae**
- 2149 *Fustiaria nipponica* (Yokoyama, 1922)
タイプ産地: 千葉県市原市市東(化石)
産地: 銚子(稲葉1963; Habe 1964)
分布: 鹿島灘・但馬沖以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, フィリピン, 中国, インドネシア, インド洋(潮下部~水深100m, 砂底)
- Family Gadiliniidae**
- 2150 *Gadilina insoluta* (E. A. Smith, 1894)
産地: 銚子(Habe 1964)
分布: 房総半島・富山湾以南, 四国, 九州, インドネシア, 西太平洋(水深2080~1,134m, 泥底)
- 2151 *Episiphon subrectum* (Jeffreys, 1833)
産地: 富山(水深51m砂底: 千葉水試1980b; 水深22.5~48.5m砂泥底: 水産庁1982), 館山湾(水深30.0m砂泥底: 水産庁1982; 奥谷ら*), 小湊(猪野1942c), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 陸奥湾・佐渡島以南, 四国, 九州, 沖縄, インドネシア(水深5~300m, 砂泥底)
- 2152 *Episiphon candellatum* (Kira, 1959)
模式産地: 土佐湾(水深80~100fms)
産地: 銚子(稲葉1963)
分布: 三陸南部以南, 四国(水深100~200m, 砂泥底)
- Family Laevidentaliidae**
- 2153 *Laevidentalium longitorsum* (Reeve, 1842)
産地: 太海, 小湊(大島1993), 銚子(Habe 1964)
分布: 房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(水深50~200m, 砂泥底)
- 2154 *Laevidentalium toyamense* (Kuroda & Kikuchi, 1933)
分布: 相模湾・男鹿半島以南, 駿河湾, 但馬沖(水深200~1,400m, 泥底)
- 2155 *Laevidentalium sominium* Okutani, 1964
分布: 鹿島灘以南, 相模湾, 駿河湾(水深620~1,400m, 泥底)
- 2156 *Laevidentalium yamakawai* Yokoyama, 1927
分布: 太平洋側(35° N), 日本海側(36° ~41° N)(水深20~60m, 細砂底)
- 2157 *Laevidentalium coruscum* (Pilsbry, 1905)
産地: 小湊(猪野1942c)
- Family Omniglyptidae**
- 2158 *Omniglypta cerina* (Pilsbry, 1905)
産地: 館山湾水深25m砂底(千葉水試1980b), 銚子(櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 三陸沿岸・北海道南部以南, 四国, 九州西岸, インドネシア(潮下部~水深1,886m, 泥底)
- Order Gadilida**
Family Entalinidae
- 2159 *Entalinopsis intercostata* (Boissevain, 1906)
産地: 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
分布: 津軽海峡・日本海久六島以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深50~500m, 砂泥底)
- 2160 *Entalinopsis habitae* (Kuroda & Kikuchi, 1933)

掘足綱

ツノガイ目

ゾウゲツノガイ科

ヤカドツノガイ

カワムラツノガイ

マルツノガイ

ヒラツノガイ

ミガキマルツノ

ツノガイ

ムチツノガイ

ヒメナガツノガイ

サフランツノガイ科

サフランツノガイ

サケツノガイ科

サケツノガイ

シラサヤツノガイ科

シラサヤツノガイ

ロウソクツノガイ科

ロウソクツノガイ

ワロウソクツノガイ

セトモノツノガイ科

ミガキツノガイ

トヤマツノガイ

マボロシツノガイ

ヤマカワツノガイ

ハリツノガイ科

ハリツノガイ

クチキレツノガイ目

ミカドツノガイ科

ユキツノガイ

ハブタエツノガイ

- 産地: 館山湾水深11.5m砂泥底(水産庁1982), 太海, 小湊(大島1993), 銚子(稲葉1963)
 分布: 津軽海峡・富山湾以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深50~500m, 砂底)
- 2161 *Bathoxiphus tricarinatus* (Boissevain, 1906) ヒシツノガイ
 分布: 相模湾以南, インドネシア, インド洋(水深693~1,900m, 砂底)
- 2162 *Entalina quadrangularis* Boissevain, 1906 ミカドツノガイ
 分布: 相模湾以南, 四国, インドネシア(水深200~1,300m, 砂底, 砂泥底)
 Family Pussellidae
 ヒゲツノガイ科
 ヒゲツノガイ
- 2163 *Pusellum hige* Habe, 1963
 産地: 小湊(猪野1942c), 銚子(渡辺1988)
 分布: 北海道南部・男鹿半島以南, 本州, 四国, 九州(潮下部, 砂泥底)
- 2164 *Pusellum kurogenge* Habe & Kosuge, 1964 クロゲンゲヒゲツノガイ
 タイプ産地: 千葉県銚子沖(水深約350m)
 産地: 銚子(Habe & Kosuge1964; 渡辺1988)
 分布: 銚子沖(水深350m, クロゲンゲ(魚類)の胃中から採集)
 Family Gadilidae
 クチキレツノガイ科
 ニッポンクチキレツノガイ
- 2165 *Siphonodentalium japonicum* Habe, 1960
 産地: 太海(大島1993)
 分布: 岩手県以南, 四国, 九州西岸(水深30~300m, 砂底)
- 2166 *Siphonodentalium isaotakii* Habe, 1953 クチキレツノガイ
 タイプ産地: 東京湾
 産地: 館山湾(村越1998), 東京湾(Habe1953)
 分布: 北海道南部・若狭湾以南, 本州, 四国, 九州西岸(内湾の水深5~400m, 泥底)
- 2167 *Gadela sagamiensis* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 サガミハラブツノガイ
 産地: 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
 分布: 相模湾, 駿河湾(水深400~780m, 粗砂泥底)
- 2168 *Dischides belcheri* (Pilsbry & Sharp, 1897) フタマタツノガイ
 産地: 房総半島(Habe 1964)
 分布: 房総半島・但馬沖以南, 四国, 九州, 台湾(潮間帯~水深50m, 砂底)
- 2169 *Polyschides sakuraii* (Kuroda & Habe in Habe, 1961) サクライハラブツノガイ
 タイプ産地: 銚子沖(水深約200m)
 産地: 銚子(Kuroda & Habe1961; 稲葉1963; Habe 1964; 櫻井1964; 渡辺1988; 長谷川・斉藤1995)
 分布: 相模湾以北, 北海道恵山沖(水深100~1,400m, 泥底)
- 2170 *Polyschides magnus* (Boissevain, 1906) ダイオウハラブツノガイ
 分布: 相模湾以南, 四国, インドネシア(水深300~1,310m, 砂泥底)
- 2171 *Polyschides fausta* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 カホウハラブツノガイ
 分布: 相模湾, 駿河湾(水深50~100m, 粗砂底)
- 2172 *Gadila opportunus* Kuroda & Habe in Habe, 1961 ハラブツノガイ
 タイプ産地: 銚子沖(水深200m)
 産地: 銚子(Kuroda & Habe1961; 鹿股ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
 分布: 鹿島灘以南, 相模湾, 駿河湾(水深200~780m, 泥底)
- 2173 *Gadila virginalis* (Boissevain, 1906) ユミハリハラブツノガイ
 産地: 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
 分布: 銚子以南, 紀伊半島, 土佐沖~インドネシア(水深200~3,100m, 砂底)
- 2174 *Sagamiacadulus elegantissimus* Sakurai & Shimazu, 1963 ユウビハラブツノガイ
 分布: 相模湾, 駿河湾(水深50~150m, 粗砂底)

- Class Bivalvia
 Subclass Protobranchia
 Order Solemyoidea
 Superfamily Solemyacea
 Family Solemyidae
- 2175 *Petrasma pusilla* (Gould, 1861)
 産地: 館山湾水深24.0m砂底(水産庁1982), 小湊(猪野1942d; 神奈川県博1972), 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
 分布: 北海道南部以南, 本州, 四国, 九州(潮間帯~水深200m, 砂泥底)
- 2176 *Petrasma pervernicosa* (Kuroda, 1948)
 産地: 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
 分布: 紀伊半島以北, 北海道, オホーツク海, 日本海(水深100~500m, 砂泥底)
- 2177 *Acharax japonica* (Dunker, 1882)
 産地: 小湊(波部1950; 大島1993), 銚子(Shikama 1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
 分布: 北海道南部・山形県以南, 四国, 九州(潮間帯~水深20m, 砂泥底)
- 2178 *Acharax johnsoni* (Dall, 1891)
 産地: 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 鹿間1964; 櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
 分布: 相模湾以北, 北海道, ベーリング海, 北米西岸(水深100~500m, 泥底)
- Superfamily Nucinellacea
 Family Nucinellidae
- 2179 *Nucinella viridis* Matsukuma, Okutani & Tsuchi, 1982
 タイプ産地: 野島埼沖(水深2,630~2,890m)
 分布: 同(上深海帯)
- 2180 *Huxleyia sulcata* A. Adams, 1860
 産地: 館山湾(奥谷ら*), 銚子(稲葉1963)
 分布: 房総半島・富山湾以南, 四国, 九州西岸(水深100~200m, 砂泥底)
- Order Nucinellidae
 Superfamily Nuculacea
 Family Nuculidae
- 2181 *Nucula paulula* A. Adams, 1856
 産地: 中ノ瀬(風呂田1986a), 竹岡水深17.5m砂底(水産庁1982), 保田水深81m砂泥底(千葉水試1980b), 館山湾(佐々木1989; 村越1998; 奥谷ら*), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964)
 分布: 三陸沿岸・佐渡島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深150m, 砂泥底)
- 2182 *Nucula (Lamellinucula) tokyoensis* Yokoyama, 1920
 模式産地: 横浜市戸塚区(長沼層, 化石)
 分布: 房総半島以南, 四国, 対馬, 九州西岸, 東シナ海(水深50~200m, 砂泥底)
- 2183 *Nucula (Lamellinucula) torresi gemmulata* Habe, 1953
 分布: 相模湾以南, 四国, 九州西岸(水深50~200m, 砂底)
- 2184 *Acila divaricata divaricata* (Hinds, 1843)
 産地: 竹岡(清水), 館山湾(水深84m; 藤田1929a; 清水), 天津, 小湊(猪野1942d; 大島1993; 清水), 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988; 鶴岡ら1994; 清水)
 分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(水深50~335m, 砂泥底)
- 2185 *Acila divaricata schencki* Kira, 1959
 産地: 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988)
 分布: 銚子以南, 四国沖, 九州(水深50~200m, 砂泥底)
- 2186 *Acila divaricata vigilia* Schenck, 1936
 産地: 銚子(櫻井1964; 渡辺1988)
 分布: 銚子以北, 北海道, サハリン, 千島(水深160~500m, 砂泥底)
- 2187 *Acila divaricata archibenthalis* Okutani, 1964
 分布: 相模湾(水深50~800m, 細砂泥底)
- 2188 *Acila (Acila) "submirabilis"* Schenck, 1936"
 分布: 房総半島以南, 土佐沖(水深100fms.)
- 2189 *Acila (Truncacila) insignis* (Gould, 1861)
 産地: 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
 分布: 房総半島・五島列島以北の日本海, 北海道, 朝鮮, 沿海州(潮間帯~水深200m, 細砂泥底)
- 2190 *Acila (Truncacila) minutoides* Kuroda & Habe in Habe, 1958
 産地: 銚子(稲葉1963; 神奈川県博1972; 渡辺1988)
 分布: 房総半島以南, 四国, 九州(水深50~900m, 細砂泥底)
- 2191 *Leionucula nipponica* (Smith, 1885)
 産地: 萩生, 小湊(清水), 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 渡辺1988)
 分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(水深40~1,500m, 砂泥底)
- 2192 *Leionucula tenuis* (Montagu, 1808)
 産地: 大原(清水)
 分布: 房総半島・但馬沖以北, 日本海, 北海道沖, ベーリング海, 北米, 北大西洋(潮間帯下部~水深335m, 砂泥底)
- 2193 *Leionucula cyrenoides* (Kuroda, 1929)
 産地: 銚子(稲葉1963; 神奈川県博1972)
 分布: 三陸・但馬沖以南, 四国, 対馬, 九州(水深50~2,230m, 細砂底)
- 2194 *Leionucula mirifica* (Dall, 1907)
 産地: 銚子(稲葉1963; 神奈川県博1972; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
- 二枚貝綱
 原鰓亜綱
 キスタレガイ目
 キスタレガイ上科
 キスタレガイ科
 キスタレガイ
- アブラキスタレガイ
- アサヒキスタレガイ
- スエヒロキスタレガイ
- キビガラガイ上科
 クルミガイモドキ科
 クルミガイモドキ
- キビガラガイ
- クルミガイ目
 クルミガイ上科
 クルミガイ科
 マメクルミガイ
- ヨセナミクルミガイ
- マメシジミナリクルミガイ
- オオキララガイ
- オニキララガイ
- カラフトキララガイ
- フカミキララガイ
- マキヤマキララガイ
- キララガイ
- ツボミキララガイ
- クルミガイ
- コグルミガイ
- シジミナリクルミガイ
- オオクルミガイ

- 分布:相模湾以北,北海道,オホーツク海(水深50~600m,細砂底)
- 2195 *Ennucula kawamurae* Kuroda (MS) カワムラクルミガイ
産地:銚子沖(黒田1956;稲葉1963;渡辺1988)
Superfamily Nuculanacea
Family Malletiidae
- 2196 *Bathymalletia inequilateralis* (Habe, 1951)
分布:房総半島~四国(水深50~200m,細砂底)
- 2197 *Bathymalletia takaii* (Okutani, 1968) タカイソデガイ
分布:相模湾,駿河湾(水深1,000m~2,300m)
Family Neilonellidae
- 2198 *Carinineilo carinifera* (Habe, 1951)
分布:相模湾~四国(水深100~2,300m,細砂泥底) ハトムギソデガイ科
オネダカソデガイ
- 2199 *Neilonella dubia* Prasad, 1932 ハトムギソデガイ
分布:房総半島以南,四国,九州,東南アジア,インドネシア(水深50~600m,砂底)
- 2200 *Neilonella soyoae* Habe, 1958 ソウヨウハトムギソデガイ
産地:房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995),銚子(稲葉1963;神奈川県博1972;渡辺1988)
分布:銚子沖以南,駿河湾,九州(水深100~2,000m,砂底)
- 2201 *Neilonella japonica* Okutani, 1962 ニッポンハトムギソデガイ
分布:相模湾(水深700~1,400m),能登半島沖(水深150~155m)
Family Tindariidae
- 2202 *Tindaria similis* Okutani, 1960 ミジソデガイ科
フカミソデガイ
分布:房総半島沖,本州東岸沖(水深3,000~3,610m)
Family Sareptidae
- 2203 *Sarepta speciosa* A. Adams, 1860 ヒラソデガイ科
ヒラソデガイ
産地:軟生水深61m砂泥底(千葉水試1980b),館山湾(奥谷ら*),銚子(稲葉1963;渡辺1988)
分布:房総半島・佐渡島以南,四国,九州(水深50~350m,砂泥底)
- 2204 *Sarepta squamaeformis* Okutani, 1966 ウロコソデガイ
分布:相模湾(水深1,500m,泥底)
Family Nuculanidae
- 2205 *Nuculana permula permuloides* (Dunker, 1882) ローバイガイ科
シワローバイ
産地:銚子(稲葉1963;渡辺1988)
分布:銚子沖・但馬沖以北,北海道,北太平洋,北大西洋(水深20~200m,細砂泥底)
- 2206 *Nuculana (Nuculana) permula sadoensis* (Yokoyama, 1926) ミガキローバイ
分布:相模湾以北(水深100~200m,細砂泥底)
- 2207 *Nuculana (Thestylea) kawamurae* Habe, 1961 カワムラローバイ
タイプ産地:銚子沖(水深200m)
産地:銚子沖(Habe 1961;稲葉1963;神奈川県博1972;渡辺1988)
分布:相模湾,鹿島灘(水深100~200m,細砂泥底)
- 2208 *Nuculana (Thestylea) yokoyamai yokoyamai* Kuroda, 1934 アラボリローバイ
産地:館山湾(水深84m;藤田1929a;奥谷ら*),小湊(猪野1942d),銚子(神奈川県博1972)
分布:本州,四国,九州西岸(水深50~450m,細砂泥底)
- 2209 *Nuculana (Thestylea) acinacea* Habe, 1958 シャクシローバイ
産地:銚子(稲葉1963)
分布:銚子~土佐湾沖(水深200~300m,細砂底);燃島(化石)
- 2210 *Nuculana (Thestylea) subscalata* Okutani, 1962 ツギノエナガロウバイ
分布:相模湾,三宅島沖(水深550~1,640m,砂泥底)
- 2211 *Nuculana (Thestylea) sagamiensis* Okutani, 1962 サガミアラボリローバイ
産地:銚子(渡辺1988)
分布:北海道南部以南,三陸沖~駿河湾(水深700~1,500m,細砂泥底)
- 2212 *Nuculana (Thestylea) kiiensis* Tsuchida & Okutani, 1985 キイシクシローバイガイ
産地:房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995)
分布:房総半島沖(水深水深507~578m,泥底),紀伊半島沖(水深353~416m)
- 2213 *Nuculana (Thestylea) tanseimeruae* Tsuchida & Okutani, 1985 エナガロウバイガイ
産地:房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995)
分布:房総半島沖(水深水深507~578m,泥底),紀伊半島沖(水深455~492m)
- 2214 *Nuculana (Temuleda) ikebei* Suzuki & Kanehara, 1936 カゲロウソデガイ
タイプ産地:千葉県市原市石神(化石)
産地:銚子(稲葉1963;櫻井1964;神奈川県博1972;渡辺1988)
分布:相模湾~鹿島灘(水深500~1,030m,泥底)
- 2215 *Propeleda soyomaruuae* (Okutani, 1964) ヤナギバソデガイ
産地:銚子(渡辺1988)
分布:銚子沖,九州西岸
- 2216 *Jupiteria (Saccella) confusa* (Hanley, 1860) ゲンロクソデガイ
産地:竹岡(清水),勝山水深34m泥底(千葉水試1980b),館山湾水深84m(藤田1929a),小湊(猪野1942d;大島1993),御宿(大島1993),九十九里浜水深10m(清水),銚子(稲葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布:房総半島・男鹿半島以南,四国,九州,東南アジア,西太平洋(水深10~60m,砂底)
- 2217 *Jupiteria (Saccella) gordonis* (Yokoyama, 1920) ゴルドンソデガイ
産地:銚子(稲葉1963;櫻井1964;神奈川県博1972;渡辺1988)

- 分布:三陸沿岸・佐渡島以南, 四国, 九州(水深20~300m, 細砂泥底)
- 2218 *Jupiteria (Saccella) sematensis* (Suzuki & Ishizaka, 1943) アラスジソデガイ
 タイプ産地:千葉県市原市瀬又(化石)
 産地:銚子(稲葉1963;櫻井1964;神奈川県博1972;渡辺1988;鶴岡ら1994)
 分布:三陸・佐渡島以南, 四国, 九州(水深20~450m, 細砂泥底)
- 2219 *Jupiteria (Costanuculana) husamaru* (Nomura, 1940) スダレンソデガイ
 タイプ産地:野島埼沖(水深130~147m)
 産地:野島埼沖(Habe 1951), 小湊(大島1993), 銚子(稲葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
 分布:房総半島~紀伊半島(水深50~150m, 細砂底)
- 2220 *Ledella squamaeformis* (Okutani, 1962) ウロコソデガイ
 分布:相模湾, 駿河湾(水深1,500~2,300m)
- 2221 *Spinula calcar* (Dall, 1908) シリトゲソデガイ
 分布:紀伊半島沖~千島沖(日本海溝の外側), 小笠原海溝~北西太平洋海盆, ペルー海溝, ケルマディック海溝
- 2222 *Spinula oceanica* Filatova, 1958 ワダツミノソデガイ
 分布:房総半島沖~カムチャッカ半島沖(日本海溝外側, 水深4,610~6,272m)
- 2223 *Spinula vityazi* Filatova, 1958 ナラクトゲソデガイ
 分布:日本海溝, 千島海溝(水深6,475~9,335m)
- 2224 *Yoldia similis* Kuroda & Habe in Habe, 1958 ナガンソデガイ
 産地:小湊(大島1993), 銚子(稲葉1963;渡辺1988)
 分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州(水深100~300m, 細砂泥底)
- 2225 *Yoldia glauca* Kuroda & Habe, 1961 クモリソデガイ
 産地:小湊(大島1993), 銚子(稲葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
 分布:房総半島以南, 四国, 九州(水深100~200m, 細砂泥底)
- 2226 *Yoldia (Cnestertium) notabilis* Yokoyama, 1922 フリソデガイ
 タイプ産地:千葉県成田市大竹(化石)
 産地:館山湾水深80ms.(稲葉1963a), 銚子(稲葉1963b;渡辺1988)
 分布:房総半島・日本海中部以北, オホーツク海, 東シナ海(水深20~200m, 砂泥底)
- 2227 *Portlandia japonica* (Adams & Reeve, 1850) ベッコウキララガイ
 産地:銚子(渡辺1988)
 分布:房総半島・能登半島以南, 九州, 東シナ海(水深10~300m, 細砂泥底)
- 2228 *Portlandia lischkei* (Smith, 1885) オオベッコウキララ
 産地:天津, 小湊(大島1993), 銚子(稲葉1963;渡辺1988)
 分布:相模湾~遠州灘, 日本海(福井県沖)(水深100~1,400m, 細砂泥底)
- Subclass Pteriomorpha**
Order Arcoida
Superfamily Arcacea
Family Arcidae
- 2229 *Arca navicularis* Bruguière, 1789
 産地:竹岡(清水), 館山湾(佐々木1990;奥谷ら*), 小湊(猪野1942d), 大原(清水), 外川(宇野ら1965), 銚子(宇野ら1965;渡辺1988)
 分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礁・サンゴ礁に足糸で付着)
- 2230 *Arca avellana* Lamarck, 1819 フネガイ
 産地:富津岬南(千葉県内湾水試1959), 館山湾(佐々木1989;奥谷ら*), 白浜(清水), 天津(大島1993), 小湊(猪野1942d), 御宿(大島1993), 名洗(千葉県1977a), 銚子(稲葉1963;渡辺1988)
 分布:北海道南部以南, 本州, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・西太平洋(潮間帯下部~水深20m, 岩礁に足糸で付着)
- 2231 *Arca boucardi* Jousseau, 1894 コペルトフネガイ
 産地:中ノ瀬水深17.0m砂泥底(水産庁1982)中ノ瀬(風呂田1986a), 館山湾(佐々木1990;村越1998;奥谷ら*;清水), 白浜(清水), 天津(大島1993), 小湊(小池1994;清水), 御宿(大島1993), 九十九里沖水深27m(清水), 名洗(千葉県1977a), 銚子(鹿野ら1962;稲葉1963;渡辺1988;鶴岡ら1994)
 分布:北海道以南, 本州, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 朝鮮, 沿海州南部, 通国(潮間帯~水深50m, 岩礁の隙間に足糸で付着)
- 2232 *Barbatia (Abarbatia) lima* (Reeve, 1848) エガイ
 産地:萩生, 富浦(清水), 館山湾(佐々木1989;堀越1990;村越1998;奥谷ら*;清水), 布良, 白浜(清水), 千倉(千葉県水試1980a), 小湊(猪野1942d;大島1993;小池1994;清水), 浜行川(清水), 御宿(大島1993;清水), 大原(清水), 銚子(渡辺1988;鶴岡ら1994)
 分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(岩礁・サンゴ礁の隙間に足糸で付着)
- 2233 *Barbatia (Savignyarca) virescens virescens* (Reeve, 1844) アオカリガネエガイ
 産地:萩生, 富浦(清水), 館山湾(佐々木1989;奥谷ら*;清水)
 分布:東北地方・能登半島以南, 本州, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 中国, インド・太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礁の隙間に足糸で付着)
- 2234 *Barbatia (Savignyarca) virescens obtusoides* (Nyst, 1848) カリガネエガイ
 産地:竹岡, 萩生, 金谷, 保田, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(お茶大館山1973;堀越1990;奥谷ら*;清水), 白浜, 千倉, 太海, 鶴川(清水), 天津, 小湊(大島1993;小池1994;清水), 安房(福井市博1962), 勝浦(清水), 御宿(大島1993;清水), 銚子(稲葉1963;宇野ら1965;渡辺1988;鶴岡ら1994)
 分布:北海道南部・能登半島以南, 本州, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 中国, インド・太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礁の隙間に足糸で付着)
- 2235 *Barbatia (Ustularca) stearnsii* (Pilsbry, 1895) ハナエガイ
 タイプ産地:千葉県安房郡白浜町根本
 産地:竹岡(清水), 館山湾(佐々木1989;堀越1990;村越1998;奥谷ら*;清水), 小湊(猪野1942d;大島1993), 安房(福井市博1962), 銚子(稲葉1963;宇野ら1965)
 分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 東南アジア, ミクロネシア(潮間帯~水深20m, 岩礁底に足糸で付着)
- 2236 *Barbatia (Ustularca) hachijoensis* Hatai, Niino & Kotaka in Niino, 1952 オオハナエガイ
 分布:相模湾以南, 四国, 九州(水深50~120m, 岩礁底)
- 2237 *Acar plicatum* (Dillwyn, 1817) コシロガイ
 産地:館山湾(佐々木1989;堀越1990;清水), 布良, 白浜(清水), 御宿(大島1993), 銚子(渡辺1988)
 分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 熱帯インド・太平洋(潮間帯~水深100m, 岩礁に付着)
- 2238 *Acar plicatum congenita* Smith, 1885 イトコシロガイ

- 産地: 館山湾(奥谷ら*)
分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国九州, 奄美, 沖縄, 台湾, フィリピン(水深50~500m岩礁に付着)
- 2239 *Acar soyoae* (Habe, 1958) ソウヨウミミエガイ
分布: 房総半島・但馬沖以南, 四国, 九州西岸, 東シナ海(水深40~250m, 砂礫底)
- 2240 *Hawaiarca iwaensis* (Yokoyama, 1928) オトギノワシノハ
産地: 館山湾(奥谷ら*), 小湊(大島1993), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 房総半島・能登半島以南, 九州, 東シナ海(水深20~500m, 砂礫底)
- 2241 *Nipponarca bistrigata* (Dunker, 1866) ヒメエガイ
産地: 大吠埼(千葉県1977b), 銚子(渡辺1988)
分布: 房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 西太平洋(潮間帯~水深20m, 砂泥, 岩礁に付着)
- 2242 *Mimarcadia matsumotoi* Habe, 1958 チゴワシノハ
産地: 館山湾(奥谷ら*), 銚子(渡辺1988)
分布: 房総半島以南, 四国, 九州西岸(潮間帯~水深20m, 岩礫底)
- 2243 *Bathyarca kyrookusimana* (Nomura & Hatai, 1940) ワタゾコエガイ
産地: 館山湾(奥谷ら*), 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
分布: 北海道南部・男鹿半島以南, 本州, 四国, 九州西岸, インド・西太平洋(水深50~500m, 細砂底)
- 2244 *Bathyarca sagamiensis* Okutani, 1964 サガミワタゾコエガイ
分布: 相模湾(水深500~700m)
- 2245 *Bathyarca japonica* Habe, 1977 ダイコクワタゾコエガイ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
- 2246 *Samacar pacifica* (Nomura & Hatai, 1940) ミノエガイ
産地: 館山湾(奥谷ら*), 銚子(渡辺1988)
分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州西南岸, 東オーストラリア(素新50~500m, 岩礫底に足糸で付着)
- 2247 *Scapharca broughtonii* (Schrenck, 1867) アカガイ
産地: 浦安(千葉内湾水試1959), 船橋沖(風呂田1984), 東京湾内湾(神奈川県1972; 千葉県企業庁1975; 清水), 富津岬南(千葉県企業庁1978), 湊(採苗器: 田中ら1975; 清水), 竹岡, 館山湾(清水), 鴨川(大島1993), 東京湾(田中1997), 九十九里浜(清水ら1977), 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 鶴岡ら1994)
分布: 北海道南部以南, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 中国北部(潮下部~水深20m, 泥底)
- 2248 *Scapharca satowi* (Dunker, 1882) サトウガイ
タイプ産地: 東京湾
産地: 湊(採苗器: 田中ら1975), 館山湾(清水), 洲崎水深66.0m砂底(水産庁1982), 館山湾, 平砂浦, 鴨川湾(清水), 安房(福井市博1962), 九十九里浜(海老原ら1969; 水深5~20m; 海老原ら1970; 清水ら1977; 羽山ら1991), 片貝沖(奥谷ら1989), 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963)
分布: 三陸沿岸・能登半島以南, 四国, 九州(水深5~30m, 砂泥底) マルサルボウ *Arca nipponensis* Pilsbry, 1901は異名
- 2249 *Scapharca* sp. cf. *satowi* (Dunker, 1882)
産地: 九十九里浜(水深5~20m砂底: 清水)
- 2250 *Scapharca inaequivalvis* (Bruguère, 1789 in 1789-1816) クイチガイサルボウ
産地: 九十九里浜(清水ら1977)
分布: 房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, フィリピン, 東南アジア, インド・太平洋(潮間帯下部~水深20m, 砂底)
- 2251 *Scapharca kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) サルボウ
タイプ産地: 東京湾
産地: 市川放水路(市川市博1993), 浦安(千葉水試1957; 神奈川県博1972), 新浜(風呂田1979), 船橋(風呂田1984; 清水), 小櫃川河口干潟(秋山1974), 富津(千葉水試1922), 東京湾内湾(千葉県企業庁1975), 壱洲, 木更津, 富津岬水深3.2~4.5m, 富津南水深5.8m, 大佐和(清水), 湊(採苗器: 田中ら1975; 清水), 竹岡, 萩生(清水), 館山湾(堀越1990; 佐々木1990; 清水), 鴨川湾(猪野1942d: *S. satowi* か?), 銚子(稲葉1963), 利根川河口(移植: 菅原ら1970)
分布: 大槌湾・佐渡島以南, 瀬戸内海, 九州, 西太平洋, 中国(内湾の潮間帯~水深20m, 砂泥底)
- 2252 *Diluvarca ferruginea* (Reeve, 1844) ハゴロモガイ
産地: 竹岡北西水深25.0m(清水), 富浦(稲葉1963a), 館山湾水深84m(藤田1929a), 鴨川(大島1993), 小湊(猪野1942d; 稲葉1963a)
分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 東シナ海, 台湾, 西太平洋(水深10~60m, 細砂泥底)
- 2253 *Tegillarca granosa* (Linnaeus, 1758) ハイガイ
産地: 竹岡(化石: 清水); 館山湾(佐々木1989; 化石: 堀越1990; 化石: 村越1998; 奥谷ら*), 大原(大島1993), 飯岡(渡辺1988)
分布: 三河湾, 伊勢湾, 瀬戸内海, 浦戸湾, 有明海, 大村湾, 東南アジア, インド・西太平洋(潮間帯~水深10m, 泥底); 東京湾, 関東地方(化石)
- 2254 *Arcopsis symmetrica* (Reeve, 1884) ミミエガイ
産地: 外川, 大吠埼(千葉県1977b), 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
分布: 三陸南部・佐渡島以南, 四国, 九州, 熱帯インド・太平洋(潮間帯~水深100, 岩礁の下面に足糸で付着)
- 2255 *Arcopsis interplicata* Grabau & King, 1928 ヨコヤマミミエガイ
産地: 館山湾水深30.0m砂泥底(水産庁1982), 館山湾(半化石: 堀越1990), 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
分布: 房総半島・但馬沖以南, 四国, 九州西岸, 奄美, 沖縄, 台湾, 中国(潮間帯~水深100m, 細砂泥底)
- 2256 *Estellarca olivacea* (Reeve, 1884) ササグミミエガイ
分布: 東京湾, 瀬戸内海, 有明海, 東南アジア, オーストラリア(潮間帯~水深30m, 砂泥底)
- 2257 *Spinearca fausta* (Habe, 1953) モエシマミミエガイ
分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州西岸, 東シナ海(水深30~150m, 砂礫底)
- 2258 *Didimacar tenebrica* (Reeve, 1884) マルミミエガイ
産地: 天津, 小湊, 御宿(大島1993)
分布: 房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 台湾, 東南アジア, 北東オーストラリア(潮間帯~水深20m, 砂礫底)
- Parallelodontidae
- 2259 *Porterius dalli* (E. A. Smith, 1885) シコロエガイ科
シコロエガイ
産地: 館山湾(堀越1990; 佐々木1990; 奥谷ら*; 清水), 千倉(清水), 小湊(猪野1942d; 清水), 名洗(千葉県1977a), 銚子(稲葉1963; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
分布: 北海道南部・男鹿半島以南, 本州, 朝鮮南部(潮間帯~水深100m, 岩礫底)
- Family Cucullaeidae
- 2260 *Cucullaea labiata* Lightfoot, 1786 ヌノメアカガイ科
ヌノメアカガイ
産地: 竹岡(清水), 館山湾(瀧原1949; お茶大館山1973; 奥谷ら*; 清水), 鴨川, 小湊, 鶴原(大島1993)

- 分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 台湾, 中国, 東南アジア(水深5~20m, 砂泥底)
 Superfamily Limopsacea シラスナガイ上科
 Family Limopsidae シラスナガイ科
 オオシラスナガイ
- 2261 *Limopsis belcheri* Adams & Reeve, 1850
 産地:竹岡, 萩生, 金谷, 富山, 富浦水深230m, 館山湾水深180-280m, 天津(清水), 小湊(大島1993=tajimae; 清水), 銚子(渡辺1988; 鶴岡ら1994)
 分布:津軽海峡・男鹿半島以南, 四国, 九州(水深100~800m, 泥底)
- 2262 *Limopsis uvadokoi* Oyama, 1951
 タイプ産地:千葉県茂原市早野(化石)
 産地:九十九里沖水深855m(清水), 銚子沖(波部1953)
 分布:本州太平洋岸(波部1953) ミノシラスナガイ
- 2263 *Limopsis obliqua* A. Adams, 1863
 分布:房総半島~紀伊半島(水深100~300m, 砂泥底) ナナメシラスナガイ
- 2264 *Empleconia cumingii* (A. Adams, 1863)
 産地:天津(清水), 小湊(猪野1942d; 大島1993)
 分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州西岸(水深30~300m, 砂泥底) オリイレシラスナガイ
- 2265 *Crenulimopsis oblonga* (A. Adams, 1860)
 産地:萩生(水深61m砂泥底:千葉水試1980b; 清水), 富浦水深70m砂底(千葉水試1980b), 館山湾(水深10-18m泥底:千葉水試1980b; 奥谷ら*; 清水), 小湊(猪野1942d; 大島1993), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988)
 分布:津軽海峡・佐渡島以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深20~2,000m, 細砂泥底) ナミジワシラスナガイ
- 2266 *Oblinopa multistriata* (Forskål, 1775)
 産地:竹岡(水深9m砂底:千葉水試1980b; 水深17.5m砂底:水産庁1982; 清水), 萩生(清水), 館山湾(水深24.0m砂底:水産庁1982; 佐々木1989; 堀越1990; 奥谷ら*), 洲埼水深66.0m砂底(水産庁1982), 小湊(猪野1942d), 勝浦(岩川1905), 銚子(稲葉1963; 神奈川県博1972; 渡辺1988)
 分布:三陸・佐渡島以南, 四国, 九州, 東シナ海, 台湾, フィリピン(水深10~400m, 砂泥底) シラスナガイ
- 2267 *Nipponolimopsis decussata* (A. Adams, 1862)
 産地:館山湾(奥谷ら*), 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
 分布:三陸(大湊湾)・能登半島以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深40~400m, 砂泥底) マメシラスナガイ
- 2268 *Nipponolimopsis azumana* (Yokoyama, 1910)
 分布:相模湾~紀伊半島(水深100~250m, 砂底) マルシラスナガイ
- Family Glycymerididae タマキガイ科
- 2269 *Glycymeris rotunda* (Dunker, 1882) ペニグリ
 タイプ産地:東京湾
 産地:館山湾水深84m(藤田1929a), 東京湾(Dunker, 1882), 天津(清水), 小湊(猪野1942d), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
 分布:津軽海峡・男鹿半島以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深30~300m, 細砂底)
- 2270 *Glycymeris imperialis* Kuroda, 1934 ミタマキガイ
 産地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(佐々木1989; 村越1998; 奥谷ら*), 千倉(清水), 鴨川, 太海(大島1993), 小湊(堀越ら1987; 大島1993; 清水), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
 分布:岩手県~紀伊半島(水深5~30m, 砂底)
- 2271 *Glycymeris yessoensis* (Sowerby III, 1889) エソタマキガイ
 産地:小湊(猪野1942d), 銚子(稲葉1963)
 分布:房総半島・丹後半島以北北海道, 朝鮮北東部, 沿海州, 千島(潮間帯下部~水深40m, 砂底)
- 2272 *Glycymeris munda* (Sowerby III, 1903) コギツネガイ
 分布:房総半島以南, 四国, 九州, 朝鮮南部(潮間帯~水深120m, 砂底)
- 2273 *Glycymeris (Veletuceta) albolineata* (Lischke, 1872) ベンケイガイ
 タイプ産地:東京湾
 産地:東京湾(Lischke, 1872), 竹岡, 萩生, 富浦, 館山湾, 平砂浦, 布良, 白浜, 千倉, 鴨川湾(清水), 太海, 鴨川, 天津(大島1993; 清水), 小湊(猪野1942d; 堀越ら1987; 清水), 九十九里浜(水深10-20m; 海老原ら1970; 清水), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
 分布:北海道南部・男鹿半島以南, 四国, 九州, 朝鮮南部(潮間帯下帯~水深50m, 砂底)
- 2274 *Glycymeris (Veletuceta) vestita* (Dunker, 1877) タマキガイ
 産地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(佐々木1990; 村越1998; 奥谷ら*), 千倉, 鴨川湾, 天津(清水), 鴨川, 小湊(大島1993), 大原(清水), 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
 分布:北海道南部・男鹿半島以南, 四国, 九州, 朝鮮南部(水深3~30m, 砂底)
- 2275 *Glycymeris (Veletuceta) reevei* (Mayer, 1868) ノメワケグリ
 産地:竹岡, 萩生(清水), 小湊(猪野1942d)
 分布:高知県以南, 九州南部, 奄美, 沖縄, 台湾, 熱帯西太平洋(潮間帯下帯~水深20m, 砂底)
- 2276 *Glycymeris (Tucetilla) pilsbryi* (Yokoyama, 1920) ビロードタマキ
 産地:浜行川(大島1993), 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
 分布:津軽海峡・男鹿半島以南, 四国, 九州西岸(水深30~600m, 細砂底)
- 2277 *Tecetona sinkurosensis* (Hatai, Niino & Kotaka in Niino, 1952) シンクロセウチワ
 分布:房総半島, 伊豆半島(水深40-100m, 貝殻砂底)
- Order Mytiloida イガイ目
 Superfamily Mytilacea イガイ上科
 Family Mytilidae イガイ科
- 2278 *Mytilus galloprovincialis* Lamarck, 1819 ムラサキイガイ
 産地:東京湾内湾から銚子まで(清水), 市川放水路(市川市博1993), 浦安(千葉水試1957), 船橋沖(風呂田1984), 千葉港(風呂田1985c), 五井沖, 蟹洲沖(風呂田1984), 小櫃川河口干潟(秋山1974), 木更津(風呂田1983), 東京湾横断道路木更津人工島(清水), 富津(千葉県企業庁1977-1979), 富津岬南(千葉県湾水試1961), 勝山(田中ら1974), 館山湾(お茶大館山1973; 佐々木1989; 奥谷ら*), 太海から大原まで(大島1993), 小湊(小池1994), 名洗(宇野ら1965; 千葉県1977a), 外川(宇野ら1965; 千葉県1977b), 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 宇野ら1965; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
 分布:日本全国(移入), 世界中の温帯域(潮間帯~水深20m, 岩礁等に足糸で付着)
- 2279 *Mytilus coruscus* Gould, 1861 イガイ

- 産地: 竹岡, 萩生, 天津, 浜行川, 鶴原(清水), 小湊(猪野1942d), 安房(岩川1905), 太海から大原まで(大島1993), 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
 分布: 北海道南部・男鹿半島以南, 四国, 九州, 朝鮮南部, 沿海州(潮間帯〜水深20m, 岩礁に足糸で付着)
- 2280 *Perna viridis* (Linnaeus, 1758) ミドリイガイ
 産地: 船橋市, 千葉港口, 姉ヶ崎, 五井沖(朝倉1992), 東京湾横断道路木更津人工島(清水)
 分布: 東京湾(移入), フィリピン以南, インド・西太平洋(潮間帯〜水深10m, 岩礁等に足糸で付着)
- 2281 *Xenostrobus atrata* Lischke, 1871 クログチ
 分布: 三陸南部以南, 四国, 九州, 朝鮮, 台湾, 中国南部, 東南アジア(内湾の潮間帯, 岩礁底)
- 2282 *Xenostrobus securis* (Lamarck, 1819) コウロエンカワヒバリ
 産地: 江戸川放水路(市川市博1993)
 分布: 東京湾, 駿河湾, 浜名湖, 伊勢湾, 和歌山県沿岸, 大阪湾, 瀬戸内海(潮間帯, 砂泥底, 岸壁等に付着)
- 2283 *Septifer bilocularis pilosus* Reeve, 1858 ミノクジャクガイ
 産地: 竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(佐々木1989; 奥谷ら*; 清水), 布良, 白浜, 千倉, 鴨川(清水), 小湊(猪野1942d; Oyama & Takemura, 1959c; 小池1994; 清水), 勝浦(清水), 安房(福井市博1962), 名洗(宇野ら1965; 千葉県1977a), 銚子(宇野ら1965)
 分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・西太平洋(潮間帯〜潮下部, 岩礁に足糸で付着)
- 2284 *Septifer exisus* (Wiegmann, 1837) シロインコ
 産地: 白里沖採苗器(清水)
 分布: 房総半島以南, 紀伊半島, 四国, 九州西岸, 奄美, 沖縄, 中・西太平洋(潮間帯下部〜水深10m, 岩礁)
- 2285 *Septifer virgatus* (Wiegmann, 1837) ムラサギインコ
 産地: 竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(佐々木1989; 奥谷ら*; 清水), 布良, 白浜, 千倉(清水), 鴨川(神奈川県博1991; 清水), 小湊(猪野1942d; 小池1994; 清水), 浜行川(千葉水試1977; 清水), 御宿(大島1993), 大原(清水), 外川(宇野ら1965), 大吹埜(千葉県1977b), 銚子(稲葉1963; 宇野ら1965; 渡辺1988)
 分布: 北海道南部以南, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, インド・太平洋(潮間帯, 岩礁)
- 2286 *Septifer keenae* Nomura, 1936 ヒメイガイ
 産地: 館山湾(佐々木1989; 奥谷ら*), 白浜, 千倉(千葉水試1980a; 清水), 天津, 御宿(大島1993), 名洗(千葉県1977a), 銚子(渡辺1988)
 分布: 北海道南部・男鹿半島以南, 四国, 九州, 朝鮮(潮間帯, 岩礁)
- 2287 *Trichomya hirsutus* (Lamarck, 1819) ケガイ
 産地: 竹岡, 萩生(清水), 天津, 御宿(大島1993)
 分布: 房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 東南アジア, オーストラリア北部, インド・太平洋(潮間帯, 岩礁に足糸で付着)
- 2288 *Hormomya mutabilis* (Gould, 1861) ヒバリガイモドキ
 分布: 房総半島・日本海中部以南, 熱帯インド・西太平洋(潮間帯岩礁)
- 2289 *Modiolus kurilensis* Bernard, 1983 エソヒバリガイ
 産地: 根根崎水深10.2m, 東京湾口(稲葉1963a), 九十九里浜水深27m(清水), 名洗(千葉県1977a), 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
 分布: 東京湾・男鹿半島以北, 北海道, チョウセン東岸, 沿海州, 樺太, オホーツク海(潮間帯〜水深20m, 岩礁に足糸で付着)
- 2290 *Modiolus auriculatus* (Krauss, 1848) リュウキュウヒバリ
 分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯〜水深10m, 岩礁底)
- 2291 *Modiolus margaritaceus* (Nomura & Hatai, 1950) マメヒバリガイ
 産地: 銚子(稲葉1963; 宇野ら1965; 渡辺1988; 神奈川県博1991)
 分布: 三陸・北海道南西部以南, 四国, 九州西岸, サハリン(水深30〜450m, 貝砂底)
- 2292 *Modiolus comptus* Sowerby III, 1915 ピロードマクラ
 産地: 館山湾(奥谷ら*)
- 2293 *Modiolus nipponicus* (Oyama, 1950) ヒバリガイ
 産地: 中ノ瀬(根呂田1986a), 富津岬南(千葉内湾水試1959), 竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(水深84m: 藤田1929a; お茶大館山1973; 水深10m: 千葉水試1980b; 佐々木1989; 堀越1990; 村越1998; 奥谷ら*; 清水), 布良(清水), 白浜, 千倉(千葉水試1980a; 清水), 太海, 鴨川(清水), 小湊(猪野1942d; 大島1993; 小池1994; 清水), 安房(岩川1905), 勝浦(清水), 御宿(大島1993; 清水), 白里沖採苗器(清水), 名洗(千葉県1977a), 外川, 大吹埜(千葉県1977b), 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 宇野ら1965; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
 分布: 陸奥湾・男鹿半島以南, 四国, 九州, 朝鮮南部(潮間帯〜水深100m, 岩礁に足糸で付着)
- 2294 *Modiolus metcalfi* (Hanley, 1843) コケガラス
 産地: 館山湾水深84m(藤田1929a), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; ショウジョウヒバリガイ: 渡辺1988)
 分布: 房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 台湾, 中国, 東南アジア(潮間帯〜水深100m, 貝砂底)
- 2295 *Modiolus trailli* (Reeve, 1843)
 分布: 太平洋側(25〜41° N), 日本海側(41° N)
- 2296 *Modiolus flavidus* (Dunker, 1857) サザナミマクラ
 産地: 大房岬水深9.0m砂底(水産庁1982), 館山湾(奥谷ら*)
 分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 西太平洋(潮間帯〜水深100m, 砂泥底)
- 2297 *Modiolus oyamai* Habe, 1981 ツグミノマクラ
 分布: 房総半島以南, 四国, 九州西岸
- 2298 *Modiolus sirahensis* (Jousseaume, 1936) アケガラス
 分布: 房総半島以南
- 2299 *Modiolus hanleyi* (Dunker, 1882) カラスノマクラ
 産地: 萩生(清水), 小湊(大島1993), 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 渡辺1988)
 分布: 東京湾以南, 伊勢湾, 紀伊, 大阪湾, 土佐湾, 豊後水道, 九州西岸, 有明海(水深10〜60m, 泥底に泥で巣を作って生息)
- 2300 *Hormomya mutabilis* (Gould, 1861) ヒバリガイモドキ
 産地: 館山湾(佐々木1989; 奥谷ら*), 御宿(大島1993)
 分布: 房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 西太平洋(潮間帯, 岩礁等に付着)
- 2301 *Gregariella coralliophaga* (Gmelin, 1791) チヂミタマエガイ
 産地: 鶴原沖水深180m(清水)
 分布: 房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 西太平洋(潮間帯〜水深20m, 貝殻や造礁サンゴに穿孔)
- 2302 *Trichomusculus semigranatus* (Reeve, 1858) スジタマエガイ
 分布: 房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州インド・太平洋(潮間帯〜水深20m, 岩礁底)
- 2303 *Crenella yokoyamai* Nomura, 1932 チゴキザミガイ

- タイプ産地:千葉県市原市市東(化石)
産地:銚子(神奈川県博1972;渡辺1988)
分布:相模湾・但馬沖以北,北海道,千島,オホーツク海(水深20~200m,相砂底)
- 2304 *Solamen spectabilis* (A. Adams, 1862) キサガイモドキ
産地:館山湾(村越1998;奥谷ら*),銚子(稲葉1963;渡辺1988)
分布:三陸沿岸・佐渡島以南,四国,九州西岸(水深30~300m,細砂底)
- 2305 *Musculus laevigatus* (Gray, 1824) ハブタエタマエガイ
産地:銚子(稲葉1963;宇野ら1965)
分布:銚子・但馬沖以北,北海道,オホーツク海,ベーリング海,アラスカ(水深10~230m,泥底)
- 2306 *Musculus pusio* (A. Adams, 1862) チビタマエガイ
分布:房総半島・但馬沖以南,四国,九州西岸(潮間帯~水深20m,岩礫や海藻に足糸で付着)
- 2307 *Musculus nanus* (Dunker, 1857) ヒナタマエガイ
産地:銚子(稲葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布:房総半島以南,熊野灘,玄界灘,九州西岸(潮間帯~水深50m,岩礫底)
- 2308 *Musculus (Modiolarca) cupreus* (Gould, 1861) タマエガイ
産地:木更津沖(風呂田1983),竹岡,萩生,勝山,富山,富浦(清水),館山湾(水深10m:千葉水試1980b;佐々木1990;奥谷ら*;水深20m:清水),布良,白浜,千倉,鶴川(清水),小湊(大島1993;清水),勝浦,大原,白里沖採苗器(清水),名洗(千葉県1977a),銚子(稲葉1963;渡辺1988)
分布:三陸・佐渡島以南,本州,四国,九州,尾尾,沖繩,台湾(潮間帯~水深100m)
- 2309 *Musculista senhousia* (Benson, 1842) ホトトギスガイ
産地:江戸川放水路(市川市博1993),浦安(千葉水試1957;菅原ら1961),新浜(風呂田1975),船橋沖(風呂田1983),千葉港(風呂田1985c),盤洲沖(風呂田1985b),姉ヶ崎(水産事情調査所1952),小湊川河口干潟(秋山1975),盤洲水深6.5m砂泥底(水産庁1982),木更津(風呂田1983;清水),富津(水産事情調査所1952;千葉内湾水試1959;千葉県企業庁1977-1979),富津水深6.5m砂底,第1海堡水深16.0m砂底(水産庁1982),富津岬周辺潮間帯~水深7.6m,第1海堡水深4.0m,第2海堡水深18.5m,磯根塔沖水深7.5~10.2m,湊,竹岡水深3.0~25.0m,萩生,勝山,富山(清水),富浦(水深70m:千葉水試1980b;清水),館山湾(福井市博1962;お茶大館山1973;清水),布良,白浜,千倉,鶴川(清水),天津(大島1993),小湊,勝浦,白里沖採苗器(清水),名洗(千葉県1977a),外川,犬吠埼(千葉県1977b),銚子(鹿股ら1962;稲葉1963;宇野ら1965;渡辺1988),利根川河口(菅原ら1970)
分布:北海道,本州,四国,九州,樺太,沿海州,東南アジア(潮間帯~水深20m,泥底)
- 2310 *Musculista japonica* (Dunker, 1857) ヤマホトトギス
産地:勝山(田中ら1974),館山湾(堀越1990),小湊(猪野1942d),銚子(稲葉1963;渡辺1988)
分布:房総半島・能登半島以南,四国,九州,中国南部,東南アジア(潮間帯下部~水深20m,泥底)
- 2311 *Musculista perfragilis* (Dunker, 1857) ノジホトトギス
産地:銚子(渡辺1988)
分布:房総半島以南,四国,九州,中国(潮間帯~水深30m,砂泥底に泥を寒天状に覆った中に生息)
- 2312 *Amygdalum watosoni* (E. A. Smith, 1885) スリツヤホトトギス
産地:銚子(渡辺1988)
分布:相模湾・若狭湾以南,四国,九州西岸(水深50~500m,砂泥底)
- 2313 *Amygdalum soyoae* Habe, 1958 ユキゾラホトトギス
産地:銚子(渡辺1988)
分布:相模湾以南,四国,九州西岸(水深50~200m,砂泥・貝砂底)
- 2314 *Amygdalum peasei* (Newcomb, 1870) マボロシガイ
分布:相模湾以南,四国,九州,東シナ海,ハワイ(水深50~200m,砂泥底)
- 2315 *Adipicola iwaoakii* (Habe, 1958) イトマユイガイ
産地:銚子(稲葉1963;神奈川県博1972;渡辺1988)
分布:銚子沖・但馬沖以南,四国,九州(水深20~200m,沈木等に付着)
- 2316 *Lithophaga (Leiosolenus) curta* (Lischke, 1874) イシマテ
タイプ産地:東京湾
産地:東京湾(Lischke, 1874),竹岡,萩生(清水),勝山(田中ら1974;清水),富山,富浦(清水),館山湾(お茶大館山1973;佐々木1989;奥谷ら*;清水),布良,白浜,千倉,太海(清水),鶴川,天津(大島1993;清水),小湊(猪野1942d;大島1993;小池1994;清水),勝浦(大島1993;清水),銚子(宇野ら1965;鶴岡ら1994)
分布:陸奥湾・男鹿半島以南,四国,九州,奄美,沖繩(潮間帯,岩礫・サンゴ礁に穿孔)
- 2317 *Lithophaga (Labis) erimitica* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 カクレイシマテ
産地:館山湾(奥谷ら*)
分布:房総半島以南,四国,九州(潮間帯~水深20m,岩礫に穿孔)
- 2318 *Lithophaga (Liosolenus) lima* (Lamy, 1919) イワカワシギノハシ
産地:館山湾(村越1998)
分布:紀伊半島・九州西岸以南,奄美,沖繩,台湾(潮間帯,砂岩・石灰岩等に穿孔)
- 2319 *Adula schmidti* (Schrenck, 1867) マユイガイ
産地:千倉(清水),銚子(宇野ら1965;鶴岡ら1994)
分布:銚子・富山湾以北,北海道,千島,樺太(潮間帯,泥岩の穴等に付着)
- Order Pterioida**
Superfamily Pteriacea
Family Pteriidae
- 2320 *Pteria breviaolata* (Dunker, 1872) ウグイスガイ目
産地:竹岡,萩生(清水),富浦(稲葉1963a),館山湾(お茶大館山1973;佐々木1989;奥谷ら*),鶴川(大島1993)
分布:房総半島・但馬沖以南,四国,九州,中南部太平洋,東南アジア(潮間帯~水深20m,ヤギ類に付着)
- 2321 *Pteria loveni* (Dunker, 1873) フクラスズメ
分布:房総半島・山口県北部以南,四国,九州,西太平洋(潮間帯~水深80m,ヤギ類に付着)
- 2322 *Pteria conturnix* (Dunker, 1880) モンウグイス
産地:館山湾水深20m(清水),鶴川(大島1993),白里沖採苗器(清水)
分布:房総半島;紀伊半島以南,四国,九州,台湾,西太平洋(水深10~50m,トゲトサカ類に着生)
- 2323 *Pteria peasei* (Dunker, 1872) ツバメガイ

- 産地:鴨川(大島1993)
分布:紀伊半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 西太平洋(水深10~20m, ヤギ類に着生)
- 2324 *Pteria dendronephthya* Habe, 1960 トゲトサカノウグイス
分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 九州, 中国(水深10~50m, トゲトサカ類に付着)
- 2325 *Pinctada fucata* (Gould, 1850) ベニコチョウ
産地:白里沖採苗器(清水)
- 2326 *Pinctada martensii* (Dunker, 1873) アコヤガイ
産地:竹岡北西水深11.9m, 竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(沖ノ島:お茶大館山1973; 佐々木1989; 堀越1990; 奥谷ら*; 養殖試験:千葉水試1955; 天然:清水), 布良, 白浜, 千倉, 太海, 鴨川(清水), 天津(大島1993; 清水), 小湊(岩川1905; 猪野1942d; 神奈川県博1972; 大島1993; 和田1994; 小池1994; 清水), 勝浦(清水), 白里沖採苗器(清水), 銚子(稲葉1963; 鶴岡ら1994), 房総半島(奥谷・波部1975)
分布:岩手県気仙郡・男鹿半島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深20m, 岩礁底に足糸で付着)
- 2327 *Electroma zebra* (Reeve, 1857) シロチョウウグイス
産地:房総半島(奥谷・波部1975)
分布:房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾, 熱帯インド・西太平洋(水深10~60m, クロガヤ等に付着)
- 2328 *Pinctada albina* (Lamarck, 1819) モスソアコヤガイ
産地:館山湾(奥谷ら*)
- 2329 *Electroma ovata* (Quoy & Gaimard, 1832) シマウグイス
産地:館山湾(奥谷ら*)
Family Vulsellidae
- 2330 *Vulsella vulsella* (Linnaeus, 1758) ホウオウガイ科
産地:天津(大島1993; 清水)
分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・西太平洋(水深5~20m, 海綿の中に生息)
Family Malleidae
- 2331 *Malleus (Malleus) albus* Lamarck, 1819 シュモクガイ科
産地:富浦(神奈川県博1991), 館山湾(瀧庸1949; 稲葉1963a), 小湊(稲葉1963a)
分布:房総半島・九州西北岸以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・西太平洋(潮間帯~水深80m, 砂礁底)
- 2332 *Malleus (Malvufundus) irregularis* (Jousseume, 1894) ヒリョウ
産地:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 西太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礁底)
Family Isognomonidae
- 2333 *Isognomon legumen* (Gmelin, 1791) マクガイ科
産地:館山湾(佐々木1990; 奥谷ら*), 千倉(千葉水試1980a), 小湊(清水), 房総半島(奥谷・波部1975)
分布:房総半島・但馬沖以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礁・サンゴ礁)
- 2334 *Isognomon perna* (Linnaeus, 1767) シロアオリガイ
産地:房総半島・九州西岸以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礁)
Superfamily Pinnacea
Family Pinnidae
- 2335 *Pinna bicolor* Gmelin, 1791 ハボウキガイ上科
産地:竹岡, 小湊(清水), 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・西太平洋(潮間帯~水深10m, 砂泥底)
- 2336 *Pinna epica* (Jousseume, 1894) ハボウキガイ科
産地:館山湾(船形:稲葉1963a)
分布:伊豆諸島以南, 紀伊半島, 土佐湾(水深100~200m, 砂泥底)
- 2337 *Atrina (Servatrina) pectinata* (Linnaeus, 1767) ハボウキガイ
産地:木更津(清水), 富津(田中ら1958; 奥谷1997; 清水), 湊, 竹岡(清水), 勝山(田中ら1974), 館山湾(お茶大館山1973; 清水), 東京湾(岩川1905; 神奈川県博1972), 安房(福井市博1962), 鴨川(大島1993), 小湊(猪野1942d; 大島1993), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
分布:岩手県・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾, 朝鮮南部, 東南アジア, 西太平洋, オーストラリア北部(潮間帯~水深90m, 細砂泥底)
- 2338 *Atrina (Servatrina) penna* (Reeve, 1858) ハネタイラギ
産地:相模湾・能登半島以南, 四国, 九州, フィリピン, インドネシア(潮間帯~水深200m, 細砂底)
- 2339 *Atrina (Servatrina) kinoshitai* Habe, 1953 ミノタイラギ
産地:銚子(鶴岡ら1994)
分布:房総半島以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深100~600m, 細砂底)
- 2340 *Atrina (Servatrina) teramachii* Habe, 1953 カワタイラギ
産地:竹岡(清水), 銚子(渡辺1988)
分布:相模湾・但馬沖以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深100~600m, 細砂底)
- 2341 *Streptopinna saccata* (Linnaeus, 1758) カゲロウガイ
産地:白里沖採苗器(清水)
分布:房総半島・但馬沖以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・西太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礁, サンゴ礁)
- Order Limoida
Family Limidae
- 2342 *Lima vulgaris* Link, 1807 ミノガイ目
産地:勝山(岩川1905), 館山湾(佐々木1989; 奥谷ら*), 布良(清水), 安房(福井市博1962), 銚子(稲葉1963), 千葉県(大山1948)
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礁・岩礁底)
- 2343 *Lima zushiensis* Yokoyama, 1920 ミノガイ科
産地:竹岡, 富浦(清水), 館山湾(水深84m:藤田1929a; 佐々木1989; 堀越1990; 奥谷ら*), 布良, 白浜(清水), 鴨川(大島1993), 小湊(猪野1942d; 大島1993), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
分布:茨城県沖・男鹿半島以南, 四国, 九州西岸(水深50~200m, 砂礁底)
- 2344 *Lima tomlini* Prasad, 1932 マルミノガイ
産地:銚子(渡辺1988)
分布:銚子・対馬海峡以南, 四国, 九州, フィリピン, インドネシア, アラフラ海(水深200~500m, 砂礁底)

- 2345 *Lima fujitai* Oyama, 1943
産地:竹岡(清水)
分布:宮城県沖・富山湾以南, 四国, 九州西岸(水深50~300m,岩礫底) ロウイロミノガイ
- 2346 *Lima vulgarula* Yokoyama, 1922
分布:相模湾・富山湾以南 チビミノガイ
- 2347 *Lima profunda* Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971
分布:相模湾 ユウビミノガイ
- 2348 *Lima quantoensis* Yokoyama, 1927
産地:館山湾水深84m(藤田1929a),洲崎沖(沖ノ山:神奈川県博1972)
分布:房州・相模・能登・長崎・尾鷲沖 カントウミノガイ
- 2349 *Lima sagamiensis* Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971
産地:竹岡(清水)
分布:相模湾(水深50~200m,砂礫底) サガミマルミノガイ
- 2350 *Acesta (Acesta) goliath* (Sowerby II, 1883)
産地:萩生,金谷(清水),天津,小湊(猪野1942d;大島1993;清水),九十九里沖水深950~1,100m(清水),銚子(稲葉1963;櫻井1964;渡辺1988;清水)
分布:紀伊半島・山口県見島以北,北海道南部(水深100~1,417m,砂礫底) オオハネガイ
- 2351 *Acesta (Acesta) citrina* Masahito & Habe, 1976
産地:竹岡(清水)
分布:相模湾~紀伊半島沖(水深150~300m,細砂底) ミカンオオハネガイ
- 2352 *Acesta (Acesta) virgo* Habe & Okutani, 1968
産地:九十九里沖(35° 20'N,140° 50'E,水深780m;渡辺1989),銚子(渡辺1988)
分布:銚子沖,中部太平洋(水深400~800m) アケボノハネガイ
- 2353 *Acesta (Plicacesta) smithi* (Sowerby II, 1888)
産地:竹岡,九十九里沖ミン場(清水),銚子(鹿殿ら1962;稲葉1963;鹿間1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:紀伊半島・但馬沖以北,北海道南部(水深100~700m,砂泥底) スミスハネガイ
- 2354 *Ctenoides lischkei* (Lamy, 1930)
産地:竹岡,白浜(清水),館山湾(佐々木1989;奥谷ら*),鴨川(大島1993),小湊(猪野1942d;大島1993),安房(福井市博1962),勝浦,御宿(大島1993)
分布:房総半島・能登半島以南,四国,九州,インド・太平洋(潮間帯~水深100m,岩礫底) ハネガイ
- 2355 *Ctenoides suavis* Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971
分布:相模湾以南,四国,九州西岸(水深50~200m,岩礫底) テンニンハネガイ
- 2356 *Divarilima iwaotakii* (Habe, 1961)
分布:房総半島・対馬海峡以南,四国,九州(水深20~200m,細砂底) タキハネガイ
- 2357 *Limaria baasilanica* (Adams & Reeve, 1850)
産地:東京湾(福井市博1962),竹岡(水深16m:千葉水試1980b;清水),館山湾(奥谷ら*),大原(清水),銚子(宇野ら1965)
分布:三陸沿岸・佐渡島以南,四国,九州,奄美,沖縄,インド・太平洋(潮間帯~水深20m,砂礫底) ユキミノ
- 2358 *Limaria hakodatensis* (Tokunaga, 1906)
産地:館山湾(奥谷ら*),布良,白浜,白里沖採苗器(清水),銚子(稲葉1963;渡辺1988)
分布:北海道南部・男鹿半島以南,四国,九州,朝鮮,中国,東シナ海,西太平洋(水深5~120m,細砂底) フクレユキミノ
- 2359 *Limaria hirasei* Pilsbry, 1901
産地:館山湾(お茶大館山1973;村越1998),天津(清水),小湊(猪野1942d),銚子(渡辺1988)
分布:福島県・佐渡島以南,四国,九州(潮間帯~水深50m,岩礫間の砂底) ウスユキミノ
- 2360 *Limatula (Limatula) vladistokensis* Scarlato, 1955
産地:銚子(稲葉1963;渡辺1988)
分布:紀伊半島・山口県見島以北,北海道,樺太,オホーツク海,沿海州(水深50~350m,細砂底) ヒメユキバネ
- 2361 *Limatula (Limatula) choshiensis* Kuroda & Habe in Habe, 1961
タイプ産地:銚子沖
産地:銚子沖(Kuroda & Habe, 1961,稲葉1963;櫻井1964;神奈川県博1972;渡辺1988)
分布:鹿島灘~房総半島沖(水深200~300m,細砂底) チョウシユキバネ
- 2362 *Limatula (Limatula) kurodai* Oyama, 1943
産地:銚子(櫻井1964)
分布:鹿島灘・佐渡島以南,四国,九州西岸,種子島,屋久島(水深10~300m,細砂底) クロダユキバネ
- 2363 *Limatula (Limatula) japonica* A. Adams, 1863
産地:銚子(稲葉1963;神奈川県博1972;渡辺1988)
分布:北海道南部・能登半島以南,本州,四国,九州西岸(水深20~600m,細砂底) ニッポンユキバネ
- 2364 *Limatula (Limatula) strangei* (Sowerby II, 1872)
分布:房総半島・若狭湾以南,四国,九州,奄美,沖縄,太平洋(水深10~100m,細砂底) Goto et al. (1999)は*L. bullata* (Bom, 1778)とする オオユキバネガイ
- Order Ostreoida**
Suborder Pectinina
Superfamily Pectinaceaidae
Family Pectiniidae
- 2365 *Chlamys (Azumapecten) squamata* (Gmelin, 1791)
産地:竹岡,萩生(清水),館山湾(堀越1990),鴨川(大島1993),小湊(猪野1942d;大島1993),鶴原(清水),名洗(千葉県1977a),銚子(稲葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布:房総半島・男鹿半島以南,四国,九州,東シナ海,西太平洋(潮間帯~水深50m,岩礫に付着) ニシキガイ
- 2366 *Chlamys (Azumapecten) farreri nipponensis* (Kuroda, 1932)
産地:木更津沖(Oyama & Takemura, 1959a),中ノ瀬(風呂田1986a),竹岡,萩生,金谷,勝山,富山,富浦(清水),館山湾(沖ノ島:お茶大館山1973;堀越1990;佐々木1990;奥谷ら*;清水),安房(福井市博1962),布良,白浜,千倉,鴨川(清水),小湊(大島1993;清水),勝浦,大原,白里沖採苗器(清水),銚子(稲葉1963;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:北海道,本州,四国,九州,東シナ海,中国,朝鮮,沿海州,オホーツク海(水深15~60m,岩礫に付着) アズマニシキ

- 2367 *Chlamys (Azumapecten) farreri akazara* (Kuroda, 1932) アカザラガイ
産地: 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
分布: 銚子以北, 北海道南部(潮間帯~水深20m, 岩礁底)
- 2368 *Chlamys (Laevichlamys) irregularis* (Sowerby II, 1842) ナデシコガイ
産地: 竹岡, 萩生, 金谷(清水), 勝山(田中ら1974; 清水), 富浦(清水), 館山湾(水深84m: 藤田1929a; 佐々木1989; 堀越1990; 奥谷ら*; 清水), 布良, 白浜, 千倉, 天津(清水), 小湊(猪野1942d; 大島1993), 勝浦, 御宿(大島1993), 名洗(千葉県1977a), 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
分布: 三陸・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 西太平洋(潮間帯~水深150m, 岩礁底)
- 2369 *Chlamys (Veprichlamys) jousseaumei* (Bavay, 1904) ニクイロナデシコ
産地: 竹岡, 金谷(清水), 館山湾(水深84m: 藤田1929a; 奥谷ら*; 鴨川, 天津, 小湊(大島1993), 銚子(櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, インドネシア(水深50~600m, 砂礫底)
- 2370 *Chlamys (Veprichlamys) empressae* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ミソナデシコ
産地: 小湊(大島1993)
分布: 房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深50~20m, 砂礫底)
- 2371 *Chlamys (Laevichlamys) princessae* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ツツレナデシコ
産地: 小湊(大島1993)
分布: 相模湾以南, 四国, 九州西岸(水深50~200m, 砂礫底)
- 2372 *Swiftopecten swifti* (Bernardi, 1858) エゾキンチャク
産地: 小湊(水深50fms.: 稲葉1963a; 清水), 白里沖採苗器(清水), 銚子(鹿股ら1962; 水深50fms.: 稲葉1963a;b; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
分布: 銚子・伊馬沖以北, 北海道, 朝鮮北部, 沿海州, 千島, 樺太, アラスカ(潮間帯下部~水深275m, 岩礁に足糸で付着)
- 2373 *Semipallium fulvicosta* (Adams & Reeve, 1850) ツツレノニシキ
分布: 房総半島以南の熱帯太平洋(水深10~30m, 岩礁底)
- 2374 *Mimachlamys nobilis* (Reeve, 1852) ヒオウギ
産地: 竹岡, 萩生(清水), 館山湾(形状: 稲葉1963a; 佐々木1990; 奥谷ら*; 水深20m: 清水), 白里沖採苗器(清水)
分布: 房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 西太平洋(潮間帯下部~水深20m, 岩礁に付着)
- 2375 *Mimachlamys asperulata* (Adams & Reeve, 1850) ヒナノヒオウギ
産地: 銚子(稲葉1963)
分布: 房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯下部~水深20m, 岩礁底)
- 2376 *Chlamys (Laevichlamys) lemniscata* (Reeve, 1853) ワタゾコナデシコ
産地: 竹岡(清水), 鴨川(大島1993), 名洗(千葉県1977a)
分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 東シナ海, 西太平洋(砂礫底)
- 2377 *Cryptopecten vesiculosus* (Dunker, 1877) ヒヨクガイ
産地: 竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(水深84m: 藤田1929a; 村越1998; 清水), 布良, 白浜(清水), 鴨川(大島1993), 小湊(猪野1942d; 大島1993), 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
分布: 房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深50~600m, 貝殻混じりの粗砂底)
- 2378 *Cryptopecten bullatus* (Dautzenberg & Bavay, 1912) ヒラヒヨク
産地: 銚子(渡辺1988)
分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, 南シナ海, フィリピン, ハワイ(水深50~200m, 粗砂底)
- 2379 *Decaptoecten striatus* (Schmacher, 1817) キンチャクガイ
産地: 竹岡, 萩生, 富山沖水深130m, 富浦(清水), 館山湾(佐々木1989; 堀越1990; 村越1998; 奥谷ら*; 清水), 布良, 白浜(清水), 鴨川, 小湊(大島1993), 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
分布: 房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 東南アジア, インドネシア(潮間帯~水深50m, 砂礫底)
- 2380 *Excellichlamys spectabilis* (Reeve, 1853) チヒロガイ
産地: 小湊(大島1993)
分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深10m, 岩礁底)
- 2381 *Delectopecten vitreus macrocheileicola* Habe, 1951 ハリナデシコ
産地: 竹岡(清水), 小湊(猪野1942d; 大島1993), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 北海道以南, 本州, 四国, 九州, 東シナ海; 能登半島(水深50~1,350m, タカアシガニの甲や他物に付着)
- 2382 *Delectopecten alcocki* (Smith, 1904) ギンリンハリナデシコガイ
産地: 房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995)
分布: 房総半島沖(水深507~578m, 泥底), フィリピン~インド洋(土田ら1995)
- 2383 *Delectopecten randolphi* (Dall, 1897) オオハリナデシコ
分布: 相模湾以北の北太平洋, 日本海(水深20~3,080m, 泥底)
- 2384 *Pecten sinensis puncticulatus* Dunker, 1877 ハナイタヤ
産地: 竹岡, 萩生, 富浦(清水), 館山湾(佐々木1989; 村越1998; 奥谷ら*; 清水), 布良, 白浜(清水), 鴨川, 天津(大島1993), 小湊(猪野1942d; 大島1993), 浜行川(大島1993), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 鶴岡ら1994; 清水)
分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 東シナ海朝鮮南部(水深10~80m, 砂底)
- 2385 *Pecten albicans albicans* (Schröter, 1802) イタヤガイ
産地: 竹岡, 萩生, 金谷, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山沖(Sakurai, 1959), 館山湾(水深26~27m: 瀧原1949; 神奈川県博1972; 水深30~70m: 田中1980; 佐々木1989; 堀越1990; 水深45m: 田中1997; 清水), 布良, 白浜(清水), 鴨川, 天津(大島1993; 清水), 小湊(猪野1942d; 大島1993; 清水), 安房(岩川1905), 勝浦(清水), 銚子(福井市博1962; 鹿股ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
分布: 北海道南部・男鹿半島以南, 四国, 九州, 朝鮮, 中国, 東シナ海(水深10~100m, 砂底)
- 2386 *Patinopecten yessoensis* (Jay, 1857) ホタテガイ
産地: 勝山養殖, 館山湾養殖(田中ら1969), 館山湾水深20~50fms., 小湊湾水深20~50fms. (稲葉1963a), 白里沖採苗器(1975年: 天然稚貝), 白里沖養殖(1979年: 清水), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 九十九里・能登半島以北, 北海道, 千島, 朝鮮東岸, 沿海州(水深10~50m, 砂礫底)
- 2387 *Amusium japonicum japonicum* (Gmelin, 1791) ツキヒガイ
産地: 竹岡, 萩生(清水), 金谷(神奈川県博1991; 清水), 館山湾(稲葉1963a; 佐々木1990; 奥谷ら*; 清水), 鴨川(大島1993), 小湊(猪野1942d; 大島1993; 清水), 銚子(渡辺1988), 房総半島(奥谷・波部1975)
分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 朝鮮南部(水深10~100m, 粗砂底)
- Family Peropaeomussidae
ワタゾコツキヒ科

- 2388 *Propeamussium caducum* (E. A. Smith, 1885) ワタゾコツキヒ
産地: 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 銚子以南, 四国, 九州西南岸, 東シナ海, 南シナ海, インドネシア(水深200~1,500m, 泥底)
- 2389 *Propeamussium scitulum* (E. A. Smith, 1885) クマドリツキヒ
分布: 房総半島以南, 四国, 九州西南岸, 東シナ海, 南シナ海, インドネシア(水深40~500m, 砂底)
- 2390 *Propeamussium watosoni* (E. A. Smith, 1885) シンテイツキヒ
分布: 相模湾からニューギニアの西太平洋(水深2,000m, 泥底)
- 2391 *Propeamussium siratama* (Oyama, 1951) シラタマツキヒ
分布: 房総半島以南, 四国, 九州(水深100~300m, 泥底)
- 2392 *Polyneamussium intuscostatum* (Yokoyama, 1920) モトリニシキ
産地: 銚子(稲葉1963)
分布: 津軽海峡・三陸沿岸以南, 四国, 九州, 種子島(水深50~400m, 細砂泥底)
- 2393 *Cyclopecten bistriatus* (Dall, 1916) コウシハリナデシコ
分布: 相模湾, カリフォルニア(水深710~1,385m)
- 2394 *Cyclopecten nakaii* Okutani, 1962 ナカイニシキ
産地: 房総半島沖水深638-704m泥底(上田ら1995)
分布: 相模湾, 本州中部沖(水深550~800m)
Family Spondylidae
- 2395 *Spondylus anacanthus* Mawe, 1823 ウミギク科
オオナデシコ
産地: 小湊(猪野1942d)
分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(水深30~300m, 岩礁・岩礫底)
- 2396 *Spondylus balbaeus* Reeve, 1856 ウミギク
産地: 竹岡, 萩生, 富浦, 館山湾(清水), 館山市伊予(稲葉1963a), 布良, 白浜, 太海(清水), 天津(大島1993; 小池1994; 清水), 小湊(稲葉1963a; 大島1993; 小池1994; 清水), 勝浦, 御宿(大島1993; 清水), 銚子(渡辺1988)
分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 東南アジア, 西太平洋(潮間帯~水深100m, 岩礫底)
- 2397 *Spondylus cruentus* Lischke, 1868 チリボタン
産地: 竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(奥谷ら*; 清水), 布良, 白浜, 千倉, 鴨川(清水), 小湊(猪野1942d; 清水), 興津(清水), 銚子(稲葉1963)
分布: 三陸・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~水深20m, 岩礁に右殻で付着)
- 2398 *Eltoperna sanguinea* (Dunker, 1852) チイロメンガイ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
Superfamily Anomiacea
Family Anomiidae
- 2399 *Anomia chinensis* Philippi, 1849 ナミマガシワ上科
ナミマガシワ科
ナミマガシワ
産地: 浦安(千葉水試1957), 富津(千葉県企業庁1978), 富津岬水深3.2m, 第2海堡水深18.5m, 富津南水深5.8m, 磯根塔水深7.5m, 竹岡水深3.0m, 萩生, 富浦(清水), 館山湾(堀越1990; 清水), 布良, 白浜(清水), 鴨川, 天津(大島1993; 清水), 小湊(猪野1942d; 大島1993; 清水), 勝浦, 御宿(大島1993; 清水), 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
分布: 北海道南部以南の日本全国, 東南アジア(潮間帯~水深80m, 内湾の礫混じりの粗砂底, 岩などに付着)
- 2400 *Monia umbonata* (Gould, 1861) シマナミマガシワモドキ
産地: 小湊(大島1993), 銚子(渡辺1988)
分布: 北海道南部以南, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 中国, 東シナ海(潮間帯~水深300m, 岩礫に付着)
- 2401 *Monia macroschisma* (Deshayes, 1839) ナミマガシワモドキ
産地: 天津(大島1993), 安房(岩川1905), 銚子(櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 銚子以北, 北海道, アリューシャン列島, ベーリング海, カナダ西岸(潮間帯~水深40m, 岩礫に足糸で付着)
Suborder Ostreina
Superfamily Plicatulacea
Family Plicatulidae
- 2402 *Plicatula simplex* Gould, 1861 カキ上科
ネズミノテ上科
ネズミノテ科
ネズミノテ
産地: 竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦, 館山湾, 布良, 白浜(清水), 鴨川, 小湊(大島1993), 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
分布: 房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州, 中国南部(水深5~50m, 砂・岩礫底)
- 2403 *Plicatula plicata* (Linnaeus, 1767) エダウネイシガキモドキ
分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(水深5~50m, 岩礫底)
- 2404 *Plicatula australis* Lamarck, 1819 カスリイシガキモドキ
産地: 小湊(大島1993)
分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 熱帯太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礫底)
- 2405 *Plicatula horrida* Dunker, 1882 イシガキモドキ
産地: 館山湾(奥谷ら*)
分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 熱帯西太平洋(水深10~20m, 岩礫底)
- 2406 *Spiniplicatula muricata* Sowerby II, 1873 モグラノテ
産地: 鴨川, 小湊(大島1993)
分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 東シナ海, 中国南部(水深5~200m, 砂礫底)
Superfamily Dimyoidea
Family Dimyidae
- 2407 *Dimya filipina* Bartsch, 1913 イシガキ上科
イシガキ科
イシガキ
分布: 相模湾・若狭湾以南, 四国, 九州西岸, フィリピン, 西太平洋(水深20~200m, 岩礫に貝殻で固着)
- 2408 *Dimya japonica* Habe, 1971 ギンバクイシガキ
産地: 銚子(稲葉1963; 渡辺1988)
分布: 房総半島・富山湾以南, 四国, 東シナ海(水深20~600m, 砂礫底, 右殻頂が付着)
Superfamily Ostracea
- カキ上科

- Family Glypheaidae
- 2409 *Neopycnodonte cochlear* (Poli, 1795) ベッコウガキ科
ベッコウガキ
産地: 竹岡, 萩生, 金谷, 富山, 富浦(清水), 館山湾(水深84m; 藤田1929a; 佐々木1990; 奥谷ら*; 水深80m; 清水), 千倉(清水), 鴨川(大島1993), 天津, 小湊, 浜行川(大島1993; 清水), 銚子(稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
分布: 北海道南部・男鹿半島以南, 本州, 四国, 九州, 東シナ海(水深20~500m, 岩礁底や他物に付着)
- 2410 *Hytissa imbricata* (Lamarck, 1819) カキツバタ
産地: 富浦(清水), 館山湾(龍崎1949; 稲葉1963a; 佐々木1989; 奥谷ら*; 清水), 鴨川, 小湊(大島1993), 安房(福井市博1962)
分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 中国, 東南アジア(水深10~50m, 岩礁底)
- 2411 *Hytissa chemnitzii* (Hanley, 1846) ベニガキ
分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, 熱帯西太平洋(潮間帯~水深100m, 岩礁底)
- 2412 *Pretostrea rosacea* (Deshayes, 1836) カノコガキ
分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 熱帯太平洋(潮間帯下部~水深30m, 岩礁・貝殻底)
- Family Ostreidae
- 2413 *Crassostrea gigas* (Thunberg, 1793) イタボガキ科
マガキ
産地: 市川放水路(市川市博1993), 浦安(千葉水試1901), 新浜(風呂田1976), 船橋(風呂田1984; 清水), 千葉(風呂田1985c; 清水), 五井(風呂田1984; 清水), 盤洲(日本水産資源保護協会1992), 市原(千葉水試1901), 木更津, 富津(千葉水試1901; 千葉県企業庁1978; 清水), 竹岡, 萩生, 富浦(清水), 館山湾(佐々木1990; 奥谷ら*; 清水), 布良, 白浜, 千倉(清水), 太海, 鴨川, 天津(大島1993; 清水), 小湊(猪野1942d; 大島1993; 小池1994; 清水), 勝浦, 御宿, 大原(大島1993; 清水), 白里沖採苗器, 九十九里沖水深25m(清水), 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 宇野ら1965; 渡辺1988; 鶴岡ら1994; 三田ら1999), 利根川河口(菅原ら1970)
分布: 樺太・千島以南北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 中国, 東南アジア(潮間帯, 岩礁・岩礁に群生)
- 2414 *Crassostrea nippona* (Seki, 1934) イワガキ
産地: 富浦(三田ら1999), 館山湾(奥谷ら*), 平砂浦, 布良, 千倉, 和田, 鴨川(三田ら1999), 太海, 鴨川, 天津(大島1993), 小湊(猪野1942d; 大島1993), 勝浦, 御宿, 大原(大島1993), 名洗, 外川(宇野ら1965), 銚子(稲葉1963; 宇野ら1965; 渡辺1988; 鶴岡ら1994; 三田ら1999)
分布: 陸奥湾・津軽半島以南, 四国, 九州(潮間帯下部~水深20m, 岩礁底)
- 2415 *Saccostrea mordax* (Gould, 1850) オハグロガキ
産地: 小湊(大島1993)
分布: 紀伊半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, 熱帯インド・太平洋(潮間帯, 岩礁)
- 2416 *Saccostrea kegaki* Torigoe & Inaba, 1981 ケガキ
産地: 館山湾(お茶大館山1973; 佐々木1990; 奥谷ら*; 清水), 小湊(猪野1942d; 大島1993; 小池1994; 清水), 銚子(稲葉1963)
分布: 北海道南西部・津軽半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・西太平洋(潮間帯, 岩礁)
- 2417 *Ostrea denselamellosa* Lischke, 1869 イタボガキ
産地: 五井(岩川1905), 小櫃川河口干潟(秋山1974), 東京湾(福井市博1962), 富津岬南(千葉内湾水試1959), 竹岡, 萩生, 富浦, 館山湾(清水), 沖ノ島(お茶大館山1973), 天津(清水), 小湊(大島1993; 鶴岡ら1994)
分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 朝鮮, 中国, 東シナ海(潮間帯~水深20m, 砂泥底及び岩礁底)
- 2418 *Ostrea circumpecta* Pilsbry, 1904 コケゴロモ
産地: 館山湾(沖ノ島; お茶大館山1973; 佐々木1989; 奥谷ら*), 名洗(千葉県1977a)
分布: 陸奥湾以南, 四国, 九州, 朝鮮, 中国(潮間帯下部~水深30m, 岩礁底)
- 2419 *Ostrea fluctigera* Jousseaume, 1894 ナガレガキ
分布: 太平洋側(34° ~35° N)
- 2420 *Dendostrea folium* (Linnaeus, 1758) ワニガキ
産地: 館山湾(佐々木1989; 奥谷ら*)
分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾, 熱帯西太平洋(水深5~30m, 岩礁上の腔腸動物等に付着)
- 2421 *Dendostrea crenulifera* (Sowerby II, 1878) ノコギリガキ
分布: 房総半島・隠岐島以南, 対馬, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾, 熱帯西太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礁・貝殻等に付着)
- Subclass Palaeopeterodonta
- Order Unionidae
- Family Margaritiferidae
- 2422 *Margaritifera (Dahurinaia) laevis* (Haas, 1910) カワシンジュガイ科
カワシンジュガイ
分布: 本州以北, 北海道, 千島, 樺太, シベリア(淡水産, 砂礫底)
- Family Unionidae
- 2423 *Unio (Nodularia) douglasiae nipponensis* v. Martens, 1877 イシガイ科
イシガイ
産地: 成田市(印旛沼), 銚子市, 東庄町, 小見川町, 海上町(成毛1999)
分布: 北海道, 本州, 四国, 九州(淡水産, 各地の河川の砂礫底)
- 2424 *Inversidens (Pronodularia) japonensis* (Lea, 1859) マツカサガイ
産地: 千葉市, 長柄町, 勝浦市(成毛1999)
分布: 北海道, 本州, 四国, 九州(淡水産, 各地の河川の砂礫底)
- 2425 *Hyriopsis (Sinohyriopsis) schlegeli* (Martens, 1891) イケチョウガイ
分布: 琵琶湖, 霞ヶ浦(移入)(淡水産, 砂泥底)
- 2426 *Cristaria plicata* (Leach, 1815) カラスガイ
産地: 印旛沼(石井1969; 神奈川県博1991; 成毛1999), 手賀沼(石井1969), 成田市, 小見川町(成毛1999)
分布: 北海道, 本州, 四国, 九州(淡水産, 河川・湖沼の砂泥底)
- 2427 *Anodonta (Sinanodonta) woodiana* (Lea, 1834) ドブガイ
産地: 印旛沼(移入; 千葉水試1920), 手賀沼(千葉水試1938), 本基村甚兵衛沼, 海上町, 小見川町, 長柄町, 長南町, 多古町, 大多喜町(成毛1999), 銚子(鶴岡ら1994)
分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 中国, 台湾(淡水産, 河川・湖沼の砂泥底)
- Subclass Heterodonta
- Order Veneroida
- Superfamily Lucinacea
- Family Lucinidae
- 2428 *Epicodakia bella* (Conrad, 1837) 異歯亜綱
マルスダレガイ目
ツキガイ上科
ツキガイ科
ヒメツキガイ
産地: 小湊(猪野1942d)

- 分布: 紀伊半島・能登半島以南, 奄美, 沖縄, インド・西太平洋, ハワイ(潮間帯~水深20m, 砂底)
- 2429 *Epicodakia delicatula* (Pilsbry, 1904) ウミアサ
産地: 萩生(水深15.0m粗砂底:水産庁1982;清水), 館山湾(佐々木1989;奥谷ら*;清水), 布良, 白浜(清水), 小湊, 御宿(大島1993)
分布: 房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 東南アジア(潮間帯~水深20m, 粗砂底)
- 2430 *Pillucina (Pillucina) pisidium* (Dunker, 1860) ウメノハナガイ
産地: 浦安(千葉水試1957), 館山湾(佐々木1990;奥谷ら*), 御宿(大島1993), 銚子(宇野ら1965;渡辺1988)
分布: 北海道南部・津軽半島以南, 本州, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾(内湾の潮間帯~水深30m, 細砂泥底)
- 2431 *Pillucina (Sydlorina) yamakawai* (Yokoyama, 1920) アラウメノハナ
産地: 保田水深81m(千葉水試1980b), 勝山(水深34m:千葉水試1980b;水深36.0m砂泥礫底:水産庁1982), 小湊(大島1993)
分布: 房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 熱帯太平洋(水深5~150m, 砂泥底)
- 2432 *Wallucina striata* (Tokunaga, 1906) チヂミウメ
産地: 第1海堡南西水深21.5m(清水), 館山湾(佐々木1990;奥谷ら*), 御宿(大島1993), 大原(清水)
分布: 三陸沿岸・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾(潮間帯~水深300m, 細砂泥底)
- 2433 *Bellucina civica* (Yokoyama, 1927) ムツキウメ
産地: 銚子(渡辺1988)
分布: 房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾, フィリピン, インドネシア(水深50~400m, 細砂底)
- 2434 *Myrtea (Notomyrtea) soyoae* Habe, 1951 ワタソコツキガイ
産地: 銚子(渡辺1988)
分布: 房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州(水深30~200m, 細砂泥底)
- 2435 *Lucinoma acutifilium* (Conrad, 1849) ツキガイモドキ
産地: 行徳水深5m(清水), 船橋沖, 千葉沖, 市原沖(波部1952), 姉ヶ崎沖(風呂田1986a), 中ノ瀬(堀越ら1974), 盤洲沖(波部1952;水深21.0m泥底:水産庁1982), 富津沖水深15.5m(清水), 富津岬南(千葉内湾水試1959), 小湊(大島1993), 名洗(千葉県1977a), 銚子(櫻井1964;渡辺1988)
分布: 北海道南部・津軽半島以南, 本州, 四国, 九州, 東シナ海; アラスカ~南カリフォルニア(内湾の水深10~50m, 泥底; 大陸棚の水深100~200m, 砂底)
- 2436 *Lucinoma spectabile* (Yokoyama, 1920) オオツキガイモドキ
産地: 館山湾水深84m(藤田1929a), 天津, 小湊(大島1993), 銚子(渡辺1988)
分布: 房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州(水深50~700m, 泥底)
- 2437 *Lucinoma adamsianum* Habe, 1958 アダムスツキガイモドキ
分布: 房総半島・日本海見島沖以南, 相模湾, 紀伊半島, 九州西岸(水深80~150m, 砂泥底)
- 2438 *Lucinoma yoshidai* Habe, 1958 ヨシダツキガイモドキ
産地: 九十九里沖水深300m(L 82.2mm, H 70.7mm, W 47.5mm:清水), 銚子(稲葉1963;渡辺1988)
分布: 紀伊半島・島根県沖以北, 相模湾, 銚子沖, 但馬沖, 山形県沖(水深100~200m, 砂底)
- 2439 *Gonimyrrtea japonica* (Habe, 1958) マルツキガイモドキ
産地: 小湊(大島1993)
分布: 房総半島・若狭湾以南, 山口県沖(水深60~20m, 砂泥底)
- 2440 *Anodontia strearnsiana* Oyama, 1954 イセシラガイ
産地: 浦安(Oyama & Takemura, 1960), 飯岡(渡辺1988), 銚子(鶴岡ら1994)
分布: 北海道南部以南, 本州, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~水深20m, アジモ帯の泥底・砂底)
- 2441 *Divaricella soyoae* (Habe, 1951) セワケツキガイ
分布: 房総半島以南, 四国, 九州西岸沖(水深100~200m, 細砂底)
- Family Thyasiridae
- 2442 *Conchocele bisecta* (Conrad, 1849) ハナシガイ科
産地: 銚子(稲葉1963;渡辺1988)
分布: 土佐沖・但馬沖以北, 北海道, アラスカ, 北米西岸(潮下帯~水深1,400m, 泥底)
- 2443 *Thyasira tokunagai* Kuroda & Habe in Habe, 1961 ハナシガイ
産地: 富山水深48.5m砂泥底(水産庁1982), 銚子(稲葉1963;渡辺1988)
分布: 北海道・山形県粟島以南, 本州, 四国, 九州(水深5~300m, 砂泥底)
- 2444 *Thyasira (Phillis) cumingii* Fischer, 1861 オトギノハナシガイ
分布: 房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州, インドネシア(水深30~1,220m, 細砂泥底)
- 2445 *Thyasira (Parathyasira) kawamurai* Habe, 1951 カワムラハナシガイ
分布: 相模湾以西, 駿河湾, 尾鷲沖, 紀伊半島沖(水深50~200m, 細砂底)
- 2446 *Thyasira (Parathyasira) hexangulata* (Okutani, 1968) ロッカクハナシガイ
分布: 相模湾以西, 紀伊半島沖, 九州西岸沖(水深50~200m, 砂底)
- 2447 *Lepraxinus oyamai* Habe, 1962 マルハナシガイ
産地: 館山湾水深11.5m砂泥底(水産庁1982)
分布: 相模湾・能登半島以南, 四国, 九州西岸(水深10~100m, 細砂泥底)
- 2448 *Adontorhina subquadrata* (A. Adams, 1862) ユキヤナシガイ
分布: 房総半島・山口県見島以北, 北海道, オホーツク海(水深5~300m, 砂泥底)
- 2449 *Axinulus kelliiformis* Okutani, 1962 サガミマルハナシガイ
分布: 相模湾
- 2450 *Axinulus obliqua* Okutani, 1968 ナナメハナシガイ
分布: 相模湾
Family Ungulinidae
- 2451 *Cycladicama cumingii* (Hanley, 1844) フタバシラガイ科
産地: 館山湾水深18m泥底(千葉水試1980b), 銚子(稲葉1963;渡辺1988)
分布: 三陸沿岸・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 東南アジア(水深10~175m, 砂泥底)
- 2452 *Cycladicama nomurai* Habe, 1960 ノムラシオガマ
分布: 房総半島・但馬沖以南, 四国, 九州(水深10~70m, 砂泥底)
- 2453 *Cycladecama coreensis* (Adams & Reeve, 1850) オウバイ