

令和4年度 千葉県立野田看護専門学校 一般入学試験問題

看護全般

解答は全て解答用紙に、番号又は数値で記入すること。

問題1 看護について、正しいものはどれか。

- 1. ヘンダーソンは、日常の生活様式をまもり、基本的ニードを満たすことであると述べている。
- 2. ロイは、患者と看護者との有意義で治療的な人間関係のプロセスであると述べている。
- 3. オレムは、身体と心と魂が統一され、その人が癒されることを助けると述べている。
- 4. ナイチンゲールは、ケアリングの実践であると述べている。

問題2 災害時のトリアージについて正しいものはいくつあるか。

- a. 区分（カテゴリー）は、5つに分かれている。
- b. 一人の傷病者に対して複数の医師が行う。
- c. 治療・搬送の優先順位をつける。
- d. 繁急度と重症度を判定する。

1. 1つ 2. 2つ 3. 3つ 4. 4つ

問題3 標準予防策で誤っているものはどれか。

- 1. 眼鏡はゴーグルの代用にならない。
- 2. 清菌された注射器具は清菌操作で取り扱う。
- 3. 病室から出た後にガウンを脱ぎ、手指衛生を行う。
- 4. 目に見える手指汚染がない時、擦式消毒薬を用いる。

問題4 食事介助について適切なものはどれか。

- a. 姿勢は、頸部前屈位となるようクッションや枕で調整する。
- b. 片麻痺がある場合は、患者の患側から介助する。
- c. 吸い飲みは、患者の口角から差し込むように入れる。
- d. 疲労がみられるときは、食後はただちに仰臥位を促す。

1. a, b 2. b, c 3. c, d 4. a, c

問題5 グリセリン浣腸について適切なものはいくつあるか。

- a. 体位は左側臥位とする。
- b. 注入液の温度は42~43℃とする。
- c. 挿入するカテーテルの長さは7cmとする。
- d. 浣腸液の注入は3秒間で10mLとする。

1. 1つ 2. 2つ 3. 3つ 4. 4つ

問題 6 5%ブドウ糖液 500mL に薬液 10mL を混和させた輸液を、成人用輸液セット（20滴/mL）を用いて 60滴/分の速度で滴下した。2時間 30分後の輸液残量を求めよ。ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

問題 7 500L の酸素ボンベ（14.7MPa で充填されたもの）の圧力計が 9 MPa を示している。2 L/分の酸素療法を行っている場合の使用可能な時間を計算しなさい。ただし、小数点以下の数値が得られた場合は、小数点以下第1位を四捨五入とする。

問題 8 ジャパンコーマスケール（JCS）による意識障害レベルの分類でⅢ—200 に当たる状態はどれか。

1. 痛み刺激を加えながら呼びかけを繰り返すとかろうじて開眼する。
2. 痛み刺激に対し、少し手足を動かしたり、顔をしかめる。
3. 痛み刺激に対し、払いのけるような動作をする。
4. 痛み刺激に全く反応しない。

問題 9 深部静脈血栓症の予防の看護について正しいものはいくつあるか。

- a. 弾性ストッキングの着用や間欠的空気圧迫法を実施する。
- b. 呼吸困難感を観察する。
- c. 早期離床を促す。
- d. 水分を控える。

1. 1つ 2. 2つ 3. 3つ 4. 4つ

問題 10 造血幹細胞移植術を受ける患者の入院中の看護について正しいものはいくつあるか。

- a. 本人が納得して治療選択できるよう意思決定を支援する。
- b. 治療中の孤独感を軽減するため、移植後の面会は制限しない。
- c. 移植直後は患者の骨髄機能が維持されるので、全身状態は安定する。
- d. GVHD（移植片体宿主病）は一過性の症状のため、長期的には問題ないことを説明する。

1. 1つ 2. 2つ 3. 3つ 4. 4つ 5. なし

問題 11 眼疾患患者の看護について正しいものはどれか

- a. 加齢黄斑変性のレーザー手術後 2週間は、強い光を避けるように指導する。
- b. 緑内障患者の点眼は、時間ごとに行う必要があるので、確実に行う。
- c. 白内障手術では、付き添いの人につれてもらう。
- d. 網膜剥離術後患者の安静は制限しない。

1. a, b 2. b, c 3. c, d 4. a, d

問題 12 55 歳の男性。脳血管造影検査を行うこととなった。当日は、右鼠径部からカテーテルを挿入する。脳血管造影検査時の看護について適切でないものはどれか。

1. 検査前に床上排泄訓練を行う。
2. 検査終了後から 12 時間は、仰臥位での安静が必要であることを説明する。
3. 検査終了後は、15 分間カテーテルの挿入部を圧迫し、止血する。
4. 検査後は、穿刺動脈末梢の触知を確認する。

問題 13 右乳房切除術を受けた患者への説明で適切でないものはどれか。

1. 「リハビリテーションは管（右創部のドレーン）が抜けてから始めましょう。」
2. 「右腕で重い荷物を持たないようにしましょう。」
3. 「血圧測定・採血・注射は左腕で行いましょう。」
4. 「退院後は乳房の自己検診を行いましょう。」

問題 14 薬物療法を受ける高齢者の看護で適切なのはどれか。

1. 食品との相互作用は考慮しなくてよい。
2. 薬剤は、少量の水で服用するように説明する。
3. 常用薬と外用薬は、一緒に保管するように指導する。
4. 錠剤やカプセル剤は、噛み碎いて飲まないように説明する。

問題 15 長期臥床状態にある患者の合併症とその予防との組み合わせで適切なものを全て選べ。

- | | | |
|-----------|-------|----------------|
| 1. 起立性低血圧 | _____ | ベッドを徐々に起こす |
| 2. 関節拘縮 | _____ | 他動運動を行う |
| 3. 骨折 | _____ | ビタミン E の摂取を促す |
| 4. 褥瘡 | _____ | プレーデンスケールで評価する |

問題 16 高齢者をとりまく社会制度について誤っているものはどれか。

1. 地域包括支援センターの設置主体は、都道府県である。
2. 介護保険制度の第 1 号被保険者は、65 歳以上である。
3. 成年後見人は、財産管理や生活・療養監護を行う。
4. 虐待の発見時は、市町村に通報する。

問題 17 マタニティブルーズの症状がみられる婦婦への看護で適切なものはいくつあるか。

- a. 涙もろさや焦燥感の訴えがあるときは、婦婦の話をよく聞く。
- b. 育児技術は、家族にも技術指導をする。
- c. 夜間に新生児を預かり、休息を促す。
- d. あせらず授乳できるように見守る。

1. 1つ 2. 2つ 3. 3つ 4. 4つ

問題 18 循環器疾患を持つ患児の看護で正しいものはいくつあるか。

- a. 無酸素発作時には抱いてあやすなどスキンシップに努める。
- b. ファロー四徴症の患児は、チアノーゼの増強を予防する。
- c. 心不全のある患児は、哺乳力低下や多呼吸を観察する。
- d. 川崎病患児には、アスピリンを確実に服用させる。

1. 1つ 2. 2つ 3. 3つ 4. 4つ 5. なし

問題 19 精神疾患治療中の看護について適切なものはいくつあるか。

- a. 気分の高揚があり病識に乏しい患者は、入院当初から社会生活技能訓練（SST）への参加を促す。
- b. 向精神薬を拒薬した場合は、患者に気づかれないようにジュースに混ぜて服用させる。
- c. 精神運動興奮がある身体的拘束中の患者は、出来るだけ会話を避ける。
- b. 電気けいれん療法後は、一過性の健忘を観察する。

1. 1つ 2. 2つ 3. 3つ 4. 4つ

問題 20 精神疾患患者の行動制限に伴う看護で誤っているものはどれか。

- 1. 隔離室での援助は複数人で対応する。
- 2. 任意入院の患者は開放処遇とする。
- 3. 身体拘束中は30分毎に観察を行う。
- 4. 通信・面会は基本的に自由である。