

ミカン生育情報

第 6 報

千葉県農林水産部

令和4年 11月号

早生温州の成熟は平年よりやや進んでいます。

完全着色した果実から減酸を確認し、順次収穫しましょう！

1 令和4年10月の気象

令和4年10月の半旬別の気象を表1に示した。平均気温は第1半旬が平年より高く、第2、第6半旬は平年より低かった。第3～第5半旬は平年並に推移した。月平均気温は17.4°Cで平年より0.8°C低く、前年より1.0°C高かった。

降水量は第2半旬で平年より多く、それ以外では平年より少なかった。月合計は128mmで、平年の50%、前年の41%であった。

日照時間は第1、第6半旬で平年より多く、第4半旬は平年並み、第2～第4半旬は平年より少なかった。月合計は145時間で、平年の105%、前年の91%であった。

10月は全体的には気温は平年より低く、降水量は平年より少なく、日照時間は平年よりやや多かった。

表1 令和4年10月の気象（暖地園芸研究所）

半旬	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(hr)		
	本年	平年	前年	本年	平年	前年	本年	平年	前年
1	22.3	20.6	21.9	11	45	166	31	21	31
2	16.2	19.3	22.5	81	47	13	8	21	30
3	18.5	18.9	20.7	25	43	6	13	22	20
4	17.5	17.7	16.5	10	41	28	16	22	16
5	17.1	16.9	13.6	2	40	49	24	23	27
6	13.8	16.2	15.3	1	40	49	53	29	34
平均/計	17.4	18.2	18.4	128	255	309	145	138	159

2 果実及び樹の生育

11月1日における調査園の果実生育状況を表2に示した。横径は「興津早生」、「大津4号」、「青島温州」が3地区の平均でそれぞれ6.8cm、7.5cm、7.5cmで、3品種ともほぼ平年並であった。

縦径は「興津早生」、「大津4号」、「青島温州」が3地区の平均でそれぞれ5.3cm、5.3cm、5.3cmで、3品種ともほぼ平年並であった。

果形指数は、「興津早生」、「大津4号」、「青島温州」が3地区の平均でそれぞれ1.3、1.4、1.4で、いずれも平年並みであった。

今年度の果実の生育は、全体的に平年並の傾向である。

表2 果実の生育（令和4年11月1日）

品種	調査地	横径(cm)			縦径(cm)			果形指数		
		本年	平年	前年	本年	平年	前年	本年	平年	前年
興津早生	三芳地区	6.8	6.5	5.3	5.5	5.0	4.0	1.2	1.3	1.3
	千倉地区	6.2	6.2	5.7	4.6	4.7	4.3	1.3	1.3	1.3
	暖地園研	7.4	6.6	4.4	5.7	5.1	3.6	1.3	1.3	1.2
	平均	6.8	6.4	5.1	5.3	4.9	4.0	1.3	1.3	1.3
大津4号	三芳地区	7.4	7.0	6.4	5.4	4.9	4.4	1.4	1.4	1.5
	千倉地区	7.2	7.1	6.6	4.9	4.8	4.5	1.5	1.5	1.5
	暖地園研	7.9	7.4	7.7	5.5	5.0	5.1	1.4	1.5	1.5
	平均	7.5	7.2	6.9	5.3	4.9	4.7	1.4	1.5	1.5
青島温州	三芳地区	7.5	7.0	6.4	5.4	5.0	4.5	1.4	1.4	1.4
	千倉地区	7.0	6.9	6.7	4.8	4.8	4.5	1.5	1.4	1.5
	暖地園研	8.1	7.3	7.7	5.6	5.0	5.5	1.4	1.5	1.4
	平均	7.5	7.1	6.9	5.3	4.9	4.8	1.4	1.4	1.4

注1) 各地点の各品種の値は40果の平均とした

ただし、鳥害、落果等により調査果実を変更した

2) 果形指数は、横径／縦径とした

3 「興津早生」の果実品質

「興津早生」の果実品質を表3に示した。

着色程度は、3地区の平均で7.4であった。千倉地区及び暖地園研では平年より高い傾向であった。

糖度は、3地区の平均で9.0であった。三芳地区と千倉地区では平年及び前年より低く、暖地園研ではほぼ平年よりやや高く、前年と同程度であった。

酸度は、3地区の平均で1.03であった。三芳地区、暖地園研では平年より高く、千倉地区では平年より低い傾向であった。いずれも前年より高い傾向であった。

甘味比は、3地区の平均で9.3であった。三芳地区と暖地園研では平年より低く、千倉地区では平年より高い傾向であった。

果肉歩合は、3地区の平均で82.0%であった。いずれもほぼ平年及び前年と同程度であった。

表3 早生温州「興津早生」の果実品質（令和4年11月1日）

調査地	着色程度 (0~10)			糖度 (%)			酸度 (%)			甘味比			果肉歩合 (%)		
	本年	平年	前年	本年	平年	前年	本年	平年	前年	本年	平年	前年	本年	平年	前年
三芳地区	6.0	6.7	7.4	9.1	9.6	11.0	1.15	0.94	0.64	8.3	10.9	17.5	82.4	81.5	82.6
千倉地区	8.3	7.3	7.7	8.4	9.7	9.4	0.81	1.09	0.77	10.5	9.2	12.9	81.5	82.1	77.7
暖地園研	8.0	7.0	8.5	9.5	8.8	9.4	1.13	1.00	0.76	9.1	9.4	12.6	82.0	82.0	83.3
平均	7.4	7.0	7.9	9.0	9.4	9.9	1.03	1.01	0.72	9.3	9.9	14.3	82.0	81.9	81.2

注1) 平年値は平成13～令和3年の平均値

2) 甘味比=糖度／酸度

3) 果肉歩合=(果肉重／1果重) ×100

4 11月の栽培管理

(1) 早生温州の収穫・予措

品質を揃えるため、まずは全体の約半数の果実（完全着色果のみ）を収穫する。さらにそこから 10 日後に、8 分着色以上のものを収穫する。収穫時のハサミ傷や落果は収穫果実の腐敗の大きな要因となるため、必ず手袋をはめ、先の丸い採果鉄を用いる。収穫容器は肩から掛ける袋か、かごを用いる。

収穫直後の果実は果皮の水分が多いので予措を行う。コンテナに果実を 7 分目ほど入れ、風通しのいい日陰に 2 ~ 3 日置くと、果皮がしなやかになり、選果や出荷時の傷果の発生予防になる。

(2) 秋肥

早生温州では 11 月上旬、普通温州では 11 月中旬に、ともに窒素、りん酸、カリをそれぞれ 10a 当たり成分量で 6、4、6 kg 施用する。秋肥は適期に施用することが重要で、早すぎると着色の遅れや浮皮果が生じ、逆に遅すぎると低温のため吸収が悪くなる。乾燥の影響で樹勢が落ちた樹には、収穫後直ちに液肥を散布する。

(3) 病害虫の防除

貯蔵病害である青かび病・緑かび病の予防には収穫前日までにペフラン液剤 25 (2000 倍液) ※等の殺菌剤の散布を行う。

ミカンハダニやカメムシ類は発生に応じて防除を行うが、収穫を間近に控えた品種では、農薬の使用基準にある収穫前日数に注意する。

ミカンハダニやカイガラムシが多い園では、収穫後にマシン油乳剤を用いて防除する。樹勢の弱い樹や寒害を受けやすい園地では、寒い時期の散布を避ける。

※早生温州等、収穫の早い品種については農薬の使用から収穫までの日数に注意する。
※農薬の登録内容は変更になる場合があるため、農薬使用の際は最新情報を確認する。

なお、表の数値は表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計は一致しない場合がある。

《 生育情報の問合せ先 》 千葉県農林総合研究センター 暖地園芸研究所 特産果樹研究室 電話 0470-22-2961 ※果樹の生育情報は「ちばの農林水産業」の「生育情報」でも御覧いただけます。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/seisan/seijiku/index.html>