

(34) れんこん

ア 各病害虫の防除

褐斑病

腐敗病

アブラムシ類

イネネクイハムシ

スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)

レンコンネモグリセンチュウ(黒皮線虫病)

ア 各病害虫の防除

【留意事項】

(□は総合防除計画に掲載している病害虫)

褐斑病

(耕種的・物理的防除)

- 1 ほ場や畦畔などに散乱する被害部を集めて、湿田の地中に埋める(被害部を地上に放置しない)。
- 2 根腐れや肥料切れを起こさないようにする。
- 3 通風を良くする。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 発生初期に薬剤を散布する。

腐敗病

(耕種的・物理的防除)

- 1 種はすは、無病のものを選ぶ。
- 2 冬期も水を切らさないようにする。収穫後清掃をよくし、茎葉や根の残りをほ場に残さない。

※発病田はなるべく連作を避ける。

※浅い砂質地に多く発生する。

※イネネクイハムシに食害されたレンコンでは、腐敗病を併発することが多いため、[イネネクイハムシの防除](#)を行う。

アブラムシ類

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 気門封鎖剤を散布する。
- 2 発生初期から薬剤を散布する。

イネネクイハムシ

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 薬剤を散布又は植溝土壌混和する。

スクミリングガイ(ジャンボタニシ)

(耕種的・物理的防除)

- 1 取水口に目合い5~10mmの網を設置し、侵入を防止する。
- 2 成貝・卵塊とも地域ぐるみで捕殺する。
- 3 畦畔、用水路の立姿雑草(ヨシなど)は除去する(産卵場所の撤去)。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 石灰窒素を散布後、土壌混和する。
- 2 貝の発生時に、薬剤を散布する。

レンコンネモグリセンチュウ(黒皮線虫病)

(耕種的・物理的防除)

- 1 種はすは、センチュウの寄生していないものを選ぶ。
- 2 センチュウ汚染ほ場からの土の移動を防ぐ。
- 3 連作を避け、休耕又は乾田化し、線虫密度を下げる。
- 4 雑草(ヒエやミズアオイ)でも増殖するので、除草を徹底する。
- 5 根残渣の除去は、線虫密度を下げる。

※早生品種で被害が大きい

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 グランドオンコル粒剤を湛水散布後全面土壌混和する。