

(36) つつじ類

ア 各病害虫の防除

白紋羽病

もち病

褐斑病

カイガラムシ類

コガネムシ類幼虫

ツツジゲンバイ

センチュウ類

ア 各病害虫の防除

【留意事項】

(□は総合防除計画に掲載している病害虫)

白紋羽病

(耕種的・物理的防除)

- 1 [共通防除の章の資材・苗床・本ぼの消毒の項](#)を参照する。

もち病

(耕種的・物理的防除)

- 1 罹病葉を除去する。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 4月中旬頃から5月にかけて数回薬剤を施用(散布)する。

褐斑病

(耕種的・物理的防除)

- 1 落葉は集めて処分する。
- 2 枝が混み合って風通しが悪くならないように、剪定を行う。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 秋から春先にかけて薬剤を施用(散布)する。

カイガラムシ類

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 発生が認められた樹や枝に薬剤を施用(散布)する。

コガネムシ類幼虫

(耕種的・物理的防除)

- 1 有機質肥料に誘引されるため、多用しない。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 薬剤を施用(散布)する。

ツツジゲンバイ

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 年数回の発生を繰り返すので、被害のめだつ5～8月に薬剤を施用(散布)する。
- 2 慢性的に発生している場合は薬剤(粒剤)を施用(株元散布)する。

センチュウ類

(耕種的・物理的防除)

- 1 連作しない。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 薬剤を施用(土壌消毒)する。