

(12) 一年生雑草と多年生雑草防除の草種別処理適期

雑草の草種別処理適期は、公益財団法人日本植物調節剤研究協会の掲載する地域技術指標原案(関東・東海地域、早期栽培)の内容を参考にしている。

	除草剤名	草種別処理適期			
		ノビエ	ホタルイ	ミズガヤツリ	ウリカワ
初期剤	シンウチ1キロ粒剤	1葉まで 但し移植後30日 まで	発生始期まで 但し移植後30日 まで	発生始期まで 但し移植後30日 まで	
	メテオ1キロ粒剤	1葉まで 但し移植後30日 まで	発生前まで 但し移植後30日 まで		発生前まで 但し移植後30日 まで
	クラール1キロ粒剤	1.5葉まで 但し移植後30日 まで	発生始期まで 但し移植後30日 まで	発生始期まで 但し移植後30日 まで	
	ピラクロン1キロ粒剤	1.5葉まで 但し移植後30日 まで	発生始期まで 但し移植後30日 まで		発生始期葉まで 但し移植後30日 まで
一発剤	バッチリLX1キロ粒剤, バッチリLXフロアブル	2.5葉まで 但し移植後30日 まで	2葉まで 但し移植後30日 まで	2葉まで 但し移植後30日 まで	発生始期まで 但し移植後30日 まで
	カチボシ1キロ粒51	2.5葉まで 但し移植後30日 まで	2葉まで 但し移植後30日 まで	2葉まで 但し移植後30日 まで	2葉まで 但し移植後30日 まで
	エンペラー1キロ粒剤	3葉まで 但し移植後30日 まで	3葉まで 但し移植後30日 まで	2葉まで 但し移植後30日 まで	2葉まで 但し移植後30日 まで
	銀河1キロ粒剤	3葉まで 但し移植後30日 まで	3葉まで 但し移植後30日 まで	3葉まで 但し移植後30日 まで	2葉まで 但し移植後30日 まで
	プライオリティ豆つぶ250	3.5葉まで 但し移植後30日 まで	3葉まで 但し移植後30日 まで	15cm以下まで 但し移植後30日 まで	2葉まで 但し移植後30日 まで
	カウンスルエナジー/カウントダウン1キロ粒剤	3.5葉まで 但し移植後30日 まで	4葉まで 但し移植後30日 まで	15cm以下まで 但し移植後30日 まで	2葉まで 但し移植後30日 まで
中・後期剤	アクシズMX1キロ粒剤	4葉まで 但し収穫45日 まで	3葉まで 但し収穫45日 まで	3葉まで 但し収穫45日 まで	3葉まで 但し収穫45日 まで
	ゲパード1キロ粒剤	4葉まで 但し収穫45日 前まで	4葉まで 但し収穫60日 まで	3葉まで 但し収穫60日 まで	3葉まで 但し収穫60日 まで
	レプラス1キロ粒剤	4葉まで 但し収穫60日 まで	4葉まで 但し収穫60日 まで	3葉まで 但し収穫60日 まで	3葉まで 但し収穫60日 まで
	ウィードコア1キロ粒剤	4葉まで 但し収穫30日 前まで	4葉まで 但し収穫60日 前まで	4葉まで 但し収穫60日 前まで	3葉まで 但し収穫60日 前まで
	アトトリ1キロ粒剤	5葉まで 但し収穫30日 前まで		4葉まで 但し収穫45日 前まで	4葉まで 但し収穫45日 前まで
	ワイドアタックSC	5葉まで 但し収穫30日 前まで	花茎抽出始期 まで但し収穫 30日前まで	5葉まで 但し収穫30日 前まで	5葉まで 但し収穫30日 前まで

主要雑草の生育の推移

移植後日数	ノビエ	ホタルイ	ミズガヤツリ	ウリカワ
代かき日				
- 5			発生始	
移植(±0)	発生始	発生始		発生始
+ 5	1.0 葉	1.0 葉	2.0 葉	初生葉 2.0 葉 2.5 葉
+ 10	2.0 葉	3.0 葉	3.5 葉	3.0 葉
+ 15	2.5 葉	4.0 葉	4.5 葉	4.0 葉

(平均的な気象の場合、移植時期は5月上旬)