

## (6) 野菜

- ア アスパラガス
- イ いちご
- ウ えだまめ
- エ かぼちゃ
- オ キャベツ
- カ きゅうり
- キ ごぼう
- ク すいか
- ケ だいこん
- コ たまねぎ
- サ とうもろこし
- シ トマト
- ス ミニトマト
- セ なす
- ソ なばな類
- タ にら
- チ にんじん
- ツ ねぎ
- テ はくさい
- ト ピーマン
- ナ ブロッコリー
- ニ ほうれんそう
- ヌ メロン
- ネ レタス
- ノ 非結球レタス
- ハ れんこん
- ヒ 使用回数の留意点

## ア アスパラガス 農薬登録情報

### (ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草		
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン)	一年生雑草	砂土を除く	
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		
ロロックス (リニュロン)	一年生雑草 一年生広葉雑草		1 イネ科雑草には効果が劣る。

### (イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネート P ナトリウム塩)	一年生雑草 一年生雑草及び多年生広葉雑草		
タッチダウン i Q (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草 スギナ		
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
パスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草 スギナ		
ワンサイドP乳剤 (フルアジホップP)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		

#### 注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## イ いちご 農薬登録情報

### (ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草		

- ・いちご(親床株)、いちご(本圃)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ラッソー乳剤 (アラクロール)	一年生雑草	全土壌	

### (イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
パスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		

- ・いちご(親床株)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ワンサイドP乳剤 (フルアジホップP)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)、シバムギ、レドドトップ		

#### 注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## ウ えだまめ [農薬登録情報](#)

### (ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クリアターン細粒剤F (ベンチオカーブ、ペンディメタリン、リニュロン)	一年生雑草	全土壌(但し、砂土を除く)	
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	砂壤土～埴土	

### (イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クリアターン乳剤 (ベンチオカーブ、ペンディメタリン、リニュロン)	一年生雑草	全土壌(但し、砂土を除く)	
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		1 後作にイネ科作物、うり科作物の栽培を避ける。
パワーガイザー液剤 (イマザモックスアンモニウム塩)	一年生広葉雑草		
フィールドスターP乳剤 (ジメテナミドP)	一年生雑草(アカザ科、アブラナ科、タデ科を除く)		

### (ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
サンダーボルト007 (グリホサートイソプロピルアミン塩、ピラフルフェンエチル)	一年生雑草		
タッチダウンiQ (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
ホーネスト乳剤 (テブラロキシジム)	一年生イネ科雑草		
ポルトフロアブル (キザロホップエチル)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
草枯らし (グリホサートイソプロピルアミン塩)	一年生雑草		

#### 注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## エ かぼちゃ [農薬登録情報](#)

### (ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

かぼちゃ(トンネル・マルチ栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		

### (イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草		

### (ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## オ キャベツ [農薬登録情報](#)

### (ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマートU粒剤 (ブタミホス)	一年生雑草		1 定植の際、薬剤のかかった土が作物の根に触れないよう注意する。 2 キャベツの定植後に使用する場合は、次の注意を守る。 (1) 降雨又は朝露等により葉面が濡れている状態では使用しない。 (2) 極端な深植えでは使用しない。
ゴーゴーサン細粒剤F (ペンディメタリン)	一年生雑草		1 砕土、整地をできるだけ丁寧に行う。 2 覆土は、処理層だけから集めず処理層の下からも集めるようにする。 3 根が露出しないように定植する。
コンボラル (トリフルラリン、ペンディメタリン)	一年生雑草(ツユクサ、キク科を除く)	砂壤土～埴土	

### (イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
アグロマックス水和剤 (プロビザミド)	一年生雑草(キク科、カヤツリグサ科を除く)		
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草		1 定植の際、薬剤のかかった土が作物の根に触れないよう注意する。
クロロIPC (IPC)	一年生雑草		
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン)	一年生雑草	砂土を除く	1 根が露出しないように定植する。
フィールドスターP乳剤 (ジメテナミドP)	一年生雑草(アカザ科・アブラナ科・タデ科を除く)		
ラッソー乳剤 (アラクロール)	一年生雑草	全土壌	

(ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
グリホス液剤 (グリホサートイソプロピルアミン塩)	一年生雑草		
ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩)	一年生雑草		
タッチダウンiQ (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
ポルトフロアブル (キザロホップエチル)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
ワンサイドP乳剤 (フルアジホップP)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
草枯らし (グリホサートイソプロピルアミン塩)	一年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## カ きゅうり [農薬登録情報](#)

(ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマートU粒剤 (ブタミホス)	一年生雑草		

(イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草		

(ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩)	一年生雑草		
タッチダウンiQ (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## キ ごぼう [農薬登録情報](#)

### (ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
アグロマックス水和剤 (プロビザミド)	一年生雑草(キク科、カヤツリグサ科を除く)		1 均一に散布するため、かくはん器付きの散布器を使用する。
クロロIPC (IPC)	一年生雑草		1 低温時に使用量が多い場合は、葉害を生じることがあるので注意する。

### ・ごぼう(露地栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		1 後作にイネ科作物、うり科作物の栽培を避ける。

### (イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
ポルトフロアブル (キザロホップエチル)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		

#### 注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## ク すいか [農薬登録情報](#)

### (ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマートU粒剤 (ブタミホス)	一年生雑草		

### ・すいか(トンネル・マルチ栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		1 後作にイネ科作物、うり科作物の栽培を避ける。

### (イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草		

### ・すいか(トンネル・マルチ栽培)、すいか(露地栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		1 定植7日以上前に散布、マルチングし、定植数日前にマルチフィルムを切開しガス抜きをしてから定植する。 2 定植後、株の回りのマルチを本剤のかかっている土でおさえる。 3 後作にイネ科作物、うり科作物の栽培を避ける。

(ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## ケ だいこん 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ラッソー乳剤 (アラクロール)	一年生雑草	壤土～埴土、砂土を除く	1 発芽直後のきゅうり、ねぎにかからないようにする。

(イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩)	一年生雑草		
サンダーボルト007 (グリホサートイソプロピルアミン塩、ピラフルフェンエチル)	一年生雑草		
タッチダウンiQ (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
ワンサイドP乳剤 (フルアジホップP)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)、シバムギ、レッドトップ		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## コ たまねぎ 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

- ・たまねぎ(本ぼ)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		

(イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ボクサー (プロスルホカルブ)	一年生雑草		
モーティブ乳剤 (ジメテナミドP、ペンディメタリン)	一年生雑草		

・たまねぎ（本畑）

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン)	一年生雑草	砂土を除く	1 たまねぎ（直播栽培）とたまねぎ（移植栽培）の両方で登録あり 2 直播栽培では薬害が生じる恐れがあるため、注意する。
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	砂土を除く	1 後作にイネ科作物、うり科作物の栽培を避ける。 2 発芽後の雑草には効果がない。

サ とうもろこし [農薬登録情報](#)

(ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クリアター細粒剤F (ベンチオカーブ、ペンディメタリン、リニュロン)	一年生雑草	全土壌(但し、砂土を除く)	
ゴーゴーサン細粒剤F (ペンディメタリン)	一年生雑草		
サターンバアロ粒剤 (プロメトリン、ベンチオカーブ)	一年生雑草		

(イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クリアター乳剤 (ベンチオカーブ、ペンディメタリン、リニュロン)	一年生雑草	全土壌 (但し、砂土を除く)	
ゲザガード50 (プロメトリン)	畑地一年生雑草	砂壤土～埴土	1 覆土はやや厚く均一にする。
ゲザノンゴールド (アトラジン、S-メトラクロール)	一年生雑草		
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン)	一年生雑草	砂土を除く	1 マルチ栽培では、薬害を生じるおそれがあるので使用しない。
ボクサー (プロスルホカルブ)	一年生雑草		
フィールドスターP乳剤 (ジメテナミドP)	一年生雑草(アカザ科・アブラナ科・タデ科を除く) 一年生イネ科雑草		
ラッソー乳剤 (アラクロール)	一年生雑草	全土壌	

(ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
バサグラン液剤(ナトリウム塩) (ベンタゾンナトリウム塩)	一年生雑草(イネ科を除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## シ トマト [農薬登録情報](#)

### (ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマートU粒剤 (ブタミホス)	一年生雑草		

### ・トマト(露地栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		

### (イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

### ・トマト(露地栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	砂土を除く	1 後作にイネ科、うり科作物の栽培を避ける。 2 マルチ栽培では、低薬量とし、定植2~3日前にフィルムを開孔する。

### (ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
ワンサイドP乳剤 (フルアジホップP)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)、シバムギ、レドトップ		

#### 注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## ス ミニトマト [農薬登録情報](#)

### (ア) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		

#### 注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## セ なす [農薬登録情報](#)

### (ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草		

### (イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		

#### 注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## ソ なばな類 [農薬登録情報](#)

### (ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

・なばな(移植栽培)、なばな(直播栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		

### (イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

・なばな(移植栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	砂土を除く	1 後作にイネ科作物、うり科作物の栽培を避ける。 2 発芽後の雑草には効果がない。

### (ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
パスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		

#### 注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## タ なら [農薬登録情報](#)

### (ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマートU粒剤 (ブタミホス)	一年生雑草		

### (イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン)	一年生雑草	砂土を除く	
ロロックス (リニュロン)	一年生雑草		1 イネ科雑草には効果が劣る。

### (ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
パスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		

#### 注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## チ にんじん 農薬登録情報

### (ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クリアターン細粒剤F (ベンチオカーブ、 ペンディメタリン、 リニュロン)	一年生雑草	全土壌(但し、砂土を除く)	1 マルチ及びトンネル栽培では使用しない。 2 土の上で見分けにくい色の ため、散布むらに注意する。
クレマートU粒剤 (ブタミホス)	一年生雑草		
ゴーゴーサン細粒剤F (ペンディメタリン)	一年生雑草		1 種子が露出しないように、覆 土は丁寧に行う。 2 トンネル栽培では、使用薬量 を半分に減らす。
コンボラル (トリフルラリン、 ペンディメタリン)	一年生雑草(ツユクサ、キク科 を除く)	砂壤土～埴土	
サターンバアロ粒剤 (プロメトリン、 ベンチオカーブ)	一年生雑草		
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤ ツリグサ科、キク科、アブラナ 科を除く)		1 後作にイネ科作物、うり科作 物の栽培を避ける。
ロロックス粒剤 (リニュロン)	一年生雑草		

### (イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クリアターン乳剤 (ベンチオカーブ、 ペンディメタリン、 リニュロン)	一年生雑草	全土壌(但し、砂土を除く)	1 マルチ及びトンネル栽培で は使用しない。
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草		
ゲザガード50 (プロメトリン)	畑地一年生雑草	砂壤土～埴土	
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン)	一年生雑草	砂土を除く	1 種子が露出しないように、覆 土は丁寧に行う。 2 トンネル栽培では、使用薬量 を半分に減らす。
サターンバアロ乳剤 (プロメトリン、 ベンチオカーブ)	一年生雑草		
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤ ツリグサ科、キク科、アブラナ 科を除く)		1 後作にイネ科作物、うり科作 物の栽培を避ける。
ロロックス (リニュロン)	一年生雑草	砂土を除く	1 降雨の直前・直後は使用しな い。 2 処理後4か月以内は、後作物 の作付けを避ける。 3 イネ科雑草には効果が劣る。

(ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
タッチダウン i Q (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
ホーネスト乳剤 (テブラロキシジム)	一年生イネ科雑草		
ポルトフロアブル (キザロホップエチル)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
ワンサイドP乳剤 (フルアジホップP)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)、シバムギ、レドドトップ		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

ツねぎ **農薬登録情報**

(ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマートU粒剤 (ブタミホス)	一年生雑草		
ゴーゴーサン細粒剤F (ペンディメタリン)	一年生雑草		
コンボラル (トリフルラリン、ペンディメタリン)	一年生雑草(ツユクサ、キク科を除く)	全土壌	
サターンバアロ粒剤 (プロメトリ、ベンチオカープ)	一年生雑草		
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		

(イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草		
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン)	一年生雑草	砂土を除く	
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		

・ねぎ(露地栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ロロックス (リニュロン)	一年生雑草	砂土を除く	1 定植後～土寄せの間に発生する雑草に処理する。 2 イネ科雑草には効果が劣る。

(ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
草枯らし (グリホサートイソプロピルアミン塩)	一年生雑草		
ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩)	一年生雑草		
サンダーボルト007 (グリホサートイソプロピルアミン塩、ピラフルフェンエチル)	一年生雑草		
タッチダウンiQ (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		

・ねぎ(露地栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ロロックス (リニュロン)	一年生広葉雑草	砂土を除く	1 使用方法は、雑草茎葉散布又は全面散布 2 展着剤との混用及び7日以内の近接散布は、薬害を生じることがあるので避ける。

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

テ はくさい [農薬登録情報](#)

(ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
コンボラル (トリフルラリン、ペンディメタリン)	一年生雑草(ツユクサ、キク科を除く)	砂壤土～埴土	

・はくさい(移植栽培)、はくさい(直播栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレフェノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		1 後作にイネ科作物、うり科作物の栽培を避ける。

(イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草		
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン)	一年生雑草	砂土を除く	
ラッソー乳剤 (アラクロール)	一年生雑草	壤土～埴土	

・はくさい（移植栽培）、はくさい（直播栽培）

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	砂土を除く	1 後作にイネ科作物、うり科作物の栽培を避ける。 2 発芽後の雑草には効果がない。 3 直播では無マルチで使用する。

(ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
グリホス液剤 (グリホサートイソプロピルアミン塩)	一年生雑草		野菜類での登録
ザクサ液剤 (グルホシネート P ナトリウム塩)	一年生雑草		
サンダーボルト007 (グリホサートイソプロピルアミン塩、ピラフルフェンエチル)	一年生雑草		野菜類での登録
タッチダウン iQ (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
ボルトフロアブル (キザロホップエチル)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## ト ピーマン 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草		

・ピーマン(露地栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	砂土を除く	1 後作にイネ科、うり科作物の栽培を避ける。 2 マルチでは、低薬量(200ml)とし、定植2~3日前にフィルムを開孔する。

(イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## ナ ブロccoliー 農薬登録情報

### (ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
アグロマックス水和剤 (プロビザミド)	一年生雑草(キク科、カヤツリグサ科を除く)		1 薬害防止のため、展着剤は加用しない。
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草		
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		1 後作にイネ科作物、うり科作物の栽培を避ける。 2 砂土では使用しない。 3 発芽後の雑草には効果がない。
フィールドスターP乳剤 (ジメテナミドP)	一年生雑草(アカザ科、アブラナ科、タデ科を除く)		1 夏季の高温時では薬害が生じる恐れがあるので使用しない。

### (イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
ワンサイドP乳剤 (フルアジホップP)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
ボルトフロアブル (キザロホップエチル)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		

#### 注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## ニ ほうれんそう 農薬登録情報

### (ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
アージラン液剤 (アシュラム)	一年生雑草	砂土を除く	1 雑草発生前～発生始期に散布する。
クロロIPC (IPC)	一年生雑草		
ラッソー乳剤 (アラクロール)	一年生雑草	壤土～埴土	1 発芽直後のきゅうり、ねぎにかからないようにする。

### (イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
タッチダウンiQ (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		

#### 注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## ヌ メロン [農薬登録情報](#)

### (ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマートU粒剤 (ブタミホス)	一年生雑草		

### ・メロン(露地栽培(トンネル・マルチ栽培))

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		

### (イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草		

### ・メロン(露地栽培(トンネル・マルチ栽培))

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	砂土を除く	1 定植7日以上前に散布、マルチングし、定植数日前にマルチフィルムを切開しガス抜きをしてから定植する。 2 定植後、株の回りのマルチを本剤のかかっている土壌でおさえ、キャップは使用しない。 3 後作にイネ科作物、うり科作物の栽培を避ける。

### (ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		

#### 注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## ネ レタス [農薬登録情報](#)

### (ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ゴーゴーサン細粒剤F (ペンディメタリン)	一年生雑草		1 極端な浅植えや深植えに定植したセル成型苗には薬害が生じる恐れがあるので注意する。

### ・レタス(トンネル・マルチ栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		

### (イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草		
クロロIPC (IPC)	一年生雑草		

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン)	一年生雑草	砂土を除く	1 根土をつけて定植する。 2 後作にイネ科作物、うり科作物の栽培を避ける。 3 降雨の直前・直後には使用しない。

・レタス(トンネル・マルチ栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
サターン乳剤 (ベンチオカーブ)	一年生雑草		1 低温期(気温5℃以下)又は砂土では、薬量を減らす。

・レタス(露地栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	砂土を除く	1 後作にイネ科作物、うり科作物の栽培を避ける。 2 発芽後の雑草には効果がない。

・レタス(秋播栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
アグロマックス水和剤 (プロピザミド)	一年生雑草(キク科、カヤツリグサ科を除く)		

## ノ 非結球レタス [農薬登録情報](#)

(ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ゴーゴーサン細粒剤F (ペンディメタリン)	一年生雑草		1 極端な浅植えや深植えに定植したセル成型苗には薬害が生じる恐れがあるので注意する。

・非結球レタス(トンネル・マルチ栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		

(イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン)	一年生雑草	砂土を除く	

・非結球レタス(トンネル・マルチ栽培)、非結球レタス(春播移植栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
サターン乳剤 (ベンチオカーブ)	一年生雑草		1 低温期(気温5℃以下)又は砂土では、薬量を減らす。

・非結球レタス(露地栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	砂土を除く	1 後作にイネ科作物、うり科作物の栽培を避ける。 2 発芽後の雑草には効果がない。

(ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## ハ れんこん [農薬登録情報](#)

### (ア) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
モゲトン粒剤 (ACN)	ウキクサ類		

#### 注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

## ヒ 使用回数の留意点

- ・除草剤は剤ごとに使用基準回数が定められているので注意する。
- ・また、除草剤の成分ごとにも使用基準回数が定められているので、体系処理で複数の除草剤を使用する場合には個々の成分の使用回数が使用基準回数を超えないように注意する。