

(7) 花植木

ア きく

イ グラジオラス

ウ ゆり

エ 花き類・観葉植物

オ 樹木類

カ 使用回数の留意点

ア きく [農薬登録情報](#)

(ア) 土壌処理剤(粒剤)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマートU粒剤 (ブタミホス)	一年生雑草		
ゴーゴーサン細粒剤F (ペンディメタリン)	一年生雑草		

(イ) 土壌処理剤(水和剤・乳剤)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
アグロマックス水和剤 (プロピザミド)	一年生雑草(キク科、カヤツリグサ科を除く)		
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン)	一年生雑草	全土壌	

・きく(ポットマム)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草 アメリカネナシカズラ		

・きく(露地栽培)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		1 品種により葉害を生じるおそれがある。 2 十分に活着してから葉にかからないよう散布する。 3 親株床にも利用可能である。 4 後作に草花類を作付ける場合は、1 か月前までに使用をやめる。

(ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		

イ グラジオラス [農薬登録情報](#)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマート乳剤 (ブタミホス)	一年生雑草		

ウ ゆり [農薬登録情報](#)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		1 萌芽前4～5日までに処理し、萌芽直後の散布は避ける。 2 生育期処理は、芽の長さが4～5cm以上に揃ってから茎葉にかからないよう散布する。

エ 花き類・観葉植物 [農薬登録情報](#)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩)	一年生雑草		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

オ 樹木類 [農薬登録情報](#)

(ア) 土壌処理剤(粒剤)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		

(イ) 土壌処理剤(水和剤・乳剤)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		

(ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩)	一年生雑草		
タッチダウンiQ (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

カ 使用回数の留意点

- ・除草剤は剤ごとに使用基準回数が定められているので注意する。
- ・また、除草剤の成分ごとにも使用基準回数が定められているので、体系処理で複数の除草剤を使用する場合には個々の成分の使用回数が使用基準回数を超えないように注意する。