

(8) 飼料作物

- ア ソルガム
- イ 飼料用とうもろこし
- ウ 牧草(牧野・草地)
- エ 使用回数の留意点

ア ソルガム 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(細粒剤)

| 除草剤名(一般名) | 適用雑草 | 適用土壌 | 備考 |
|--------------------------|-------|-----------|--|
| ゴーゴーサン細粒剤F (ペンディメタリン) | 一年生雑草 | 砂土では使用しない | 1 砕土、整地を均一に行い、重複散布を避ける。 2 土壌が乾燥していると、効果が劣る。 3 種子の覆土深は3 cm 以上とする。 |

(イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

| 除草剤名(一般名) | 適用雑草 | 適用土壌 | 備考 |
|-----------------------------------|-------|------|---|
| ゲザノンゴールド (アトラジン、 S-メトラクロール) | 一年生雑草 | | 1 下記条件下では、出芽抑制及び生育抑制等の薬害を生じるおそれがあるため、使用を避けること。 (1) 過湿土壌及び砂質土壌 (2) 散布直前に降雨があった場合 (3) 散布直後に降雨が予想される場合 (4) 出芽直前の場合 |
| ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン) | 一年生雑草 | | 1 下記条件下では、出芽抑制及び生育抑制等の薬害を生じるおそれがあるため、使用を避けること。 (1) 過湿土壌 (2) 散布直前に降雨があった場合 (3) 散布直後に降雨が予想される場合 (4) 出芽直前の場合 |
| ラッソー乳剤 (アラクロール) | 一年生雑草 | 全土壌 | |
| ロロックス (リニュロン) | 一年生雑草 | | 1 砕土や加湿土壌では使用しない。 2 砂質で水はけのよい畑では薬量をひかえる。 3 イネ科雑草には効果が劣る。 |

(ウ) 茎葉処理剤

| 除草剤名(一般名) | 適用雑草 | 適用土壌 | 備考 |
|----------------------------------|---------------|------|----|
| タッチダウン i Q (グリホサートカリウム塩) | 一年生雑草 | | |
| バサグラン液剤(ナトリウム塩) (ペンタゾンナトリウム塩) | 一年生雑草(イネ科を除く) | | |
| ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩) | 一年生雑草 | | |

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

イ 飼料用とうもろこし 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(細粒剤)

| 除草剤名(一般名) | 適用雑草 | 適用土壌 | 備考 |
|--|-------|---------------|--|
| クリアターン細粒剤F (ベンチオカーブ、 ペンディメタリン、 リニュロン) | 一年生雑草 | 全土壌(但し、砂土を除く) | |
| ゴーゴーサン細粒剤F (ペンディメタリン) | 一年生雑草 | | 1 砕土、整地を均一に行い、重複散布を避ける。 2 土壌が乾燥していると、効果が劣る。 |

(イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

| 除草剤名(一般名) | 適用雑草 | 適用土壌 | 備考 |
|--|--------------------------------------|---------------|--|
| クリアターン乳剤 (ベンチオカーブ、 ペンディメタリン、 リニュロン) | 一年生雑草 | 全土壌(但し、砂土を除く) | |
| ゲザノンゴールド (アトラジン、 S-メトラクロール) | 一年生雑草 | | 1 極端な加湿土壌及び砂質土壌では薬量を減らす。 |
| ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン) | 一年生雑草 | 全土壌 | 1 砕土、整地を均一に行い、重複散布を避ける。 2 土壌が乾燥していると、効果が劣る。 |
| デュアルゴールド (S-メトラクロール) | 一年生雑草 | | 1 一年生広葉雑草に対する効果は一般的に劣り、イネ科雑草に効果が高い。 |
| フィールドスターP乳剤 (ジメテナミドP) | 一年生雑草(アカザ科、アブラナ科、タデ科を除く) 一年生イネ科雑草 | | 1 原液は眼に対して刺激性があるので十分に注意する。 |
| ラッソー乳剤 (アラクロール) | 一年生雑草 | 全土壌 | |
| ロロックス (リニュロン) | 一年生雑草 | | 1 砂質土で保水力のない畑や降雨で冠水しやすい畑では、使用を避ける。 2 覆土はやや厚くし、砂土では薬量を減らす。 |

(ウ) 茎葉処理剤

| 除草剤名(一般名) | 適用雑草 | 適用土壌 | 備考 |
|----------------------------------|----------------------|------|----|
| アルファード液剤 (トブラメゾン) | 一年生雑草 | | |
| シャドー水和剤 (ハロスルフロメチル) | キクイモ 一年生及び多年生広葉雑草 | | |
| タッチダウン i Q (グリホサートカリウム塩) | 一年生雑草 | | |
| バサグラン液剤(ナトリウム塩) (ベンタゾンナトリウム塩) | 一年生雑草(イネ科を除く) | | |
| ブルーシアフロアブル (トルピラレート) | 一年生雑草 | | |
| ベルベカット乳剤 (フルチアセットメチル) | イチビ | | |
| ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩) | 一年生及び多年生雑草 | | |
| ワンホープ乳剤 (ニコスルフロン) | 一年生雑草、多年生イネ科雑草 | | |
| バスタ液剤 (グルホシネート) | 一年生雑草 | | |

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

ウ 牧草(牧野・草地) **農薬登録情報**

| 除草剤名(一般名) | 適用雑草 | 適用土壌 | 備考 |
|---|---------------|------|--|
| アーザラン液剤 (アシュラム) | ギンギン類及びキク科の雑草 | | 1 (茎)葉が十分に濡れるよう均一に散布する。 |
| | ワラビ | | |
| グリホス液剤 (グリホサートイソプロピルアミン塩) | 一年生雑草 | | |
| | 多年生雑草 | | |
| | 一年生及び多年生雑草 | | |
| サンダーボルト007 (グリホサートイソプロピルアミン塩、ピラフルフェンエチル) | 一年生及び多年生雑草 | | |
| タッチダウンiQ (グリホサートカリウム塩) | 一年生雑草 | | |
| | 多年生雑草 | | |
| | 一年生及び多年生雑草 | | |
| | リードカナリーグラス | | |
| ハーモニーDF (チフェンスルフロンメチル) | ギンギン類 | | |
| | 一年生広葉雑草 | | |
| バンペルーD液剤 (MDBA ジメチルアミン) | ギンギン | | 1 マメ科牧草には薬害を生じるので使用を避ける。 2 抽台を始めたギンギンには効果が劣る。 |
| ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩) | 一年生及び多年生雑草 | | |
| | 多年生イネ科雑草 | | |
| | 雑かん木 | | |
| 草枯らし (グリホサートイソプロピルアミン塩) | 一年生雑草 | | |
| | 多年生雑草 | | |
| | 一年生及び多年生雑草 | | |

注意事項

- ・雑草木の茎葉に加圧噴霧処理する。
- ・散布前及び散布後少なくとも7～10日は地上部の刈取りや耕起をしない。
- ・周囲の農作物に飛散しないよう注意する。
- ・散布後短時間で降雨が予想される場合は、散布を避ける。
- ・更新後等に種子から再発生するギンギン等には効果がない。
- ・希釈水は清水を使用する。

エ 使用回数の留意点

- ・除草剤は剤ごとに使用基準回数が定められているので注意する。
- ・また、除草剤の成分ごとにも使用基準回数が定められているので、体系処理で複数の除草剤を使用する場合には個々の成分の使用回数が使用基準回数を超えないように注意する。