

(9) 桑 農薬登録情報

ア 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
カソロン粒剤4.5 (DBN)	一年生雑草 一年生雑草及び多年生広葉雑草(まめ科を除く)		1 連用を避ける。 2 極端な砂質土壌や、新植後3年未満または間作予定の桑園では使用しない。 3 イネ科雑草に効果が劣る 4 薬剤処理後、中耕すると葉害が生じるので土壌混和しない。 5 葉にかかると葉害が生じるので、春期桑の発芽前に使用する。
クレマートU粒剤 (ブタミホス)	一年生雑草		葉にかかると葉害が生じるので、給桑葉のない春季又は夏季収穫後の桑の発芽前に使用する。
ゴーゴーサン細粒剤F (ペンディメタリン)	一年生雑草		
サターンバアロ粒剤 (プロメトリン、 ベンチオカーブ)	一年生雑草		
ロロックス粒剤 (リニュロン)	一年生雑草		1 桑園での使用は蚕に対する給与開始日より10日前までに完了する。 2 桑の葉、特に新梢に薬剤がかからないように散布する。

イ 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
アージラン液剤 (アシュラム)	一年生雑草 キク科、タデ科の多年生雑草 キク科、ヒルガオ科、タデ科の多年生雑草		
カーメックスD (DCMU)	一年生雑草		1 砂土や腐植の少ない土壌、新植桑園では、葉害が出やすいので使用量を厳守する。 2 展着剤を加用すると発生初期の雑草にも効果がある。 3 同一土壌処理剤の連続使用は、なるべく避ける。
ゲザガード50 (プロメトリン)	畑地一年生雑草	砂壤土～埴土	蚕に対して影響があるので、給桑葉にかからないように注意する。
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン)	一年生雑草		桑にはかからないよう散布する。
ラッソー乳剤 (アラクロール)	一年生雑草	全土壌	
ロロックス (リニュロン)	一年生雑草		1 蚕に対して影響があるので、桑葉にはかからないようにする。 2 砂土では使用しない。 3 展着剤を加用すると発生初期の雑草にも効果がある。 4 イネ科雑草に効果がやや劣る。 5 同一土壌処理剤の連続使用は、なるべく避ける。

ウ 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
タッチダウンiQ (グリホサートカリウム塩)	一年生及び多年生雑草		
ナブ乳剤 (セトキシジム)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩)	一年生及び多年生雑草		
ワンサイドP乳剤 (フルアジホップP)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
	シバムギ		
	レッドトップ		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

エ 使用回数の留意点

- ・除草剤は剤ごとに使用基準回数が定められているので注意する。
- ・また、除草剤の成分ごとにも使用基準回数が定められているので、体系処理で複数の除草剤を使用する場合には個々の成分の使用回数が使用基準回数を超えないように注意する。