

## 3. 判定条件の違いによる血清脂質・血糖有所見者の該当者割合の変化

## (1) 血清脂質

## 1) 高脂血症有病者の割合

年齢階級	条件1			条件2			条件3			
	度数	割合	対象者	度数	割合	対象数	度数	割合	対象者	
男	40～44歳	772	58.7	1315	629	47.8	1315	173	13.2	1315
	45～49歳	886	58.0	1528	725	47.4	1528	183	12.0	1528
	50～54歳	1269	59.4	2135	1028	48.1	2135	275	12.9	2135
	55～59歳	1953	58.9	3317	1546	46.6	3317	462	13.9	3317
	60～64歳	2250	55.2	4078	1709	41.9	4078	551	13.5	4078
	65～69歳	2776	53.0	5241	2083	39.7	5241	814	15.5	5241
	70～74歳	1976	49.3	4011	1552	38.7	4011	709	17.7	4011
女	40～44歳	1290	22.6	5702	710	12.5	5702	123	2.2	5702
	45～49歳	1834	29.5	6220	890	14.3	6220	136	2.2	6220
	50～54歳	3601	45.5	7912	1776	22.4	7912	296	3.7	7912
	55～59歳	6122	55.3	11065	3027	27.4	11065	707	6.4	11065
	60～64歳	4863	58.6	8299	2591	31.2	8299	670	8.1	8299
	65～69歳	4138	57.3	7224	2454	34.0	7224	670	9.3	7224
	70～74歳	2945	53.5	5503	1844	33.5	5503	581	10.6	5503

条件1: 有病者: 空腹(または随時)TG150以上、HDL40未満、LDL140以上、服薬・治療ありのいずれかに該当

条件2: 有病者: 空腹(または随時)TG150以上、HDL40未満、服薬・治療ありのいずれかに該当

条件3: 有病者: HDL40未満、服薬・治療ありのいずれかに該当

## 2) 条件1における空腹時採血と随時採血の有病者割合の比較

年齢階級	空腹			随時			合計			
	度数	割合	対象数	度数	割合	対象数	度数	割合	対象数	
男	40～44歳	125	60.1	208	647	58.4	1107	772	58.7	1315
	45～49歳	114	55.9	204	772	58.3	1324	886	58.0	1528
	50～54歳	132	54.1	244	1137	60.1	1891	1269	59.4	2135
	55～59歳	236	55.1	428	1717	59.4	2889	1953	58.9	3317
	60～64歳	361	52.4	689	1889	55.7	3389	2250	55.2	4078
	65～69歳	455	48.0	947	2321	54.1	4294	2776	53.0	5241
	70～74歳	284	47.3	601	1692	49.6	3410	1976	49.3	4011
女	40～44歳	186	20.0	932	1104	23.1	4770	1290	22.6	5702
	45～49歳	241	26.7	901	1593	29.9	5319	1834	29.5	6220
	50～54歳	483	42.3	1143	3118	46.1	6769	3601	45.5	7912
	55～59歳	916	54.7	1676	5206	55.4	9389	6122	55.3	11065
	60～64歳	798	54.4	1466	4065	59.5	6833	4863	58.6	8299
	65～69歳	671	57.8	1160	3467	57.2	6064	4138	57.3	7224
	70～74歳	337	51.4	656	2608	53.8	4847	2945	53.5	5503

## 3) 条件2における空腹時採血と随時採血の有病者割合の比較

年齢階級	空腹			随時			合計			
	度数	割合	対象数	度数	割合	対象数	度数	割合	対象数	
男	40～44歳	88	42.3	208	541	48.9	1107	629	47.8	1315
	45～49歳	81	39.7	204	644	48.6	1324	725	47.4	1528
	50～54歳	92	37.7	244	936	49.5	1891	1028	48.1	2135
	55～59歳	157	36.7	428	1389	48.1	2889	1546	46.6	3317
	60～64歳	208	30.2	689	1501	44.3	3389	1709	41.9	4078
	65～69歳	235	24.8	947	1848	43.0	4294	2083	39.7	5241
	70～74歳	175	29.1	601	1377	40.4	3410	1552	38.7	4011
女	40～44歳	71	7.6	932	639	13.4	4770	710	12.5	5702
	45～49歳	75	8.3	901	815	15.3	5319	890	14.3	6220
	50～54歳	132	11.5	1143	1644	24.3	6769	1776	22.4	7912
	55～59歳	260	15.5	1676	2767	29.5	9389	3027	27.4	11065
	60～64歳	241	16.4	1466	2350	34.4	6833	2591	31.2	8299
	65～69歳	244	21.0	1160	2210	36.4	6064	2454	34.0	7224
	70～74歳	137	20.9	656	1707	35.2	4847	1844	33.5	5503

## 4)条件3における空腹時採血と随時採血の有病者割合の比較

		空腹			随時			合計		
		度数	割合	対象数	度数	割合	対象数	度数	割合	対象数
男	40～44歳	21	10.1	208	140	12.6	1107	629	47.8	1315
	45～49歳	17	8.3	204	144	10.9	1324	725	47.4	1528
	50～54歳	17	7.0	244	214	11.3	1891	1028	48.1	2135
	55～59歳	25	5.8	428	355	12.3	2889	1546	46.6	3317
	60～64歳	34	4.9	689	422	12.5	3389	1709	41.9	4078
	65～69歳	55	5.8	947	599	13.9	4294	2083	39.7	5241
	70～74歳	63	10.5	601	544	16.0	3410	1552	38.7	4011
女	40～44歳	7	0.8	932	84	1.8	4770	710	12.5	5702
	45～49歳	5	0.6	901	82	1.5	5319	890	14.3	6220
	50～54歳	7	0.6	1143	122	1.8	6769	1776	22.4	7912
	55～59歳	23	1.4	1676	228	2.4	9389	3027	27.4	11065
	60～64歳	21	1.4	1466	245	3.6	6833	2591	31.2	8299
	65～69歳	23	2.0	1160	268	4.4	6064	2454	34.0	7224
	70～74歳	17	2.6	656	243	5.0	4847	1844	33.5	5503

## (2)血糖

## 1)空腹時血糖、随時血糖の判定条件の違いによる有病者割合の比較

		空腹時血糖 100mg/dl 以上			空腹時血糖 110mg/dl 以上			随時血糖 140mg/dl 以上		
		度数	割合	対象数	度数	割合	対象数	度数	割合	対象数
男	40～44歳	38	18.3	208	14	6.7	208	34	3.3	1042
	45～49歳	42	20.6	204	22	10.8	204	63	5.1	1234
	50～54歳	62	25.5	243	35	14.4	243	143	8.2	1747
	55～59歳	128	30.0	426	71	16.7	426	272	10.3	2650
	60～64歳	212	30.9	687	92	13.4	687	317	10.6	2992
	65～69歳	286	30.4	941	147	15.6	941	459	12.2	3753
	70～74歳	213	35.7	597	123	20.6	597	409	13.3	3067
女	40～44歳	57	6.1	930	18	1.9	930	75	1.7	4512
	45～49歳	72	8.0	900	16	1.8	900	90	1.8	4940
	50～54歳	110	9.6	1140	33	2.9	1140	198	3.1	6290
	55～59歳	253	15.1	1672	92	5.5	1672	323	3.8	8552
	60～64歳	248	16.9	1465	110	7.5	1465	314	5.2	6072
	65～69歳	267	23.2	1153	112	9.7	1153	334	6.3	5326
	70～74歳	181	27.7	653	73	11.2	653	312	7.1	4402

## 2)HbA1cの判定条件の違いによる有病者割合の比較

		HbA1c5.2%以上			HbA1c5.5%以上		
		度数	割合	対象数	度数	割合	対象数
男	40～44歳	22	45.8	48	7	14.6	48
	45～49歳	31	47.7	65	10	15.4	65
	50～54歳	48	51.1	94	24	25.5	94
	55～59歳	81	57.4	141	43	30.5	141
	60～64歳	150	67.9	221	78	35.3	221
	65～69歳	183	60.2	304	106	34.9	304
	70～74歳	130	68.4	190	69	36.3	190
女	40～44歳	37	22.7	163	15	9.2	163
	45～49歳	105	46.3	227	35	15.4	227
	50～54歳	179	52.0	344	64	18.6	344
	55～59歳	280	61.9	452	118	26.1	452
	60～64歳	291	64.1	454	124	27.3	454
	65～69歳	291	68.8	423	133	31.4	423
	70～74歳	161	63.4	254	77	30.3	254

資料（統計表）

3)同一人における血糖値別、HbA1c 判定区分該当状況

		HbA1c5.2%以上			HbA1c5.5%以上			
		度数	割合	対象数	度数	割合	対象数	
男	空腹時血糖	100mg/dl 未満	550	48.8	1127	206	18.3	1127
		100～110mg/dl 未満	194	77.6	250	126	50.4	250
		110～126mg/dl 未満	252	92.0	274	199	72.6	274
		126mg/dl 以上	218	97.8	223	204	91.5	223
	随時血糖	140mg/dl 未満	2179	65.3	3337	1197	35.9	3337
		140～180mg/dl 未満	811	78.7	1031	585	56.7	1031
		180mg/dl 以上	550	92.7	593	501	84.5	593
女	空腹時血糖	100mg/dl 未満	1775	53.4	3325	666	20.0	3325
		100～110mg/dl 未満	319	85.8	372	207	55.6	372
		110～126mg/dl 未満	260	89.7	290	213	73.4	290
		126mg/dl 以上	157	98.7	159	148	93.1	159
	随時血糖	140mg/dl 未満	4615	64.2	7187	2317	32.2	7187
		140～180mg/dl 未満	964	79.6	1211	641	52.9	1211
		180mg/dl 以上	317	91.4	347	267	76.9	347

#### 4.平成14年度から平成18年度のBMIの変化

14年の年齢判定	男(人数)				女(人数)				男(%)				女(%)				
	やせた	変わらない	太った	合計	やせた	変わらない	太った	合計	やせた	変わらない	太った	合計	やせた	変わらない	太った	合計	
40歳未満	やせ(18.5未満)	0	3	2	5	0	49	26	75	0.0	60.0	40.0	100.0	0.0	65.3	34.7	100.0
	標準	1	44	4	49	18	299	7	324	2.0	89.8	8.2	100.0	5.6	92.3	2.2	100.0
	肥満(25以上)	3	23	0	26	4	27	0	31	11.5	88.5	0.0	100.0	12.9	87.1	0.0	100.0
40～44歳	やせ(18.5未満)	0	5	3	8	0	88	42	130	0.0	62.5	37.5	100.0	0.0	67.7	32.3	100.0
	標準	1	181	26	208	35	1,045	65	1,145	0.5	87.0	12.5	100.0	3.1	91.3	5.7	100.0
	肥満(25以上)	17	86	0	103	35	196	0	231	16.5	83.5	0.0	100.0	15.2	84.8	0.0	100.0
45～49歳	やせ(18.5未満)	0	6	4	10	0	92	43	135	0.0	60.0	40.0	100.0	0.0	68.1	31.9	100.0
	標準	2	315	27	344	50	1,335	79	1,464	0.6	91.6	7.8	100.0	3.4	91.2	5.4	100.0
	肥満(25以上)	30	144	0	174	60	240	0	300	17.2	82.8	0.0	100.0	20.0	80.0	0.0	100.0
50～54歳	やせ(18.5未満)	0	15	3	18	0	124	46	170	0.0	83.3	16.7	100.0	0.0	72.9	27.1	100.0
	標準	7	498	41	546	74	1,969	109	2,152	1.3	91.2	7.5	100.0	3.4	91.5	5.1	100.0
	肥満(25以上)	43	221	0	264	116	438	0	554	16.3	83.7	0.0	100.0	20.9	79.1	0.0	100.0
55～59歳	やせ(18.5未満)	0	14	3	17	0	136	31	167	0.0	82.4	17.6	100.0	0.0	81.4	18.6	100.0
	標準	9	490	37	536	55	1,825	97	1,977	1.7	91.4	6.9	100.0	2.8	92.3	4.9	100.0
	肥満(25以上)	47	197	0	244	118	456	0	574	19.3	80.7	0.0	100.0	20.6	79.4	0.0	100.0
60～64歳	やせ(18.5未満)	0	21	13	34	0	104	33	137	0.0	61.8	38.2	100.0	0.0	75.9	24.1	100.0
	標準	15	824	58	897	58	1,712	110	1,880	1.7	91.9	6.5	100.0	3.1	91.1	5.9	100.0
	肥満(25以上)	79	304	0	383	120	555	0	675	20.6	79.4	0.0	100.0	17.8	82.2	0.0	100.0
65～69歳	やせ(18.5未満)	0	42	14	56	0	108	26	134	0.0	75.0	25.0	100.0	0.0	80.6	19.4	100.0
	標準	18	907	76	1,001	64	1,466	100	1,630	1.8	90.6	7.6	100.0	3.9	89.9	6.1	100.0
	肥満(25以上)	103	346	0	449	113	465	0	578	22.9	77.1	0.0	100.0	19.6	80.4	0.0	100.0
70～74歳	やせ(18.5未満)	0	67	9	76	0	57	18	75	0.0	88.2	11.8	100.0	0.0	76.0	24.0	100.0
	標準	17	705	51	773	45	927	55	1,027	2.2	91.2	6.6	100.0	4.4	90.3	5.4	100.0
	肥満(25以上)	50	231	0	281	101	307	0	408	17.8	82.2	0.0	100.0	24.8	75.2	0.0	100.0
75～79歳	やせ(18.5未満)	0	29	6	35	0	37	15	52	0.0	82.9	17.1	100.0	0.0	71.2	28.8	100.0
	標準	16	336	18	370	27	389	19	435	4.3	90.8	4.9	100.0	6.2	89.4	4.4	100.0
	肥満(25以上)	25	83	0	108	34	124	0	158	23.1	76.9	0.0	100.0	21.5	78.5	0.0	100.0
80歳以上	やせ(18.5未満)	0	11	6	17	0	13	5	18	0.0	64.7	35.3	100.0	0.0	72.2	27.8	100.0
	標準	12	122	1	135	9	94	3	106	8.9	90.4	0.7	100.0	8.5	88.7	2.8	100.0
	肥満(25以上)	10	17	0	27	13	19	0	32	37.0	63.0	0.0	100.0	40.6	59.4	0.0	100.0

本表の各数値は下記の例による(平成14年の判定が『標準』だった人の例)  
 平成14年は『標準』の判定が平成18年に『やせ』に変化した人 『やせた』  
 平成14年は『標準』で平成18年も『標準』だった人 『変わらない』  
 平成14年に『標準』から平成18年に『肥満』に変化した人 『太った』

資料（統計表）

5 . 血圧・血糖・血清脂質別、平成 14 年度「異常認めず」の平成 18 年度「要指導・要医療」への移行

	男									女								
	血圧			脂質			血糖			血圧			脂質			血糖		
	該当数	%	対象数	該当数	%	対象数	該当数	%	対象数	該当数	%	対象数	該当数	%	対象数	該当数	%	対象数
40 歳未満	13	20.6	63	24	60	40	1	2.5	40	44	7.9	555	100	26.7	374	1	0.7	149
40～44 歳	72	27.4	263	55	45.8	120	19	4.8	400	243	14.8	1645	360	35.6	1011	38	2	1879
45～49 歳	102	25.3	403	78	40.2	194	39	6.3	622	359	19.9	1800	417	38.5	1082	67	3	2266
50～54 歳	172	32.3	533	131	44	298	61	6.7	913	528	23.1	2288	648	45.8	1415	128	4	3191
55～59 歳	154	36.6	421	126	45	280	60	7.4	810	528	27.7	1905	473	44.1	1073	125	4.2	2947
60～64 歳	245	37.2	659	223	44.7	499	121	9.2	1317	541	32.8	1649	385	42.3	910	145	5.4	2689
65～69 歳	287	43	667	210	37.6	558	157	10.9	1438	493	40.3	1223	338	37.8	895	135	5.6	2426
70～74 歳	188	41.3	455	178	36	495	102	9.4	1086	299	43.5	687	227	34.8	653	95	5.8	1639
75～79 歳	87	40.1	217	100	36.4	275	65	12	542	129	49.2	262	112	32.4	346	60	7.8	765
80 歳以上	34	51.5	66	32	31.4	102	31	15.3	203	34	50	68	30	34.9	86	15	7.1	210

6. 体重変化量別、平成14年度「異常認めず」から平成18年度「要指導・要医療」への移行

14年の年齢	男									女									
	平成14年度から平成18年度の体重変化									平成14年度から平成18年度の体重変化									
	2.7kgを超えて減少			-2.7kg～+3.3kg			3.3kgを超えて増加			2.7kgを超えて減少			-2.7kg～+3.3kg			3.3kgを超えて増加			
	人数	%	対象数	人数	%	対象数	人数	%	対象数	人数	%	対象数	人数	%	対象数	人数	%	対象数	
血圧	40歳未満	2	28.6	7	7	17.9	39	4	23.5	17	1	2.2	45	23	5.6	411	20	21.3	94
	40～44歳	3	18.8	16	47	25.1	187	21	38.2	55	21	20.0	105	156	13.1	1195	65	19.8	329
	45～49歳	10	25.6	39	60	21.4	280	28	39.4	71	25	16.3	153	247	18.8	1314	80	26.1	306
	50～54歳	11	21.6	51	115	29.8	386	44	48.4	91	61	23.1	264	365	21.1	1732	93	35.0	266
	55～59歳	18	32.7	55	103	33.9	304	30	52.6	57	31	18.1	171	423	27.8	1524	68	35.8	190
	60～64歳	23	26.4	87	164	35.7	460	54	51.4	105	45	24.7	182	411	32.5	1264	80	42.6	188
	65～69歳	22	30.1	73	213	43.4	491	48	50.0	96	55	35.0	157	371	39.9	929	64	48.9	131
	70～74歳	14	21.9	64	137	42.0	326	37	58.7	63	53	45.7	116	216	41.5	520	27	58.7	46
	75～79歳	14	29.8	47	66	43.4	152	6	35.3	17	32	47.8	67	84	48.8	172	12	57.1	21
80歳以上	7	38.9	18	21	55.3	38	5	55.6	9	8	44.4	18	24	51.1	47	2	66.7	3	
血清脂質	40歳未満	1	50.0	2	17	68.0	25	6	46.2	13	5	19.2	26	73	26.1	280	20	31.3	64
	40～44歳	5	41.7	12	36	46.2	78	14	48.3	29	20	35.1	57	246	32.8	750	86	45.0	191
	45～49歳	7	33.3	21	51	38.9	131	16	47.1	34	28	27.7	101	292	37.0	790	90	51.4	175
	50～54歳	5	18.5	27	99	43.8	226	26	60.5	43	59	37.8	156	463	44.0	1052	119	62.3	191
	55～59歳	8	34.8	23	87	41.4	210	30	66.7	45	32	29.9	107	362	43.7	828	74	57.8	128
	60～64歳	16	30.8	52	170	45.3	375	36	55.4	65	32	28.3	113	308	43.4	709	41	51.3	80
	65～69歳	22	36.7	60	145	35.6	407	40	46.5	86	25	22.9	109	262	37.0	708	45	64.3	70
	70～74歳	20	31.3	64	127	34.3	370	28	49.1	57	34	30.9	110	167	34.1	490	24	50.0	48
	75～79歳	21	38.9	54	67	34.5	194	11	42.3	26	27	34.2	79	74	30.8	240	10	41.7	24
80歳以上	10	37.0	27	18	27.3	66	4	50.0	8	5	38.5	13	20	30.8	65	5	62.5	8	
血糖	40歳未満	0	0.0	6	0	0.0	21	1	7.7	13	0	0.0	9	1	1.0	102	0	0.0	36
	40～44歳	3	7.7	39	10	3.6	275	5	6.3	79	1	0.8	132	25	1.8	1367	12	3.3	364
	45～49歳	4	6.1	66	26	5.9	440	7	6.9	102	11	4.6	238	45	2.7	1657	11	3.2	344
	50～54歳	4	3.9	102	43	6.5	665	14	10.3	136	21	5.0	420	79	3.3	2403	24	7.1	338
	55～59歳	5	5.0	100	43	7.3	588	11	9.7	113	12	3.8	316	98	4.2	2321	13	4.6	283
	60～64歳	16	8.6	187	91	9.4	971	13	9.0	145	14	4.3	322	111	5.3	2102	19	7.8	244
	65～69歳	18	9.2	195	116	11.3	1023	23	11.2	206	12	3.7	328	112	6.0	1873	11	5.3	207
	70～74歳	15	9.3	162	73	9.1	804	13	11.8	110	18	5.9	303	69	5.6	1223	8	7.5	107
	75～79歳	16	13.4	119	41	11.0	374	7	15.2	46	17	9.4	180	39	7.4	530	3	6.3	48
80歳以上	12	21.1	57	16	12.3	130	3	21.4	14	2	3.8	52	11	7.7	143	2	13.3	15	

対象数は、各体重変化群のうち平成14年度に「異常認めず」であった人数

資料（統計表）

7. 性別にみた同一人の血圧、脂質、血糖の要指導・要医療項目数の変化  
(男)

H14 年齢	H14 リスク数	H18 における血圧・脂質・血糖リスク数の変化											
		減少 度数	%	同じ 度数	%	1個増 度数	%	2個増 度数	%	3個増 度数	%	合計	%
40 歳未満	0 個			4	28.6	10	71.4	0	0.0	0	0.0	14	100
	1 個	1	5.9	11	64.7	5	29.4	0	0.0			17	100
	2 個	6	60.0	4	40.0	0	0.0					10	100
	3 個	0		0								0	
40～44 歳	0 個			31	41.3	34	45.3	10	13.3	0	0.0	75	100
	1 個	29	14.5	111	55.5	57	28.5	3	1.5			200	100
	2 個	60	41.7	77	53.5	7	4.9					144	100
	3 個	13	81.3	3	18.8							16	100
45～49 歳	0 個			53	47.3	43	38.4	16	14.3	0	0.0	112	100
	1 個	40	13.0	186	60.6	74	24.1	7	2.3			307	100
	2 個	91	39.2	122	52.6	19	8.2					232	100
	3 個	16	61.5	10	38.5							26	100
50～54 歳	0 個			68	44.7	54	35.5	30	19.7	0	0.0	152	100
	1 個	43	10.2	239	56.8	125	29.7	14	3.3			421	100
	2 個	132	32.9	233	58.1	36	9.0					401	100
	3 個	46	70.8	19	29.2							65	100
55～59 歳	0 個			47	39.5	48	40.3	23	19.3	1	0.8	119	100
	1 個	48	13.4	181	50.4	122	34.0	8	2.2			359	100
	2 個	162	39.5	211	51.5	37	9.0					410	100
	3 個	57	67.9	27	32.1							84	100
60～64 歳	0 個			64	36.0	73	41.0	38	21.3	3	1.7	178	100
	1 個	68	11.3	311	51.5	200	33.1	25	4.1			604	100
	2 個	217	32.6	393	59.1	55	8.3					665	100
	3 個	90	68.7	41	31.3							131	100
65～69 歳	0 個			70	38.7	71	39.2	36	19.9	4	2.2	181	100
	1 個	97	15.1	292	45.3	232	36.0	23	3.6			644	100
	2 個	272	36.0	409	54.1	75	9.9					756	100
	3 個	106	64.6	58	35.4							164	100

資料（統計表）

H14 年齢	H14 リスク数	H18 における血圧・脂質・血糖リスク数の変化											
		減少 度数	%	同じ 度数	%	1個増 度数	%	2個増 度数	%	3個増 度数	%	合計	%
70～74 歳	0 個			48	36.1	61	45.9	21	15.8	3	2.3	133	100
	1 個	77	15.3	251	50.0	155	30.9	19	3.8			502	100
	2 個	223	38.6	303	52.5	51	8.8					577	100
	3 個	74	67.9	35	32.1							109	100
75～79 歳	0 個			36	39.6	37	40.7	15	16.5	3	3.3	91	100
	1 個	31	13.1	121	51.1	81	34.2	4	1.7			237	100
	2 個	104	39.2	139	52.5	22	8.3					265	100
	3 個	43	74.1	15	25.9							58	100
80 歳以上	0 個			5	25.0	9	45.0	6	30.0	0	0.0	20	100
	1 個	16	16.3	49	50.0	25	25.5	8	8.2			98	100
	2 個	43	40.6	56	52.8	7	6.6					106	100
	3 個	8	72.7	3	27.3							11	100

(女)

H14 年齢	H14 リスク数	H18 における血圧・脂質・血糖リスク数の変化											
		減少 度数	%	同じ 度数	%	1個増 度数	%	2個増 度数	%	3個増 度数	%	合計	%
40 歳未満	0 個			63	70.0	25	27.8	2	2.2	0	0.0	90	100
	1 個	15	30.0	32	64.0	3	6.0	0	0.0			50	100
	2 個	5	50.0	5	50.0	0	0.0					10	100
	3 個	0		0								0	
40～44 歳	0 個			444	55.6	299	37.5	53	6.6	2	0.3	798	100
	1 個	200	21.9	569	62.4	140	15.4	3	0.3			912	100
	2 個	93	44.9	106	51.2	8	3.9					207	100
	3 個	8	80.0	2	20.0							10	100
45～49 歳	0 個			370	49.7	326	43.8	46	6.2	2	0.3	744	100
	1 個	215	18.6	690	59.8	240	20.8	9	0.8			1154	100
	2 個	188	44.1	223	52.3	15	3.5					426	100
	3 個	18	72.0	7	28.0							25	100

資料（統計表）

H14 年齢	H14 リスク数	H18 における血圧・脂質・血糖リスク数の変化											
		減少 度数	%	同じ 度数	%	1個増 度数	%	2個増 度数	%	3個増 度数	%	合計	%
50～54 歳	0 個			376	44.4	376	44.4	90	10.6	4	0.5	846	100
	1 個	231	14.1	985	60.2	397	24.3	24	1.5			1637	100
	2 個	322	38.9	464	56.1	41	5.0					827	100
	3 個	40	72.7	15	27.3							55	100
55～59 歳	0 個			249	44.0	241	42.6	73	12.9	3	0.5	566	100
	1 個	180	12.0	886	59.3	401	26.8	27	1.8			1494	100
	2 個	418	40.6	568	55.1	44	4.3					1030	100
	3 個	50	68.5	23	31.5							73	100
60～64 歳	0 個			193	45.1	178	41.6	55	12.9	2	0.5	428	100
	1 個	158	11.9	723	54.6	418	31.6	24	1.8			1323	100
	2 個	431	38.4	629	56.1	61	5.4					1121	100
	3 個	81	65.3	43	34.7							124	100
65～69 歳	0 個			138	39.1	156	44.2	54	15.3	5	1.4	353	100
	1 個	166	14.3	572	49.4	393	34.0	26	2.2			1157	100
	2 個	421	39.5	599	56.1	47	4.4					1067	100
	3 個	103	71.0	42	29.0							145	100
70～74 歳	0 個			76	36.5	99	47.6	32	15.4	1	0.5	208	100
	1 個	131	17.7	369	49.8	221	29.8	20	2.7			741	100
	2 個	315	39.5	442	55.5	40	5.0					797	100
	3 個	79	70.5	33	29.5							112	100
75～79 歳	0 個			32	31.4	53	52.0	16	15.7	1	1.0	102	100
	1 個	43	12.6	183	53.5	108	31.6	8	2.3			342	100
	2 個	143	39.2	203	55.6	19	5.2					365	100
	3 個	32	69.6	14	30.4							46	100
80 歳以上	0 個			6	25.0	11	45.8	7	29.2	0	0.0	24	100
	1 個	8	9.0	49	55.1	30	33.7	2	2.2			89	100
	2 個	45	42.1	54	50.5	8	7.5					107	100
	3 個	9	81.8	2	18.2							11	100

資料（統計表）

### 8. 特定健診の判定区分に基づく平成18年度有所見の状況

年齢階級	受診者数 数(A)	摂取エネルギーの過剰								血管を傷つける								メタボ以外動脈硬化要因				
		BMI 25 kg/m <sup>2</sup> 以上		中性脂肪 150mg/dl以上		ALT(GPT) 3 IU/l以上		HDLコレステロール 40mg/dl未満		血糖 空腹 100mg/dlor 随時 140mg/dl 以上			HbA1c(実施者) 5.2%以上			収縮期血圧 130mmHg以上		拡張期血圧 85mmHg以上		LDLコレステロール 120mg/dl以上		
		数	割合(/A)	数	割合(/A)	数	割合(/A)	数	割合(/A)	数	割合(/B)	測定数(B)	数	割合(/B)	測定数(B)	数	割合(/A)	数	割合(/A)	数	割合(/A)	
男																						
40歳未満	676	196	29.0	208	30.8	216	32.0	51	7.5	26	3.9	675	26	55.3	47	7	195	28.8	83	12.3	189	28.0
40～49歳	2846	996	35.0	1293	45.4	936	32.9	322	11.3	198	7.3	2712	474	54.5	869	115	1062	37.3	754	26.5	1175	41.3
50～59歳	5460	1729	31.7	2369	43.4	1298	23.8	611	11.2	658	12.8	5153	1391	67.4	2064	370	2850	52.2	1972	36.1	2425	44.4
60～64歳	4084	1175	28.8	1527	37.4	768	18.8	456	11.2	589	15.5	3811	1234	72.3	1707	354	2342	57.3	1402	34.3	1847	45.2
65～69歳	5248	1504	28.7	1770	33.7	806	15.4	654	12.5	839	17.3	4845	1496	71.5	2093	445	3275	62.4	1612	30.7	2261	43.1
70～74歳	4021	1125	28.0	1267	31.5	570	14.2	607	15.1	681	18.1	3762	1160	76.0	1526	341	2633	65.5	1017	25.3	1595	39.7
75歳以上	4078	848	20.8	1005	24.6	360	8.8	525	12.9	708	18.4	3840	1059	76.7	1381	302	2754	67.5	840	20.6	1408	34.5
(再掲)																						
40～64歳	12390	3900	31.5	5189	41.9	3002	24.2	1389	11.2	1445	12.4	11676	3099	66.8	4640	839	6254	50.5	4128	33.3	5447	44.0
65～74歳	9269	2629	28.4	3037	32.8	1376	14.8	1261	13.6	1520	17.7	8607	2656	73.4	3619	786	5908	63.7	2629	28.4	3856	41.6
女																						
40歳未満	4841	509	10.5	307	6.3	195	4.0	57	1.2	49	1.1	4367	85	40.3	211	8	408	8.4	228	4.7	958	19.8
40～49歳	11926	1942	16.3	1485	12.5	578	4.8	178	1.5	304	2.7	11374	1361	44.4	3064	144	2618	22.0	1367	11.5	4283	35.9
50～59歳	18992	3694	19.5	4282	22.5	1708	9.0	380	2.0	937	5.2	17871	3853	66.3	5809	534	7488	39.4	3873	20.4	11721	61.7
60～64歳	8305	1852	22.3	2269	27.3	716	8.6	266	3.2	615	8.0	7669	2063	70.6	2923	319	3981	47.9	1623	19.5	5379	64.8
65～69歳	7226	1841	25.5	2151	29.8	575	8.0	291	4.0	676	10.2	6613	1670	75.1	2224	320	4115	56.9	1550	21.5	4456	61.7
70～74歳	5492	1503	27.4	1557	28.4	388	7.1	260	4.7	568	11.0	5154	1206	75.7	1593	286	3489	63.5	1181	21.5	3161	57.6
75歳以上	4970	1192	24.0	1230	24.7	238	4.8	262	5.3	571	11.8	4825	1002	77.1	1299	289	3518	70.8	898	18.1	2710	54.5
(再掲)																						
40～64歳	39223	7488	19.1	8036	20.5	3002	7.7	824	2.1	1856	5.0	36914	7277	61.7	11796	997	14087	35.9	6863	17.5	21383	54.5
65～74歳	12718	3344	26.3	3708	29.2	963	7.6	551	4.3	1244	10.6	11767	2876	75.3	3817	606	7604	59.8	2731	21.5	7617	59.9

## 9. 特定健診の判定区分に基づく有所見の状況の年次推移

年度	受診者数 数(A)	摂取エネルギーの過剰								血管を傷つける								メタボ以外動脈硬化要因					
		BMI 25 kg/m <sup>2</sup> 以上		中性脂肪 150mg/dl 以上		ALT(GPT) 3 IU/l 以上		HDLコレステロール 40mg/dl 未満		血糖 空腹 100mg/dlor 随 時 140mg/dl 以上			HbA1c(実施者) 5.2%以上 6.1% 以上			収縮期血圧 130mmHg 以上		拡張期血圧 85mmHg 以上		LDLコレステロール 120mg/dl 以上			
		数	割合 (/A)	数	割合 (/A)	数	割合 (/A)	数	割合 (/A)	数	割合 (/B)	測定 数(B)	数	割合 (/B)	測定 数(B)	数	割合 (/A)	数	割合 (/A)	数	割合 (/A)		
<b>40 歳代</b>																							
男	18年	2846	996	35.0	1293	45.4	936	32.9	322	11.3	198	7.3	2712	474	54.5	869	115	1062	37.3	754	26.5	1175	41.3
	17年	3021	1069	35.4	1439	47.6	1001	33.1	369	12.2	266	9.3	2845	507	49.9	1016	96	1206	39.9	851	28.2	1209	40.0
	16年	2581	900	34.9	1206	46.7	871	33.7	329	12.7	209	8.7	2408	368	45.2	815	93	957	37.1	654	25.3	1090	42.2
	15年	2004	711	35.5	951	47.5	694	34.6	220	11.0	167	9.4	1783	356	58.5	609	83	789	39.4	515	25.7	782	39.0
	14年	2043	707	34.6	1020	49.9	701	34.3	287	14.0	188	10.3	1827	306	50.7	603	73	786	38.5	530	25.9	757	37.1
女	18年	11926	1942	16.3	1485	12.5	578	4.8	178	1.5	304	2.7	11374	1361	44.4	3064	144	2618	22.0	1367	11.5	4283	35.9
	17年	12390	2067	16.7	1648	13.3	642	5.2	207	1.7	383	3.3	11675	1144	33.4	3421	115	2790	22.5	1412	11.4	4269	34.5
	16年	11143	1942	17.4	1454	13.0	541	4.9	209	1.9	364	3.5	10459	920	33.2	2771	123	2343	21.0	1116	10.0	4024	36.1
	15年	7370	1335	18.1	984	13.4	349	4.7	120	1.6	238	3.6	6532	727	44.8	1621	84	1703	23.1	867	11.8	2478	33.6
	14年	7552	1317	17.4	1114	14.8	372	4.9	178	2.4	248	3.7	6713	542	35.3	1537	81	1732	22.9	872	11.5	2642	35.0
<b>50 歳代</b>																							
男	18年	5460	1729	31.7	2369	43.4	1298	23.8	611	11.2	658	12.8	5153	1391	67.4	2064	370	2850	52.2	1972	36.1	2425	44.4
	17年	5616	1849	32.9	2461	43.8	1459	26.0	659	11.7	775	15.0	5168	1466	64.0	2291	422	2960	52.7	1934	34.4	2472	44.0
	16年	4677	1522	32.5	1991	42.6	1194	25.5	618	13.2	666	15.9	4187	1167	61.6	1894	356	2355	50.4	1561	33.4	2045	43.7
	15年	3543	1192	33.6	1551	43.8	923	26.1	393	11.1	455	14.9	3063	976	70.9	1376	277	1852	52.3	1258	35.5	1951	55.1
	14年	3471	1175	33.9	1667	48.0	921	26.5	452	13.0	474	15.8	3005	880	65.1	1351	254	1760	50.7	1190	34.3	1386	39.9
女	18年	18992	3694	19.5	4282	22.5	1708	9.0	380	2.0	937	5.2	17871	3853	66.3	5809	534	7488	39.4	3724	19.6	11721	61.7
	17年	19646	3985	20.3	4687	23.9	1962	10.0	443	2.3	1155	6.4	18040	3573	56.2	6355	546	7928	40.4	3797	19.3	12106	61.6
	16年	17095	3458	20.2	3884	22.7	1644	9.6	412	2.4	1037	6.7	15392	2787	55.8	4995	463	6476	37.9	2908	17.0	10483	61.3
	15年	10857	2463	22.7	2750	25.3	1077	9.9	266	2.5	565	6.2	9127	2103	70.5	2981	363	4385	40.4	2060	19.0	5892	54.3
	14年	10805	2425	22.4	2681	24.8	1068	9.9	347	3.2	691	7.6	9043	1710	58.5	2924	303	4312	39.9	2174	20.1	6191	57.3

資料（統計表）

年度	受診者数 数(A)	摂取エネルギーの過剰								血管を傷つける										メタボ以外動脈硬化要因			
		BMI 25 kg/m <sup>2</sup> 以上		中性脂肪 150mg/dl 以上		ALT(GPT) 31IU/l 以上		HDLコレステロール 40mg/dl 未満		血糖 空腹 100mg/dlor 随 時 140mg/dl 以上			HbA1c(実施者) 5.2%以上 6.1% 以上			収縮期血圧 130mmHg 以上		拡張期血圧 85mmHg 以上		LDLコレステロール 120mg/dl 以上			
		数	割合 (/A)	数	割合 (/A)	数	割合 (/A)	数	割合 (/A)	数	割合 (/B)	測定 数(B)	数	割合 (/B)	測定 数(B)	数	割合 (/A)	数	割合 (/A)	数	割合 (/A)		
<b>60 歳代</b>																							
男	18年	9334	2680	28.7	3298	35.3	1574	16.9	1110	11.9	1428	16.5	8657	2730	71.8	3801	799	5618	60.2	3015	32.3	4109	44.0
	17年	10036	3004	29.9	3676	36.6	1931	19.2	1238	12.3	1635	18.5	8846	2978	66.1	4504	898	6246	62.2	3005	29.9	4399	43.8
	16年	8375	2468	29.5	3159	37.7	1556	18.6	1274	15.2	1431	20.2	7096	2469	66.4	3717	726	5044	60.2	2303	27.5	3548	42.4
	15年	6460	2083	32.2	2529	39.1	1248	19.3	863	13.4	972	18.5	5261	2102	77.0	2729	667	4040	62.5	2049	31.7	2635	40.8
	14年	6186	1881	30.4	2411	39.0	1115	18.0	943	15.2	1011	19.6	5149	1762	69.6	2532	540	3859	62.4	1959	31.7	2400	38.8
女	18年	15530	3693	23.8	4421	28.5	1291	8.3	557	3.6	1291	9.0	14383	3734	72.5	5148	640	8096	52.1	3153	20.3	9836	63.3
	17年	16549	4257	25.7	4999	30.2	1614	9.8	672	4.1	1483	10.2	14474	4074	67.1	6075	708	9019	54.5	3298	19.9	10476	63.3
	16年	13928	3536	25.4	4187	30.1	1369	9.8	622	4.5	1299	11.0	11780	3236	64.4	5028	610	7205	51.7	2472	17.7	8955	64.3
	15年	10827	2986	27.6	3360	31.0	1074	9.9	443	4.1	952	10.9	8760	2883	79.2	3642	623	6146	56.8	2316	21.4	6662	61.5
	14年	10451	2826	27.0	3327	31.8	1028	9.8	491	4.7	938	11.0	8545	2274	67.8	3355	476	5730	54.8	2223	21.3	6432	61.5
<b>70 歳代</b>																							
男	18年	4020	1125	28.0	1267	31.5	570	14.2	607	15.1	681	18.1	3762	1160	76.0	1526	341	2633	65.5	1017	25.3	1595	39.7
	17年	4333	1220	28.2	1415	32.7	660	15.2	622	14.4	763	19.9	3840	1338	70.5	1898	388	2970	68.5	1076	24.8	1676	38.7
	16年	3437	929	27.0	1143	33.3	508	14.8	557	16.2	652	21.9	2979	1045	68.7	1522	333	2312	67.3	805	23.4	1288	37.5
	15年	2812	791	28.1	919	32.7	417	14.8	384	13.7	453	19.0	2384	914	79.2	1154	283	1909	67.9	774	27.5	1022	36.3
	14年	2727	702	25.7	850	31.2	388	14.2	418	15.3	455	19.6	2318	790	70.5	1120	231	1843	67.6	711	26.1	964	35.4
女	18年	5495	1503	27.4	1557	28.3	388	7.1	260	4.7	568	11.0	5154	1206	75.7	1594	286	3489	63.5	1181	21.5	3161	57.5
	17年	5945	1719	28.9	1838	30.9	457	7.7	293	4.9	652	12.4	5272	1506	71.3	2113	318	3927	66.1	1143	19.2	3458	58.2
	16年	4679	1328	28.4	1418	30.3	360	7.7	244	5.2	539	13.3	4060	1099	67.3	1632	242	2988	63.9	752	16.1	2797	59.8
	15年	3887	1198	30.8	1163	29.9	309	7.9	170	4.4	428	12.9	3316	969	77.5	1250	227	2601	66.9	801	20.6	2261	58.2
	14年	3761	1067	28.4	1196	31.8	276	7.3	233	6.2	420	13.0	3225	750	68.3	1098	209	2488	66.2	757	20.1	2173	57.8

## 10.内臓脂肪症候群該当者(学会基準)の状況(平成18年度)

## 男性

	総数		40歳未満		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～74歳		75歳以上		(再掲)40～64歳		(再掲)65～74歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
受診者数	26414		676		2846		5460		9333		4021		4078		12390		9270		
BMI25以上	7574	28.7	196	29.0	996	35.0	1729	31.7	2680	28.7	1125	28.0	848	20.8	3900	31.5	2630	28.4	
有所見者該当状況	高血糖 <sup>1)</sup> 高血圧 <sup>2)</sup> 高脂血 <sup>3)</sup>																		
		176	0.7	1	0.1	17	0.6	42	0.8	71	0.8	24	0.6	21	0.5	91	0.7	63	0.7
		1796	6.8	37	5.5	166	5.8	366	6.7	641	6.9	297	7.4	289	7.1	811	6.5	659	7.1
		817	3.1	35	5.2	215	7.6	225	4.1	227	2.4	73	1.8	42	1.0	556	4.5	184	2.0
		610	2.3	2	0.3	21	0.7	91	1.7	274	2.9	135	3.4	87	2.1	221	1.8	300	3.2
		258	1.0	7	1.0	37	1.3	84	1.5	84	0.9	24	0.6	22	0.5	169	1.4	63	0.7
		2185	8.3	58	8.6	294	10.3	492	9.0	786	8.4	317	7.9	238	5.8	1105	8.9	784	8.5
	978	3.7	6	0.9	88	3.1	269	4.9	359	3.8	165	4.1	91	2.2	533	4.3	353	3.8	
メタボ予備群該当者数	2789	10.6	73	10.8	398	14.0	633	11.6	939	10.1	394	9.8	352	8.6	1458	11.8	906	9.8	
メタボ該当者数	4028	15.2	73	10.8	440	15.5	936	17.1	1501	16.1	641	15.9	437	10.7	2018	16.3	1500	16.2	

## 女性

	総数		40歳未満		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～74歳		75歳以上		(再掲)40～64歳		(再掲)65～74歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
受診者数	61753		4841		11953		18992		15532		5492		4970		39223		12719		
BMI25以上	12443	20.1	509	10.5	1942	16.2	3694	19.5	3693	23.8	1503	27.4	1192	24.0	7488	19.1	3344	26.3	
有所見者該当状況	高血糖 <sup>1)</sup> 高血圧 <sup>2)</sup> 高脂血 <sup>3)</sup>																		
		412	0.7	5	0.1	65	0.5	152	0.8	130	0.8	39	0.7	21	0.4	287	0.7	99	0.8
		3549	5.7	86	1.8	486	4.1	1021	5.4	1057	6.8	504	9.2	445	9.0	2017	5.1	1051	8.3
		1196	1.9	69	1.4	236	2.0	372	2.0	356	2.3	95	1.7	68	1.4	805	2.1	253	2.0
		1030	1.7	8	0.2	95	0.8	298	1.6	333	2.1	153	2.8	143	2.9	537	1.4	323	2.5
		325	0.5	3	0.1	51	0.4	134	0.7	90	0.6	31	0.6	16	0.3	321	0.8	71	0.6
		2637	4.3	43	0.9	263	2.2	705	3.7	937	6.0	404	7.4	285	5.7	1339	3.4	893	7.0
	984	1.6	7	0.1	80	0.7	303	1.6	315	2.0	153	2.8	126	2.5	534	1.4	317	2.5	
メタボ予備群該当者数	5207	8.4	162	3.3	787	6.6	1545	8.1	1543	9.9	638	11.6	505	10.2	3110	7.9	1403	11.0	
メタボ該当者数	4962	8.0	51	1.1	489	4.1	1440	7.6	1674	10.8	739	13.5	556	11.2	2741	7.0	1601	12.6	

有所見者該当状況における判定について

- 1) 高血糖 空腹時血糖110mg/dl以上、HbA1c5.5%以上、随時血糖140mg/dl以上、服薬あり
- 2) 高血圧 収縮期血圧130mmHg以上、拡張期血圧85mmHg以上、服薬あり
- 3) 高脂血 中性脂肪150mg/dl以上、HDLコレステロール40mg/dl未満、服薬あり

## 11. 特定健診の階層化に基づく特定保健指導対象者(平成18年度)

男性

				総数		40歳未満		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～74歳		75歳以上		(再掲)40～64歳		(再掲)65～74歳				
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%			
受診者数				26414		676		2846		5460		9333		4021		4078		12390		9270				
BMI25以上				7574	28.7	196	29.0	996	35.0	1729	31.7	2680	28.7	1125	28.0	848	20.8	3900	31.5	2630	28.4			
BMI25 以上	有所見者 該当状況	高血糖	高血圧	高脂血																				
					299	1.1	4	0.6	39	1.4	69	1.3	121	1.3	37	0.9	29	0.7	166	1.3	100	1.1		
					1522	5.8	34	5.0	134	4.7	315	5.8	535	5.7	254	6.3	255	6.3	674	5.4	567	6.1		
					703	2.7	35	5.2	186	6.5	189	3.5	189	2.0	62	1.5	37	0.9	468	3.8	155	1.7		
					852	3.2	4	0.6	48	1.7	147	2.7	363	3.9	178	4.4	120	2.9	357	2.9	392	4.2		
					401	1.5	8	1.2	71	2.5	115	2.1	137	1.5	35	0.9	27	0.7	253	2.0	92	1.0		
					1888	7.1	54	8.0	254	8.9	410	7.5	678	7.3	278	6.9	214	5.2	935	7.5	685	7.4		
					1275	4.8	10	1.5	128	4.5	351	6.4	467	5.0	204	5.1	115	2.8	698	5.6	452	4.9		
				血圧・血糖・脂質の治療薬を 服薬中の人数			1603	6.1	7	1.0	87	3.1	253	4.6	625	6.7	322	8.0	309	7.6	585	4.7	702	7.6
				喫煙者数			1694	6.4	96	14.2	278	9.8	443	8.1	528	5.7	205	5.1	144	3.5	983	7.9	471	5.1
			情報提供該当数			2842	10.8	57	8.4	282	9.9	515	9.4	1047	11.2	499	12.4	442	10.8	1213	9.8	1130	12.2	
			動機づけ支援該当数			2380	9.0	37	5.5	164	5.8	281	5.1	944	10.1	577	14.3	377	9.2	608	4.9	1358	14.6	
			積極的支援該当数			1937	7.3	100	14.8	465	16.3	834	15.3	538	5.8	0	0.0	0	0.0	1837	14.8	0	0.0	
			動機づけ支援または積極的支援 (喫煙状況による)			401	1.5	2	0.3	82	2.9	99	1.8	144	1.5	46	1.1	28	0.7	237	1.9	134	1.4	
			何かの疾患で医療機関にかかっ ている数			2229	8.4	10	1.5	152	5.3	374	6.8	863	9.2	435	10.8	395	9.7	862	7.0	962	10.4	

## 女性

				総数		40歳未満		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～74歳		75歳以上		(再掲)40～64歳		(再掲)65～74歳		
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
受診者数				61753		4841		11926		18992		15532		5492		4970		39223		12719		
BMI25以上				12356	20.0	509	10.5	1942	16.3	3694	19.5	3693	23.8	1503	27.4	1192	24.0	7488	19.1	3344	26.3	
BMI25 以上	有所見者 該当 状況	高血糖	高血圧	高脂血																		
					792	1.3	11	0.2	166	1.4	287	1.5	238	1.5	57	1.0	33	0.7	586	1.5	162	1.3
					3038	4.9	79	1.6	412	3.5	821	4.3	900	5.8	439	8.0	393	7.9	1668	4.3	901	7.1
					1021	1.7	66	1.4	197	1.7	311	1.6	295	1.9	82	1.5	64	1.3	672	1.7	216	1.7
					1526	2.5	15	0.3	167	1.4	472	2.5	468	3.0	218	4.0	195	3.9	861	2.2	472	3.7
					563	0.9	6	0.1	92	0.8	221	1.2	172	1.1	43	0.8	20	0.4	416	1.1	107	0.8
					2291	3.7	30	0.6	212	1.8	588	3.1	823	5.3	371	6.8	267	5.4	1184	3.0	810	6.4
					1318	2.1	10	0.2	131	1.1	420	2.2	429	2.8	185	3.4	143	2.9	766	2.0	399	3.1
			血圧・血糖・脂質の治療薬を 服薬中の人数	2715	4.4	7	0.1	135	1.1	603	3.2	911	5.9	552	10.1	507	10.2	1146	2.9	1055	8.3	
			喫煙者数	996	1.6	61	1.3	193	1.6	248	1.3	255	1.6	116	2.1	123	2.5	573	1.5	239	1.9	
			情報提供該当数	5462	8.8	246	5.1	684	5.7	1431	7.5	1566	10.1	791	14.4	668	13.4	2911	7.4	1637	12.9	
			動機づけ支援該当数	3825	6.2	94	1.9	471	3.9	847	4.5	1300	8.4	639	11.6	473	9.5	1731	4.4	1526	12.0	
			積極的支援該当数	2362	3.8	81	1.7	527	4.4	1155	6.1	599	3.9	0	0.0	0	0.0	2281	5.8	0	0.0	
		動機づけ支援または積極的支援 (喫煙状況による)	809	1.3	32	0.7	183	1.5	258	1.4	222	1.4	70	1.3	44	0.9	559	1.4	174	1.4		
		何かの疾患で医療機関にかかっ ている数	3493	5.7	12	0.2	251	2.1	821	4.3	1186	7.6	693	12.6	603	12.1	1516	3.9	1362	10.7		

## 12. BMI別、有所見該当状況

男性

	総数			40歳未満			40～49歳			50～59歳			60～69歳			
	人数	割合	割合	人数	割合	割合	人数	割合	割合	人数	割合	割合	人数	割合	割合	
受診者数	26414	100%		676	100%		2846	100%		5460	100%		9333	100%		
BMI25以上	7574	28.7	100%	196	29.0	100%	996	35.0	100%	1729	31.7	100%	2680	28.7	100%	
有所見 該当状況	高血糖															
	高血糖	高血圧	高脂血													
	該当なし(腹囲のみ)	621	2.4	8.2	47	7.0	24.0	133	4.7	13.4	133	2.4	7.7	184	2.0	6.9
		299	1.1	3.9	4	0.6	2.0	39	1.4	3.9	69	1.3	4.0	121	1.3	4.5
		1522	5.8	20.1	35	5.2	17.9	134	4.7	13.5	315	5.8	18.2	535	5.7	20.0
		703	2.7	9.3	34	5.0	17.3	186	6.5	18.7	189	3.5	10.9	189	2.0	7.1
		852	3.2	11.2	4	0.6	2.0	52	1.8	5.2	147	2.7	8.5	363	3.9	13.5
		401	1.5	5.3	8	1.2	4.1	67	2.4	6.7	115	2.1	6.7	137	1.5	5.1
		1888	7.1	24.9	54	8.0	27.6	254	8.9	25.5	410	7.5	23.7	678	7.3	25.3
	1275	4.8	16.8	10	1.5	5.1	128	4.5	12.9	351	6.4	20.3	467	5.0	17.4	
BMI25以上で有所見が1個	2524	9.6	33.3	73	10.8	37.2	359	12.6	36.0	573	10.5	33.1	845	9.1	31.5	
BMI25以上で有所見が2個以上	4416	16.7	58.3	76	11.2	38.8	501	17.6	50.3	1023	18.7	59.7%	1645	17.6	61.4	
BMI25未満	18461	69.9	100%	480	71.0	100%	1820	63.9	100%	3654	66.9	100%	6495	69.6	100%	
有所見 該当状況	高血糖	高血圧	高脂血													
	該当なし(リスクなし)	4067	15.4	22.0	272	40.2	56.7	678	23.8	37.3	916	16.8	25.1	1240	13.3	19.1
		1278	4.8	6.9	12	1.8	2.5	95	3.3	5.2	256	4.7	7.0	527	5.6	8.1
		4601	17.4	24.9	73	10.8	15.2	288	10.1	15.8	758	13.9	20.7	1639	17.6	25.2
		1871	7.1	10.1	86	12.7	17.9	371	13.0	20.4	481	8.8	13.2	542	5.8	8.3
		1874	7.1	10.2	4	0.6	0.8	50	1.8	2.7	221	4.0	6.0	755	8.1	11.6
		696	2.6	3.8	0	0.0	0.0	56	2.0	3.1	144	2.6	3.9	284	3.0	4.4
		2650	10.0	14.4	31	4.6	6.5	212	7.4	11.6	591	10.8	16.2	966	10.4	14.9
		1368	5.2	7.4	2	0.3	0.4	69	2.4	3.8	276	5.1	7.6	531	5.7	8.2
BMI25未満で有所見が1個	7750	29.3	42.0	171	25.3	35.6	754	26.5	41.4	1495	27.4	40.9	2708	29.0	41.7	
BMI25未満で有所見が2個以上	6588	24.9	35.7	37	5.5	7.7	387	13.6	21.3	1232	22.6	33.7	2536	27.2	39.0	

割合の分母は、割合「は」受診者数、割合「は」BMI25以上、または「BMI25未満」の数

## 男性(つづき)

				70～74歳			75歳以上			(再掲)40～64歳			(再掲)65～74歳		
				人数	割合	割合	人数	割合	割合	人数	割合	割合	人数	割合	割合
受診者数				4021	100%		4078	100%		12390	100%		9270	100%	
BMI25以上				1125	28.0	100%	848	20.8	100%	3900	31.5	100%	2630	28.4	100%
有所見該当状況	高血糖	高血圧	高脂血												
	該当なし(腹囲のみ)			74	1.8	6.6	50	1.2	5.9	344	2.8	8.8	180	1.9	6.8
				37	0.9	3.3	29	0.7	3.4	166	1.3	4.3	100	1.1	3.8
				254	6.3	22.6	255	6.3	30.1	674	5.4	17.3	567	6.1	21.6
				62	1.5	5.5	37	0.9	4.4	468	3.8	12.0	155	1.7	5.9
				178	4.4	15.8	120	2.9	14.2	357	2.9	9.2	392	4.2	14.9
				35	0.9	3.1	27	0.7	3.2	253	2.0	6.5	92	1.0	3.5
				278	6.9	24.7	214	5.2	25.2	935	7.5	24.0	685	7.4	26.0
				204	5.1	18.1	115	2.8	13.6	698	5.6	17.9	452	4.9	17.2
BMI25以上で有所見が1個				373	9.3	33.2	298	7.3	35.1	1308	10.6	33.5	844	9.1	32.1
BMI25以上で有所見が2個以上				719	17.9	63.9	441	10.8	52.0	2243	18.1	57.5	1653	17.8	62.9
BMI25未満				2836	70.5	100%	3176	77.9	100%	8325	67.2	100%	6480	69.9	100%
有所見該当状況	高血糖	高血圧	高脂血												
	該当なし(リスクなし)			453	11.3	16.0	508	12.5	16.0	2168	17.5	26.0	1119	12.1	17.3
				200	5.0	7.1	188	4.6	5.9	590	4.8	7.1	488	5.3	7.5
				820	20.4	28.9	1058	25.9	33.3	1715	13.8	20.6	1805	19.5	27.9
				185	4.6	6.5	171	4.2	5.4	1120	9.0	13.5	444	4.8	6.9
				403	10.0	14.2	485	11.9	15.3	582	4.7	7.0	862	9.3	13.3
				98	2.4	3.5	70	1.7	2.2	330	2.7	4.0	237	2.6	3.7
				432	10.7	15.2	418	10.3	13.2	1226	9.9	14.7	975	10.5	15.0
				236	5.9	8.3	254	6.2	8.0	577	4.7	6.9	535	5.8	8.3
BMI25未満で有所見が1個				1275	31.7	45.0	1325	32.5	41.7	3425	27.6	41.1	2815	30.4	43.4
BMI25未満で有所見が2個以上				1227	30.5	43.3	1145	28.1	36.1	2715	21.9	32.6	2675	28.9	41.3

割合の分母は、割合「は」受診者数、割合「は」BMI25以上、または「BMI25未満」の数

## 女

	総数			40歳未満			40～49歳			50～59歳			60～69歳					
	人数	割合	割合	人数	割合	割合	人数	割合	割合	人数	割合	割合	人数	割合	割合			
受診者数	61753	100%		4841			11926	100%		18992	100%		15532	100%				
BMI25以上	12533	20.3	100%	509	10.5	100%	1942	16.3	100%	3694	19.5	100%	3693	23.8	100%			
有所見該当状況	高血糖	高血圧	高脂血															
	該当なし(腹囲のみ)			1910	3.1	15.2	236	4.9	46.4	564	4.7	29.0	571	3.0	15.5	363	2.3	9.8
				792	1.3	6.3	11	0.2	2.2	166	1.4	8.5	287	1.5	7.8	238	1.5	6.4
				3038	4.9	24.2	79	1.6	15.5	409	3.4	21.1	821	4.3	22.2	900	5.8	24.4
				1021	1.7	8.1	66	1.4	13.0	200	1.7	10.3	311	1.6	8.4	295	1.9	8.0
				1526	2.5	12.2	15	0.3	2.9	167	1.4	8.6	472	2.5	12.8	468	3.0	12.7
				563	0.9	4.5	6	0.1	1.2	92	0.8	4.7	221	1.2	6.0	172	1.1	4.7
				2291	3.7	18.3	30	0.6	5.9	212	1.8	10.9	588	3.1	15.9	823	5.3	22.3
				1318	2.1	10.5	10	0.2	2.0	131	1.1	6.7	420	2.2	11.4	429	2.8	11.6
BMI25以上で有所見が1個	4851	7.9	38.7	156	3.2	30.6	775	6.5	39.9	1419	7.5	38.4	1433	9.2	38.8			
BMI25以上で有所見が2個以上	5698	9.2	45.5	61	1.3	12.0	602	5.0	31.0	1701	9.0	46.0	1892	12.2	51.2			
BMI25未満	48147	78.0	100%	4332	89.5	100%	9792	82.1	100%	14941	78.7	100%	11461	73.8	100%			
有所見該当状況	高血糖	高血圧	高脂血															
	該当なし(リスクなし)			20571	33.3	42.7	3429	70.8	79.2	6550	54.9	66.9	6127	32.3	41.0	3107	20.0	27.1
				3545	5.7	7.4	74	1.5	1.7	668	5.6	6.8	1363	7.2	9.1	1028	6.6	9.0
				10668	17.3	22.2	224	4.6	5.2	1414	11.9	14.4	3381	17.8	22.6	2943	18.9	25.7
				3673	5.9	7.6	150	3.1	3.5	606	5.1	6.2	1398	7.4	9.4	1030	6.6	9.0
				2925	4.7	6.1	12	0.2	0.3	183	1.5	1.9	791	4.2	5.3	1056	6.8	9.2
				984	1.6	2.0	4	0.1	0.1	78	0.7	0.8	357	1.9	2.4	392	2.5	3.4
				3996	6.5	8.3	17	0.4	0.4	245	2.1	2.5	1153	6.1	7.7	1361	8.8	11.9
				1317	2.1	2.7	2	0.0	0.0	45	0.4	0.5	356	1.9	2.4	531	3.4	4.6
BMI25未満で有所見が1個	17886	29.0	37.1	448	9.3	10.3	2688	22.5	27.5	6142	32.3	41.1	5001	32.2	43.6			
BMI25未満で有所見が2個以上	9222	14.9	19.2	35	0.7	0.8	551	4.6	5.6	2657	14.0	17.8	3340	21.5	29.1			

割合の分母は、割合「は」受診者数、割合「は」BMI25以上、または「BMI25未満」の数

## 女(つづき)

	70～74歳			75歳以上			(再掲)40～64歳			(再掲)65～74歳					
	人数	割合	割合	人数	割合	割合	人数	割合	割合	人数	割合	割合			
受診者数	5492	100%		4970	100%		39223	100%		12719	100%				
BMI25以上	1503	27.4	100%	1192	24.0		7488	19.1	100%	3344	26.3	100%			
有所見該当状況	高血糖	高血圧	高脂血												
	該当なし(腹囲のみ)			105	1.9	7.0	71	1.4	6.0	1332	3.4	17.8	271	2.1	8.1
				57	1.0	3.8	33	0.7	2.8	586	1.5	7.8	162	1.3	4.8
				439	8.0	29.2	393	7.9	33.0	1668	4.3	22.3	901	7.1	26.9
				82	1.5	5.5	64	1.3	5.4	672	1.7	9.0	216	1.7	6.5
				218	4.0	14.5	195	3.9	16.4	862	2.2	11.5	472	3.7	14.1
				43	0.8	2.9	20	0.4	1.7	412	1.1	5.5	107	0.8	3.2
				371	6.8	24.7	267	5.4	22.4	1184	3.0	15.8	810	6.4	24.2
				185	3.4	12.3	143	2.9	12.0	764	1.9	10.2	399	3.1	11.9
BMI25以上で有所見が1個	609	11.1	40.5	447	9.0	37.5	2926	7.5	39.1	1320	10.4	39.5			
BMI25以上で有所見が2個以上	856	15.6	57.0	570	11.5	47.8	3222	8.2	43.0	1839	14.5	55.0			
BMI25未満	3891	70.8	100%	3730	75.1		31003	79.0	100%	9082	71.4	100%			
有所見該当状況	高血糖	高血圧	高脂血												
	該当なし(リスクなし)			762	13.9	19.6	596	12.0	16.0	14543	37.1	46.9	2003	15.7	22.1
				255	4.6	6.6	157	3.2	4.2	2676	6.8	8.6	638	5.0	7.0
				1257	22.9	32.3	1485	29.9	39.8	6277	16.0	20.2	2739	21.5	30.2
				285	5.2	7.3	168	3.4	4.5	2582	6.6	8.3	716	5.6	7.9
				471	8.6	12.1	441	8.9	11.8	1519	3.9	4.9	995	7.8	11.0
				76	1.4	2.0	48	1.0	1.3	643	1.6	2.1	247	1.9	2.7
				592	10.8	15.2	628	12.6	16.8	2073	5.3	6.7	1278	10.0	14.1
				185	3.4	4.8	198	4.0	5.3	664	1.7	2.1	453	3.6	5.0
BMI25未満で有所見が1個	1885	34.3	48.4	1698	34.2	45.5	11535	29.4	37.2	4202	33.0	46.3			
BMI25未満で有所見が2個以上	1409	25.7	36.2	1212	24.4	32.5	4899	12.5	15.8	3058	24.0	33.7			

割合の分母は、割合「は」受診者数、割合「は」BMI25以上、または「BMI25未満」の数