

2. 市町村国民健康保険の状況

1) 健診受診者及び検査項目別検査値状況

年齢階級別の健診受診者数は表 67 のとおりであった。65～74 歳の受診者数で全体の 73.7%となった。(図 97 参照)

検査項目別の受診者数、平均値、中央値、標準偏差は表 68 のとおりであった。

表 67 年齢階級別受診者数（市町村国保）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
男性	受診者数(人)	4,514	6,028	6,432	6,510	10,324	32,077	61,551	127,436
	割合(%)	3.5	4.7	5.0	5.1	8.1	25.2	48.3	100.0
女性	受診者数(人)	4,798	6,311	7,082	9,085	18,913	47,852	83,046	177,087
	割合(%)	2.7	3.6	4.0	5.1	10.7	27.0	46.9	100.0
合計	受診者数(人)	9,312	12,339	13,514	15,595	29,237	79,929	144,597	304,523
	割合(%)	3.1	4.1	4.4	5.1	9.6	26.2	47.5	100.0




図 97 性・年齢階級別受診割合（市町村国保）

表 68 検査項目別受診者数・平均値・中央値・標準偏差（市町村国保）

		受診者数(人)	平均値	中央値	標準偏差
男性	BMI	127,417	24.0	23.7	3.3
	腹囲	127,386	86.8	86.0	9.1
	収縮期血圧	127,426	131.4	130.0	16.5
	拡張期血圧	127,420	78.0	78.0	11.0
	中性脂肪	127,410	133.5	109.0	94.8
	HDL コレステロール	127,423	59.8	57.0	16.4
	LDL コレステロール	126,869	120.5	119.0	30.8
	GOT	127,424	25.5	23.0	12.7
	GPT	127,423	25.4	21.0	17.5
	γGT	127,365	46.1	30.0	56.5
	空腹時血糖	80,981	103.2	98.0	22.0
	HbA1c	127,117	5.8	5.7	0.7
	eGFR	122,079	69.8	69.0	15.1
	女性	BMI	177,060	22.6	22.2
腹囲		176,978	81.7	81.1	10.2
収縮期血圧		177,071	129.6	128.0	17.5
拡張期血圧		177,060	75.1	75.0	10.8
中性脂肪		177,078	106.3	91.0	64.1
HDL コレステロール		177,077	71.6	70.0	17.6
LDL コレステロール		176,354	128.9	127.0	30.9
GOT		177,075	23.4	22.0	10.1
GPT		177,073	19.9	17.0	13.0
γGT		177,068	26.4	19.0	26.7
空腹時血糖		114,455	96.4	93.0	16.6
HbA1c		176,665	5.7	5.6	0.6
eGFR		170,524	71.4	70.3	14.2

2) 分析項目別該当割合

①メタボリックシンドローム

男性のメタボリックシンドローム該当の割合は図 98-1、表 69-1 のとおり、40～44 歳が 16.1%と最も低く、年齢階級が上がるにしたがって高くなり、65～69 歳では 36.2%であった。

メタボリックシンドローム予備群は、どの年齢階級も 17.5%～21.1%以内であり、年齢の若い方に若干該当が多い傾向はみられたが、年齢階級による大きな違いはなかった。

予備群と該当を合わせた割合は、40～44 歳が 37.1%で最も低く、65～69 歳が 54.8%と最も高くなった。

女性は図 98-2、表 69-2 のとおり年齢階級が上がるにしたがって、メタボリックシンドロームの該当の割合が高くなった。

メタボリックシンドローム該当は 40～44 歳が 3.2%と最も低く、年齢階級が上がるにしたがって高くなり、70～74 歳で 13.6%と最も高くなった。

メタボリックシンドローム予備群は、40～44 歳が 5.2%と最も低く、50～54 歳が最も高く 6.5%であった。

予備群と該当を合わせた割合は、40～44 歳が 8.4%と最も低く、年齢階級が上がるごとに増加し、70～74 歳は 19.5%で最も高くなった。




図 98-1 メタボ該当及び予備群の割合 市町村国保（男性）




図 98-2 メタボ該当及び予備群の割合 市町村国保（女性）

表 69-1 メタボ該当及び予備群の割合 市町村国保（男性）

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人数(人)	非該当	2,836	3,497	3,447	3,254	4,877	14,473	28,589	60,973
	予備群	950	1,238	1,271	1,220	1,867	5,985	10,783	23,314
	該当	726	1,287	1,707	2,024	3,572	11,588	22,129	43,033
	合計	4,512	6,022	6,425	6,498	10,316	32,046	61,501	127,320
割合(%)	非該当	62.9	58.1	53.6	50.1	47.3	45.2	46.5	47.9
	予備群	21.1	20.6	19.8	18.8	18.1	18.7	17.5	18.3
	該当	16.1	21.4	26.6	31.1	34.6	36.2	36.0	33.8
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	該当予備群合計	37.1	41.9	46.4	49.9	52.7	54.8	53.5	52.1

表 69-2 メタボ該当及び予備群の割合 市町村国保（女性）

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人数(人)	非該当	4,382	5,603	6,060	7,689	15,657	38,726	66,772	144,889
	予備群	250	361	462	558	1,195	3,011	4,922	10,759
	該当	154	338	550	823	2,040	6,056	11,269	21,230
	合計	4,786	6,302	7,072	9,070	18,892	47,793	82,963	176,878
割合(%)	非該当	91.6	88.9	85.7	84.8	82.9	81.0	80.5	81.9
	予備群	5.2	5.7	6.5	6.2	6.3	6.3	5.9	6.1
	該当	3.2	5.4	7.8	9.1	10.8	12.7	13.6	12.0
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	該当予備群合計	8.4	11.1	14.3	15.2	17.1	19.0	19.5	18.1

②肥満（BMI25 以上または腹囲基準値以上）

肥満（BMI25 以上または腹囲基準値以上）の割合は、男性は図 99-1、表 70-1 のとおり 40～44 歳が 53.1%で最も低く、65～69 歳で 60.5%と最も高かった。女性は図 99-2、表 70-2 のとおり 40～44 歳の 21.6%に対し、65～69 歳は 28.1%と年齢階級が高くなるにしたがい割合が増加した。

腹囲が基準以上かつ BMI25 以上の割合は、男性は 50 歳～54 歳が 39.8%で最も高く、年齢階級が上がるにつれて減少する傾向がみられた。女性では 40～44 歳が 12.7%と最も低く、50～54 歳で 15.7%と最も高くなった。

腹囲のみ基準以上の割合は、男性が女性より多かったが、男女とも年齢階級が上がるにしたがって増加した。

BMI25 以上のみの割合は、男性では 1.2～2.8%であったのに対し、女性は 7.1～8.3%と、男性に比べて割合が高かった。男女とも 45～49 歳の該当率が最も高く、男女とも年齢階級が高い方が該当率は少なかった。




図 99-1 肥満該当の割合 市町村国保（男性）




図 99-2 肥満該当の割合 市町村国保（女性）

表 70-1 肥満該当の割合 市町村国保（男性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数(人)	基準未満	2,117	2,590	2,674	2,650	4,176	12,663	25,784	52,654
	腹囲<85 &BMI≥25	97	169	161	127	192	458	736	1,940
	腹囲≥85 &BMI<25	662	926	1,038	1,178	2,199	8,122	17,022	31,147
	腹囲≥85 &BMI≥25	1637	2,340	2,556	2,547	3,751	10,818	17,984	41,633
	合計	4,513	6,025	6,429	6,502	10,318	32,061	61,526	127,374
割合(%)	基準未満	46.9	43.0	41.6	40.8	40.5	39.5	41.9	41.3
	腹囲<85 &BMI≥25	2.1	2.8	2.5	2.0	1.9	1.4	1.2	1.5
	腹囲≥85 &BMI<25	14.7	15.4	16.1	18.1	21.3	25.3	27.7	24.5
	腹囲≥85 &BMI≥25	36.3	38.8	39.8	39.2	36.4	33.7	29.2	32.7
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	肥満該当	53.1	57.0	58.4	59.2	59.5	60.5	58.1	58.7

表 70-2 肥満該当の割合 市町村国保（女性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数(人)	基準未満	3,753	4,785	5,229	6,785	13,903	34,360	59,924	128,739
	腹囲<85 &BMI≥25	375	521	568	655	1,361	3,591	5,907	12,978
	腹囲≥85 &BMI<25	52	106	166	311	782	2,520	5,084	9,021
	腹囲≥85 &BMI≥25	610	893	1,112	1,324	2,857	7,347	12,074	26,217
	合計	4,790	6,305	7,075	9,075	18,903	47,818	82,989	176,955
割合(%)	基準未満	78.4	75.9	73.9	74.8	73.5	71.9	72.2	72.8
	腹囲<85 &BMI≥25	7.8	8.3	8.0	7.2	7.2	7.5	7.1	7.3
	腹囲≥85 &BMI<25	1.1	1.7	2.3	3.4	4.1	5.3	6.1	5.1
	腹囲≥85 &BMI≥25	12.7	14.2	15.7	14.6	15.1	15.4	14.5	14.8
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	肥満該当	21.6	24.1	26.1	25.2	26.5	28.1	27.8	27.2

③高血圧

高血圧該当の割合は男女とも年齢階級が上がるにしたがって増加した。男性では図 100-1、表 71-1 のとおり 40～44 歳は 18.9%、70～74 歳は 65.9%、女性では図 100-2、表 71-2 のとおり 40～44 歳は 8.3%、70～74 歳は 57.0%であった。

高血圧予備群の割合は男性では 11.9%～14.8%内とほぼ横ばいであったが、女性では 40～44 歳は 7.9%であり、65～69 歳で最も高く 14.9%となった。

降圧薬の服薬率は、男女とも加齢に伴い増加し、70～74 歳では男性は 50.7%、女性は 39.9%であった。服薬率は、男性よりも女性の方がいずれの年齢階級も少なかった。




図 100-1 高血圧該当及び予備群の割合と服薬率 市町村国保（男性）




図 100-2 高血圧該当及び予備群の割合と服薬率 市町村国保（女性）

表 71-1 高血圧該当及び予備群の割合と服薬率 市町村国保（男性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数(人)	非該当	3,009	3,480	3,067	2,464	3,053	8,173	13,669	36,915
	予備群	654	895	929	918	1,347	4,043	7,344	16,130
	該当	851	1,652	2,434	3,125	5,923	19,857	40,530	74,372
	合計	4,514	6,027	6,430	6,507	10,323	32,073	61,543	127,417
割合(%)	非該当	66.7	57.7	47.7	37.9	29.6	25.5	22.2	29.0
	予備群	14.5	14.8	14.4	14.1	13.0	12.6	11.9	12.7
	該当	18.9	27.4	37.9	48.0	57.4	61.9	65.9	58.4
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数(人)	服薬あり	263	661	1,250	1,921	4,061	14,735	31,202	54,093
	服薬なし	4,251	5,367	5,182	4,589	6,263	17,342	30,349	73,343
	合計	4,514	6,028	6,432	6,510	10,324	32,077	61,551	127,436
割合(%)	服薬あり	5.8	11.0	19.4	29.5	39.3	45.9	50.7	42.4
	服薬なし	94.2	89.0	80.6	70.5	60.7	54.1	49.3	57.6
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 71-2 高血圧該当及び予備群の割合と服薬率 市町村国保（女性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数(人)	非該当	4,020	4,741	4,595	5,247	8,862	18,035	23,805	69,305
	予備群	380	637	878	1,107	2,699	7,145	11,914	24,760
	該当	396	933	1,607	2,730	7,347	22,661	47,317	82,991
	合計	4,796	6,311	7,080	9,084	18,908	47,841	83,036	177,056
割合(%)	非該当	83.8	75.1	64.9	57.8	46.9	37.7	28.7	39.1
	予備群	7.9	10.1	12.4	12.2	14.3	14.9	14.3	14.0
	該当	8.3	14.8	22.7	30.1	38.9	47.4	57.0	46.9
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数(人)	服薬あり	112	398	819	1,611	4,468	14,657	33,174	55,239
	服薬なし	4,686	5,913	6,263	7,474	14,445	33,195	49,872	121,848
	合計	4,798	6,311	7,082	9,085	18,913	47,852	83,046	177,087
割合(%)	服薬あり	2.3	6.3	11.6	17.7	23.6	30.6	39.9	31.2
	服薬なし	97.7	93.7	88.4	82.3	76.4	69.4	60.1	68.8
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

④脂質異常症

男性は図 101-1、表 72-1 のとおり 60～64 歳が 63.8%と最も高く、その後は年齢階級が高くなるにしたがい該当率が低下し、70～74 歳では 60.6%であった。

女性は図 101-2、表 72-2 のとおり 40～44 歳は 26.7%であったが、年齢階級が上がるにしたがって該当率が増加し、70～74 歳では 70.1%と最も高くなっていた。

脂質異常症に対する薬の服薬率は、男女とも加齢に伴い増加した。40～59 歳までは男性が女性を上回っていたが、60 歳以降は女性が男性を上回り、70～74 歳では、女性が男性より 10.0%高くなっていた。




図 101-1 脂質異常症該当割合と服薬率 市町村国保（男性）




図 101-2 脂質異常症該当割合と服薬率 市町村国保（女性）

表 72-1 脂質異常症該当割合と服薬率 市町村国保（男性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数 人	非該当	1,990	2,430	2,446	2,424	3,728	12,068	24,188	49,274
	該当	2,515	3,589	3,981	4,077	6,584	19,961	37,229	77,936
	合計	4,50	6,019	6,427	6,501	10,312	32,029	61,417	127,210
割合 %	非該当	44.2	40.4	38.1	37.3	36.2	37.7	39.4	38.7
	該当	55.8	59.6	61.9	62.7	63.8	62.3	60.6	61.3
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数 人	服薬あり	219	558	854	1,153	2,394	8,329	17,314	30,821
	服薬なし	4,295	5,470	5,578	5,357	7,930	23,748	44,237	96,615
	合計	4,514	6,028	6,432	6,510	10,324	32,077	61,551	127,436
割合 %	服薬あり	4.9	9.3	13.3	17.7	23.2	26.0	28.1	24.2
	服薬なし	95.1	90.7	86.7	82.3	76.8	74.0	71.9	75.8
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 72-2 脂質異常症該当割合と服薬率 市町村国保（女性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数 人	非該当	3,506	4,168	3,651	3,751	6,561	14,820	24,760	61,217
	該当	1,276	2,123	3,418	5,326	12,322	32,932	58,101	115,498
	合計	4,782	6,291	7,069	9,077	18,883	47,752	82,861	176,715
割合 %	非該当	73.3	66.3	51.6	41.3	34.7	31.0	29.9	34.6
	該当	26.7	33.7	48.4	58.7	65.3	69.0	70.1	65.4
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数 人	服薬あり	117	259	648	1,523	4,804	15,581	31,680	54,612
	服薬なし	4,681	6,052	6,434	7,562	14,109	32,270	51,366	122,474
	合計	4,798	6,311	7,082	9,085	18,913	47,851	83,046	177,086
割合 %	服薬あり	2.4	4.1	9.1	16.8	25.4	32.6	38.1	30.8
	服薬なし	97.6	95.9	90.9	83.2	74.6	67.4	61.9	69.2
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

⑤糖尿病

糖尿病該当の割合は、男性が女性より多く、男女とも年齢が上がるにしたがい増加した。男性は図 102-1、表 73-1 のとおり 40～44 歳は 4.0%であり、70～74 歳では 20.3%、女性では図 102-2、表 73-2 のとおり 40～44 歳は 1.7%、70～74 歳では 10.7%であった。

糖尿病予備群の割合も、男女とも年齢が上がるにしたがい増加し、男性は 40～44 歳は 4.1%、70～74 歳は 14.4%、女性は 40～44 歳は 2.3%、70～74 歳は 15.5%であり、男性より女性のほうが加齢に伴い該当が大きく増加していた。

血糖を下げる薬の服薬率は、男女とも加齢に伴い増加し、70～74 歳では男性は 14.0%、女性は 6.9%であった




図 102-1 糖尿病該当及び予備群の割合と服薬率 市町村国保（男性）




図 102-2 糖尿病該当及び予備群の割合と服薬率 市町村国保（女性）

表 73-1 糖尿病該当及び予備群の割合と服薬率 市町村国保（男性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数(人)	非該当	4,147	5,197	5,298	5,049	7,461	21,991	40,191	89,334
	予備群	187	374	488	631	1,205	4,248	8,849	15,982
	該当	179	455	644	830	1,657	5,827	12,495	22,087
	合計	4,513	6,026	6,430	6,510	10,323	32,066	61,535	127,403
割合(%)	非該当	91.9	86.2	82.4	77.6	72.3	68.6	65.3	70.1
	予備群	4.1	6.2	7.6	9.7	11.7	13.2	14.4	12.5
	該当	4.0	7.6	10.0	12.7	16.1	18.2	20.3	17.3
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数(人)	服薬あり	89	253	399	522	1,101	4,007	8,620	14,991
	服薬なし	4,425	5,775	6,033	5,988	9,223	28,070	52,931	112,445
	合計	4,514	6,028	6,432	6,510	10,324	32,077	61,551	127,436
割合(%)	服薬あり	2.0	4.2	6.2	8.0	10.7	12.5	14.0	11.8
	服薬なし	98.0	95.8	93.8	92.0	89.3	87.5	86.0	88.2
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 73-2 糖尿病該当及び予備群の割合と服薬率 市町村国保（女性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数(人)	非該当	4,604	5,893	6,310	7,703	15,388	36,739	61,284	137,921
	予備群	110	242	478	846	2,168	6,763	12,851	23,458
	該当	82	173	293	532	1,351	4,335	8,894	15,660
	合計	4,796	6,308	7,081	9,081	18,907	47,837	83,029	177,039
割合(%)	非該当	96.0	93.4	89.1	84.8	81.4	76.8	73.8	77.9
	予備群	2.3	3.8	6.8	9.3	11.5	14.1	15.5	13.3
	該当	1.7	2.7	4.1	5.9	7.1	9.1	10.7	8.8
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数(人)	服薬あり	48	101	173	339	832	2,772	5,771	10,036
	服薬なし	4,750	6,210	6,909	8,746	18,081	45,078	77,274	167,048
	合計	4,798	6,311	7,082	9,085	18,913	47,850	83,045	177,084
割合(%)	服薬あり	1.0	1.6	2.4	3.7	4.4	5.8	6.9	5.7
	服薬なし	99.0	98.4	97.6	96.3	95.6	94.2	93.1	94.3
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

⑥習慣的な喫煙者

習慣的に喫煙している者の割合は、いずれの年齢階級においても男性が女性より多かった。

男性は図 103-1、表 74-1 のとおり 40～45 歳では 30.9%で一番高く、年齢階級が上がるにしたがい減少し 70～74 歳では 15.2%であった。

女性は図 103-2、表 74-2 のとおり 45～49 歳は 14.6%であったが、年齢階級が上がるにしたがい減少し 70～74 歳では 3.4%であった。




図 103-1 習慣的に喫煙している者 市町村国保（男性）




図 103-2 習慣的に喫煙している者 市町村国保（女性）

表 74-1 習慣的に喫煙している者の割合 市町村国保（男性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数 人	非喫煙	3,120	4,178	4,461	4,655	7,645	25,479	52,206	101,744
	喫煙	1,394	1,850	1,971	1,855	2,679	6,598	9,345	25,692
	合計	4,514	6,028	6,432	6,510	10,324	32,077	61,551	127,436
割合 %	非喫煙	69.1	69.3	69.4	71.5	74.1	79.4	84.8	79.8
	喫煙	30.9	30.7	30.6	28.5	25.9	20.6	15.2	20.2
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 74-2 習慣的に喫煙している者の割合 市町村国保（女性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数 人	非喫煙	4,126	5,387	6,062	8,118	17,586	45,584	80,260	167,123
	喫煙	672	924	1,020	967	1,327	2,267	2,786	9,963
	合計	4,798	6,311	7,082	9,085	18,913	47,851	83,046	177,086
割合 %	非喫煙	86.0	85.4	85.6	89.4	93.0	95.3	96.6	94.4
	喫煙	14.0	14.6	14.4	10.6	7.0	4.7	3.4	5.6
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

⑦慢性腎臓病（受診勧奨群又は保健指導群）

慢性腎臓病該当（受診勧奨群又は保健指導群）の割合は、男性が図 104-1、表 75-1 のとおり 40～44 歳 17.3%、70～74 歳で 42.2%となった。女性は図 104-2、表 75-2 のとおり 40～44 歳 13.7%、70～74 歳で 32.9%となった。

慢性腎臓病の受診勧奨群の割合は男性 40～44 歳 4.5%、70～74 歳で 11.1%となった。女性では 40～44 歳 3.5%、70～74 歳で 5.5%となった。

慢性腎臓病の保健指導群（保健指導 1 及び 2）の割合は男性 40～44 歳 12.8%、70～74 歳で 31.1%となった。女性では 40～44 歳 10.2%、70～74 歳で 27.3%となった。




図 104-1 慢性腎臓病該当割合 市町村国保（男性）




図 104-2 慢性腎臓病該当割合 市町村国保（女性）

表 75-1 慢性腎臓病受診勧奨群又は保健指導群該当割合 市町村国保（男性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計	
人数 (人)	非該当	3,586	4,679	4,742	4,587	6,757	19,578	34,058	77,987	
	受診勧奨群	194	323	379	419	777	2,730	6,546	11,368	
	保健指導群	555	775	1,069	1,238	2,289	8,282	18,297	32,505	
	再掲	保健指導 1	467	566	694	683	980	3,007	5,877	12,274
		保健指導 2	88	209	375	555	1,309	5,275	12,420	20,231
	合計	4,335	5,777	6,190	6,244	9,823	30,590	58,901	121,860	
割合 (%)	非該当	82.7	81.0	76.6	73.5	68.8	64.0	57.8	64.0	
	受診勧奨群	4.5	5.6	6.1	6.7	7.9	8.9	11.1	9.3	
	保健指導群	12.8	13.4	17.3	19.8	23.3	27.1	31.1	26.7	
	再掲	保健指導 1	10.8	9.8	11.2	10.9	10.0	9.8	10.0	10.1
		保健指導 2	2.0	3.6	6.1	8.9	13.3	17.2	21.1	16.6
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	慢性腎臓病 該当	17.3	19.0	23.4	26.5	31.2	36.0	42.2	36.0	

表 75-2 慢性腎臓病受診勧奨群又は保健指導群該当割合 市町村国保（女性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計	
人数 (人)	非該当	3,937	5,050	5,706	7,068	14,144	33,803	53,784	123,492	
	受診勧奨群	158	218	231	275	595	1,806	4,433	7,716	
	保健指導群	466	765	863	1,390	3,382	10,336	21,901	39,103	
	再掲	保健指導 1	400	580	520	592	1,171	3,143	6,248	12,654
		保健指導 2	66	185	343	798	2,211	7,193	15,653	26,449
	合計	4,561	6,033	6,800	8,733	18,121	45,945	80,118	170,311	
割合 (%)	非該当	86.3	83.7	83.9	80.9	78.1	73.6	67.1	72.5	
	受診勧奨群	3.5	3.6	3.4	3.1	3.3	3.9	5.5	4.5	
	保健指導群	10.2	12.7	12.7	15.9	18.7	22.5	27.3	23.0	
	再掲	保健指導 1	8.8	9.6	7.6	6.8	6.5	6.8	7.8	7.4
		保健指導 2	1.4	3.1	5.0	9.1	12.2	15.7	19.5	15.5
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	慢性腎臓病 該当	13.7	16.3	16.1	19.1	21.9	26.4	32.9	27.5	