

# あわつと感染症情報 (2025-18)

・千葉県安房保健所発  
2025年 5 月 9 日配信

## ☆今 週 の ト ピ ッ ク ス☆

### 腸管出血性大腸菌感染症

気温の高いこれからの季節に注意しましょう！

2025 年第 17 週に県内医療機関から 3 例の届出があり、本年の累計は 23 例となりました。

第 17 週時点の届出数としては、本年は 2020 年以降で最多。また、一般的に気温が高い初夏から初秋は腸管出血性大腸菌の多発期であり、県内でも例年届出数が多くなる傾向があるため、これからの時期は特に注意が必要です。

腸管出血性大腸菌感染症の原因菌はベロ毒素(VT)を産生する大腸菌です。家畜等の腸管内に生息しており、糞便に汚染された食品や手指などを介して経口感染します。少ない菌数(100 個程度)で感染が成立するため、人から人への経路、または人から食材・食品への経路で感染が拡大しやすいです。

### 症状

- ☑軽度の下痢
- ☑激しい腹痛
- ☑頻回の水様便
- ☑著しい血便
- ☑微熱

★多くの場合、3 日間から 5 日間の潜伏期を経て、激しい腹痛を伴う頻回の水様便の後に血便となります。  
※無症状の場合もあります。

### 予防

手指を介した経口感染(人から人への感染)に対しては、手洗いが最も重要です。

排便後や食事前はもちろんのこと、特に下痢をしている乳幼児や高齢者の世話をする際には、使い捨て手袋を用い、作業後には石けんと流水でよく手を洗いましょう。少量の菌数で感染が成立するので、特に乳幼児や高齢者が集団生活を行う場合や家庭内などでは周囲の人への感染予防が重要です。

！ 腸管出血性大腸菌感染症は、3 類感染症です。  
診断した医師は、直ちに最寄りの保健所に発生届を提出する必要があります。

<参考> ・千葉県感染症情報センター(千葉県) <https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/>  
・腸管出血性大腸菌Q & A(厚生労働省) <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177609.html>

## ☆安 房 管 内 の 感 染 症 発 生 状 況☆

### 流行性角結膜炎

安房

県内

★安房管内における2025年第18週(令和7年4月28日～令和7年5月4日)の定点医療機関当たりの報告数は1.00人と前週2.00人と比べ、減少しました。

(県全体の報告数は0.88人と前週1.06人と比べ、減少)

<参考> ウイルス性結膜炎(日本眼科学会) <https://www.nichigan.or.jp/public/disease/name.html?pdid=14>  
流行性結膜炎(厚生労働省) <https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-30.html>

### インフルエンザ

安房

県内

★安房管内における2025年第18週(令和7年4月28日～令和7年5月4日)の定点医療機関あたりの報告数は0.33人と前週0.00人と比べ増加しました。

(県全体の報告数は0.74人と前週1.11人と比べ、減少)

<参考> インフルエンザから身を守ろう(千葉県) <https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/influenza/influenza-yobou.html>

## ❀ 安 房 管 内 の 全 数 届 出 疾 患 ❀

全数届出疾患:全ての医師の方は、対象の感染症の診断を行った際に、掲載の届出様式により最寄りの保健所に届け出る必要があります。

### <2 類感染症> ★結核 3件

結核は、結核菌によって発生するわが国の主要な感染症の一つです。

結核菌は主に肺の内部で増えるため、咳、痰、発熱、呼吸困難等、風邪のような症状を呈することが多いですが、肺以外の臓器が冒されることもあり、腎臓、リンパ節、骨、脳など身体のあらゆる部分に影響が及ぶことがあります。

特に、小児では症状が現れにくく、全身に及ぶ重篤な結核につながりやすいため、注意が必要です。

<参考>結核について(千葉県) [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou03/](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou03/)

### <4 類感染症>

#### ★つつが虫病 1件

つつが虫病は、つつが虫病原体を保有するツツガムシに刺されることで発症するダニ媒介感染症です。刺されると5～14日程の潜伏期間を経て発症します。主な症状は、発熱、発疹、刺し口にできる痂皮です。

#### ★日本紅斑熱 1件

日本紅斑熱リケッチアを保有するマダニに刺されることで感染するダニ媒介感染症です。

マダニに刺されてから、2日から8日程度の潜伏期間を経て発症します。主な症状は、発熱、発疹、マダニの刺し口にできる痂皮です。

<参考>・つつが虫病について(厚生労働省) <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173061.html>

・日本紅斑熱について(千葉県) <https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/eiseikenkyuu/virus/madani.html>

### <5 類感染症>

#### ★百日咳 1件

百日咳菌の感染によって、特有のけいれん性の激しい咳発作(痙攣発作 けいがいほっさ)を特徴とする急性の気道感染症です。

百日咳は世界的に見られる疾患で、いずれの年齢でもかかりますが、小児が中心となっています。母親からの免疫が十分でなく、乳児期早期から罹患する可能性があり、乳児(特に新生児や乳児期早期)では重症になり、肺炎、脳症を合併し、まれに死に至ることもあります。

<参考>・百日咳(厚生労働省)

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/whooping\\_cough.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/whooping_cough.html)

#### 【配信元】

千葉県安房保健所(安房健康福祉センター)

あわつと感染症情報

[awat-news@mz.pref.chiba.lg.jp](mailto:awat-news@mz.pref.chiba.lg.jp)