



# 衛生だより

## 鹿児島県・福岡県で 高病原性鳥インフルエンザ発生!

【国内39例目(12/18に確認)】

所在地:鹿児島県南九州市

飼養状況:採卵鶏(約3.5万羽)

【国内40例目(12/19に確認)】

所在地:福岡県糸島市

飼養状況:採卵鶏(約5.4万羽)

### 高病原性鳥インフルエンザ(香取市)に係る 移動制限区域解除のお知らせ

香取市で確認された高病原性鳥インフルエンザについて、移動制限区域(発生農場を中心とする半径3km以内)において異常が確認されなかったことから、**令和4年12月18日0時**をもって、移動制限区域を解除しました。  
※本事案においては、制限区域内に対象農場はありません。



**渡り鳥や野鳥の糞により農場敷地内にウイルスが残存する可能性を念頭に、鶏舎内へのウイルス侵入防止対策を徹底してください!**

#### 家きん飼養農場における防疫対策

- ①従業員等に、消毒、長靴交換等の重要性を説明し、適切な消毒、長靴の交換を再確認。
- ②農場敷地内や鶏舎周囲の消毒を毎日行う。消毒はため池等の水場を意識し、その近くはリスクが高いことから、徹底して消毒を行う。
- ③猫やイタチ等の小動物や野鳥等が農場内に近づかないよう対策を講じる。
- ④一見隙間がないように思われる鶏舎でも、飼養衛生管理者と鶏舎構造を熟知した者が連携し野生動物等が侵入しそうなルートを探し侵入防止対策を講じる。
- ⑤ウイルスを鶏舎内に持ち込まないよう衛生管理区域に入る際の適切なタイミングでの専用衣服の着用、鶏舎ごとの専用長靴の設置、手指消毒および長靴の消毒・交換等の適正な衛生管理が日常的になされているか再確認
- ⑥長靴の汚れを落としてから消毒し、消毒薬は汚れた都度、最低でも1日1回以上交換し、消毒薬が有効な状態での使用を徹底する。
- ⑦交差汚染防止のため鶏舎内外の長靴の動線が交わらないように注意する。

鶏の様子がおかしいと思ったら… 北部家畜保健衛生所へ

Tel.0478-54-1291 (夜間・休日は転送) 必ず5回以上コールしてください