

การป้องกันโรคลมแดด



หลีกเลี่ยงอากาศร้อน!

ควบคุมอุณหภูมิโดยใช้พัดลม
หรือเครื่องปรับอากาศเป็นระยะ



ใช้ม่านกันแสง ม่านไม้ไผ่ และ
การพรมน้ำ



การร่มกันแดดและสวมหมวก
เมื่อออกไปข้างนอก



วันที่อากาศห้องฟ้าแล่มใส่มีเดด
ออก ให้ใช้ร่มเงาและหยุดพัก
บ่อย ๆ



สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี
ดูดความชื้น และแห้งเร็ว



ทำให้ร่างกายเย็นลงโดยใช้เจล
ให้ความเย็น น้ำแข็ง และผ้า
ขนหนูเย็น เป็นต้น



**เมื่อมีการประกาศ "แจ้งเตือนโรคลมแดด" ขอให้หลีกเลี่ยงการออกไปข้าง
นอก และหลีกเลี่ยงอากาศร้อนเท่าที่จะเป็นไปได้**



ดื่มน้ำอยู่เสมอ!

ไม่ว่าจะอยู่ภายในห้องและเมื่อออกไปข้างนอก แม้ว่าจะไม่รู้สึกคอดแห้ง แต่ควรจิบ
น้ำอยู่เสมอในสภาพที่มีเหงื่อออกรากค่ารดีมั่งน้ำตาลเกลือแร่



● ข้อมูล / เว็บไซต์เพื่อการป้องกันโรคลมแดด

ข้อมูลเพื่อการป้องกันโรคลมแดด



สามารถเข้า
จากスマาร์ต
โฟนได้




https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/

"โรคลมแดด" หมายถึงสภาพที่น้ำและเกลือภายในร่างกายค่อยๆขาดความสมดุลจากการอุ่นในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงเป็นเวลานาน ทำให้การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเกิดปัญหาและมีความร้อนสะสมภายในร่างกาย ไม่เฉพาะกลางแจ้งเท่านั้นแต่เมื่อว่าคุณจะอยู่เยี่ยมๆ ในห้องก็อาจแสดงอาการและถูกนำส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินบางกรณีอาจเสียชีวิตได้

ควรหาความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลมแดดและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายรวมทั้งระดับรังสี UV และป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดปัญหาจากโรคลมแดด

อาการของโรคลมแดด



!**กรณีที่ปฐมพยาบาลลูกเจนแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ขอให้รีบเข้ารับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาล**

เมื่อพบผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรคลมแดด

(การปฐมพยาบาลลูกเจนที่จำเป็น)

ให้ไปยังสถานที่ที่มีอากาศเย็น เช่น ภายในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศอยู่หรือร่มเงาที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก



คลายเสื้อผ้าและทำให้ร่างกายเย็นลง
(โดยเฉพาะรอบลำคอ รักแร้ และขาหนีบ เป็นต้น)



ดีมน้ำเกลือ ผงน้ำตาลเกลือแร่*
เป็นตัน

*เครื่องดื่มที่ละลายเกลือและกูลูโคสไว้น้ำ



ตรวจสอบ!

กรณีที่ไม่สามารถดีมน้ำด้วยตัวเอง หรือมีการตอบสนองที่ผิดปกติ ควรเรียกรถพยาบาลทันที!



ข้อควรระวัง

แต่ละคนจะรู้สึกอ่อนแอกต่างกัน

สภาพร่างกายในวันนั้นๆ และความเคยชินกับอากาศร้อนจะส่งผลแตกต่างกันขอให้ระวังเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย

ต้องป้องกันโรคลมแดดแม้จะอยู่ภายนอกห้อง!

ถึงแม้จะไม่รู้สึกอ่อนก็ขอให้ใส่ใจดูอุณหภูมิภายในห้องหรือภายนอก และปรับอุณหภูมิโดยใช้พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ

ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการจะต้องระวังเป็นพิเศษ!

กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคลมแดดเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุมีการรับความรู้สึกที่ลดลงต่ออาการร้อนและการขาดน้ำ และการควบคุมความร้อนในร่างกายก็ลดลงเช่นกัน จึงจำเป็นต้องระวังจากนี้ สำหรับเด็กแล้ว ความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายยังไม่พัฒนาอย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องระวังเช่นกัน

ดีมน้ำอยู่เสมอ



กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ

ひと、くらし、みらいのために
Ministry of Health, Labour and Welfare