

のり海況速報 第2報 (30-2)

平成30年10月5日発行
 千葉県水産総合研究センター
 東京湾漁業研究所
 千葉県農林水産技術会議

資料 のり海況調査 10/3：内湾(ふさなみ)、内房北部(ふさみ丸)
 関東・東海海況速報(10/3) 自動観測ブイデータ (10/3)
 モニタリングポスト(10/3：国交省関東地方整備局)

【水温・塩分の状況】

- ・内湾の表層水温は21.5～23.6℃、塩分は19.0～31.0でした(図1)。
- ・内房北部(浦賀水道2番ブイ調査点以北)の表層水温は22.1～23.2℃、塩分は27.0～32.4でした(図1)。
- ・富津地区のり漁場への、沖合水の強い波及はみられませんでした(図1,2)。




図1 表層の水温・塩分(平成30年10月3日)




図2 縦断面の水温・塩分の鉛直分布(平成30年10月3日)
 上：内湾(縦断面)、下：内房北部(グラフ)、右：調査ライン

【赤潮・栄養塩の状況】

- ・赤潮（酸素飽和度 150 %以上、透明度 1.5 m 以下、pH8.5 以上）は確認されませんでした。
- ・内湾及び内房北部のプランクトン優占種は珪藻キートセロス、スケルトネマ、透明度は 0.7～4.1 m でした。
- ・内湾及び内房北部の栄養塩は窒素が 104～1092 $\mu\text{g/L}$ 、リンが 15～79 $\mu\text{g/L}$ でした（図 3）。
- ・のり漁場では、窒素、リンともにノリの色調の保持や健全な生育に必要なレベルを上回りました。




図 3 表層の栄養塩濃度の分布(平成 30 年 10 月 3 日)

(参考)

高色調のノリの生産に必要なレベル 窒素 110 $\mu\text{g/L}$ リン 8 $\mu\text{g/L}$
 ノリの色調の保持や健全な生育に必要なレベル 窒素 90 $\mu\text{g/L}$ リン 5 $\mu\text{g/L}$

川養殖場水温予報のお知らせ

今年も、各川養殖場(三番瀬, 盤洲北部, 盤洲南部, 富津岬北, 富津岬南)について、5日先まで表層水温を予報します。パソコンまたは携帯の検索サイトで”川養殖場水温予報”で検索するか、下記アドレスを直接入力してご覧ください。

パソコン: http://www.pref.chiba.lg.jp/pbcbsuishi/cbtk/04tk-yohou/main_frame.html

携帯: http://www.pref.chiba.lg.jp/pbcbsuishi/cbtk/04tk-yohou/mobile_forecast.html