

対象疾病 (ワクチン)		[接種方法] 対象年齢	[接種方法] 標準的接種年齢	[接種方法] 回数
ロタウイルス感染症	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(ロタリックス)	令和2(2020)年8月1日以後に生まれた、次のアとイに該当する者(使用するワクチンによって、対象者・回数・接種量が違うので注意する) ア 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合:出生6週0日後～24週0日後	生後2月～ 出生14週6日後	アを使用する場合2回
	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン(ロタテック)	イ 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用する場合:出生6週0日後～32週0日後		イを使用する場合3回
1期 ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・Hib感染症(5種混合)	1期初回	生後2月～90月未満	生後2月～7月	3回
	1期追加	生後2月～90月未満 (1期初回接種3回終了後、6月以上の間隔をおく)	1期初回接種3回終了後6月～18月の間	1回
2期 ジフテリア・破傷風(2種混合)	2期	11歳以上13歳未満	11歳～12歳	1回
麻しん・風しん(MR)	1期	生後12月～24月未満		1回
	2期	5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前から当該始期に達する日の前日までの間にある者。		1回
日本脳炎	1期初回	生後6月～90月未満	3歳	2回
	1期追加	生後6月～90月未満(1期初回接種終了後おおむね1年おく)	4歳	1回
	2期	9歳～13歳未満	9歳	1回
	その他	特例1)平成7年4月2日～平成19年4月1日に生まれた者。 特例2)平成19年4月2日～平成21年10月1日に生まれた者。		必要な回数
小児肺炎球菌感染症	初回	生後2月～60月未満	初回接種開始 生後2月～7月未満	3回(標準的接種)
	追加	生後2月～60月未満(初回終了後60日以上の間隔をおく)	生後12月～15月未満	1回
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)		小学6年生～高校1年生相当の女子	中学1年生	2回または3回 (使用するワクチン及び接種開始年齢により異なる。)
水痘		生後12月～36月未満	1回目:生後12月～15月未満	2回
B型肝炎 (母子感染予防の場合は定期接種としてではなく、健康保険で受けます。)		1歳未満 (平成28年4月1日以降生まれた者が対象)	生後2月～9月未満	3回