

令和7年8月8日
健康福祉部疾病対策課
043-223-2574

麻しん（はしか）患者の発生について

県内で麻しん患者の発生が確認され、当該患者の疫学調査を行った結果、他の人に麻しんを感染させてしまう可能性がある期間（感染可能期間）に、不特定多数の方が利用する施設等を利用していたことが判明しましたので、お知らせします。

現在、県内で麻しんの患者が増えていますので、予防接種の実施等感染予防に努めてください。

【事例①】

1 感染可能期間（発症日前日の7月31日以降）に患者が利用した施設等

利用日	時間帯	利用した施設等
7月31日（木）	午前7時45分頃～55分頃	芝山鉄道・京成東成田線 芝山千代田駅～京成成田駅
	午後0時40分頃～午後2時20分頃	イオンタウン成田富里
8月2日（土）	午前11時頃～午後0時30分頃	サイゼリヤ 成田郷部店
	午後2時頃～午後3時頃	アピナ印西店
8月4日（月）	午後0時30分頃～午後1時30分頃	ガスト 千葉多古町店

※ 各施設等へのお問合せは、御遠慮くださいますようお願いいたします。

※ 現在、上記の施設等を利用しても感染の恐れはありません。

※ 接触者が特定できておらず、不特定多数の接触者がいる可能性がある施設については、広く情報提供するため、施設名や公共交通機関等を公表しています。

2 患者の概要

（1） 基本情報：20代・男性、多古町在住 麻しん予防接種歴1回

（2） 症状：発熱（37.4℃）、咳、鼻汁、コプリック斑、発しん

（3） 経過等

日付	患者発生の経過等
8月1日	発症（発熱）、咳、鼻水
8月4日	香取保健所管内医療機関受診
8月5日	香取保健所管内医療機関受診 麻しんの診断、届出、検体（尿、咽頭ぬぐい液、血液）採取
8月6日	県衛生研究所の遺伝子検査の結果、陽性

※ 行動歴調査等から、特定された接触者については個別に対応を行っています。

※ 当該患者につきましては現在快方に向かっています。

【事例②】

1 感染可能期間（発症日前日の8月2日以降）に患者が利用した施設等

利用日	時間帯	利用した施設等
8月2日（土）	午前11時頃～午後0時30分頃	サイゼリヤ 成田郷部店
	午後2時頃～午後3時頃	アピナ印西店
8月4日（月）	午後0時30分頃～午後1時30分頃	ガスト 千葉多古町店

※ 各施設等へのお問合せは、御遠慮くださいますようお願いします。

※ 現在、上記の施設等を利用しても感染の恐れはありません。

※ 接触者が特定できておらず、不特定多数の接触者がいる可能性がある施設については、広く情報提供するため、施設名等を公表しています。

2 患者の概要

（1） 基本情報：20代・男性、多古町在住 麻しん予防接種歴2回

（2） 症状：発熱（38℃）、咳、結膜充血、発しん

（3） 経過等

日付	患者発生の経過等
8月3日	発症（発熱）、鼻汁、咳
8月4日	香取保健所管内医療機関受診 香取保健所管内薬局を利用
8月5日	香取保健所管内医療機関受診
8月6日	香取保健所管内医療機関受診 検体（尿、咽頭ぬぐい液、血液）採取
8月7日	県衛生研究所の遺伝子検査の結果、陽性 麻しんの診断、届出

※ 行動歴調査等から、特定された接触者については個別に対応を行っています。

※ 当該患者につきましては現在快方に向かっています。

県民のみなさまへ

- ・ 麻しんの感染力は非常に強いので、同じ時間帯に利用された方で、利用後21日以内（特に10日前後）に発熱や発しん等、麻しんを疑うような症状が現れた場合は、事前に最寄りの保健所に電話連絡し、指示に従い、医療機関を受診してください。
- ・ 受診の際は、周囲への感染を広げないよう、公共交通機関等の利用を避けるようにしてください。
- ・ なお、海外からの帰国後に麻しんと診断される方が増えています。海外旅行等で流行地へ渡航される場合は、ご自身の過去の罹患歴や予防接種歴を確認していただき、必要な検査や事前に予防接種を受けていただくことをご検討ください。

医療機関のみなさまへ

- ・ 今年に入り、麻しんの感染者が全国的に報告されています。麻しんを疑う患者が受診した場合は、予防接種歴の確認や院内感染対策の実施など、麻しんを意識した診療を行うとともに、届出に必要な要件を満たすと診断した場合は、速やかに最寄りの保健所に届出をお願いします。

(参考)

- 厚生労働省 麻疹について

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-ka-nsenshou/measles/index.html

- 国立健康危機管理研究機構 麻疹 発生動向調査

<https://id-info.jih.go.jp/relevant/vaccine/measles/O60/measlesdoko.html>

- 千葉県 麻疹（はしか）にご注意!

<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/mashin.html>

- 千葉県感染症情報センターホームページ

<https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/>

【参考】

麻疹（はしか）について

1 症状

- ・ 感染すると通常 10 日から 12 日後に 38℃前後の発熱、咳、鼻汁、くしゃみ、結膜充血などが約 2 日から 4 日間続き、解熱後、再び 39℃以上の高熱と発しんが出現します。
- ・ 肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者 1,000 人に 1 人の割合で脳炎が発症すると言われており、死亡する割合も、先進国であっても 1,000 人に 1 人と言われています。

2 感染経路

- ・ 麻疹は麻疹ウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症です。
- ・ 麻疹ウイルスの主たる感染経路は空気感染で、その感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ 100%発症すると言われています。
- ・ また、発症した人が周囲に感染させる期間（感染可能期間）は、症状が出現する 1 日前から解熱後 3 日間まで（全経過を通じて発熱がみられなかった場合、発しん出現後 5 日間まで）といわれています。

3 潜伏期間

約 10 日～12 日間（最長 21 日間程度になる場合もあります。）

4 治療

特異的な根治療法はなく、対症療法を行う

5 予防

- ・ 麻疹は感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。
- ・ 麻疹の予防には予防接種が最も有効です。2 回の定期接種を必ず受けましょう。
- ・ 麻疹を発症した場合、学校や職場等で感染を拡大させる恐れがあるため、母子手帳などで予防接種歴を確認し、定期予防接種を 2 回受けていない方や予防接種歴が不明な方は、かかりつけ医などに相談の上、接種を検討しましょう。

6 県内の発生状況（麻疹届出数）

年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
千葉県	25	3	26	26	0	0	0	1	1	21*
全国	165	186	279	744	10	6	6	28	45	191*

*千葉県の 2025 年は 8 月 7 日までの届出数

*全国の 2025 年は国の感染症発生動向調査第 30 週（7 月 21 日～27 日）までの速報値