

248. 主要死因別

死 因	昭和45年	46年	47年	48年	49年	昭和50年		%
						総数	総数に対する死亡割合	
総 数	21 051	20 613	20 295	21 536	21 768	21 768		100.0
1 コレラ	-	-	-	-	-	-	-	-
2 腸チフス	1	-	-	-	-	-	-	-
3 細菌性赤痢	1	1	1	1	-	1		0.0
4 腸炎	128	151	127	118	112	78		0.4
5 呼吸器系その他	320	283	278	243	293	225		1.0
6 その他結核(後遺症を含む)	25	17	15	15	19	10		0.0
7 トブア	-	-	-	-	-	-	-	-
8 フステリ	-	-	1	-	-	1		0.0
9 百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-
10 レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	-	-	-	-	-	-	-	-
11 髄膜炎	-	-	-	-	1	-		-
12 急性性灰白髄炎	-	-	-	1	1	-		-
13 痘疹	-	-	-	-	-	-	-	-
14 麻疹	18	5	14	16	8	2		0.0
15 チフスおよびその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-	-	-
16 マラリア	-	-	-	-	-	-	-	-
17 梅毒	16	19	9	13	9	13		0.1
18 その他伝染病および寄生虫病	69	75	78	71	76	66		0.3
19 悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)	3 283	3 476	3 749	3 867	4 021	4 063		18.7
20 良性的および性質不詳の新生物	149	177	190	204	187	205		0.9
21 糖尿病	201	221	231	238	288	241		1.1
22 ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	23	16	22	24	15	20		0.1
23 貧血	33	44	41	56	59	49		0.2
24 髄膜炎	31	21	25	33	36	24		0.1
25 活動性リウマチ	17	16	8	12	12	11		0.1
26 慢性リウマチ性心疾患	128	103	103	97	126	97		0.4
27 虚血性心疾患	1 090	1 051	1 054	1 236	1 217	1 293		5.9
28 その他高血圧性心疾患	1 435	1 319	1 286	1 519	1 503	1 631		7.5
29 高血圧性心疾患	616	636	613	683	697	721		3.3
30 脳血管疾患	5 400	5 351	5 132	5 379	5 556	5 332		24.5
31 イソルエン	176	24	13	82	35	54		0.2
32 肺炎	873	754	655	795	830	929		4.3
33 気管支炎, 肺気腫	435	413	339	384	414	430		2.0
34 消化性潰瘍	250	240	262	214	243	238		1.1
35 虫垂炎	20	13	12	18	5	10		0.0
36 腸閉塞	88	71	85	64	85	84		0.4
37 肝硬変	260	317	265	310	350	353		1.6
38 腎炎	253	215	212	208	188	197		0.9
39 前立腺肥大	18	18	26	16	26	22		0.1
40 流産	1	2	1	-	1	-		-
41 その他の妊娠, 分娩, 産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	30	30	34	30	23	19		0.1
42 先天性異常	194	224	185	242	220	233		1.1
43 出生時損傷, 難産およびその他の無酸素症, 低酸素症	122	137	153	121	119	118		0.5
44 その他胎産期の死因	353	347	293	329	279	256		1.2
45 症状およびその他の診断名不明確の状態	1 680	1 592	1 493	1 570	1 459	1 452		6.7
46 その他すべての疾患	1 373	1 304	1 305	1 383	1 409	1 451		6.7
47 自動車事故	840	806	797	775	672	585		2.7
48 その他不慮の事故	625	658	622	597	578	564		2.6
49 自殺	403	404	500	503	531	590		2.7
50 その他外因	73	62	66	69	65	100		0.5
51 新生児の感染	-	-	-	-	-	-		-
52 その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-		-

