

74 牛車腎氣丸

[成分・分量]

地黄5-8、山茱萸2-4、山藥3-4、沢瀉3、茯苓3-4、牡丹皮3、桂皮1-2、加工ブシ0.5-1、牛膝2-3、車前子2-3

[用法・用量]

(1) 散: 1回2g 1日3回

(2) 湯

[効能・効果]

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)

75 吳茱萸湯

[成分・分量]

吳茱萸3-4、大棗2-4、人参2-3、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合4-6)

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するものの次の諸頭痛、頭痛に伴うはきけ・嘔吐、しゃっくり

76 五物解毒散

[成分・分量]

川芎5、金銀花2、十葉2、大黃1、荆芥1.5

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

体力中等度以上のものの次の諸症  
かゆみ、湿疹・皮膚炎

77 五淋散

[成分・分量]

茯苓5-6、当帰3、黄芩3、甘草3、芍藥1-2、山梔子1-2、地黄3、沢瀉3、木通3、滑石3、車前子3(地黄以下のない場合も可)

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

体力中等度のものの次の諸症  
頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり

- 78 五苓散
- 〔成分・分量〕 沢瀉4-6、猪苓3-4.5、茯苓3-4.5、蒼朮3-4.5(白朮も可)、桂皮2-3
- 〔用法・用量〕  
(1) 散: 1回1-2g 1日3回  
(2) 湯
- 〔効能・効果〕  
体力に関わらず使用でき、のどが渴いて尿量が少ないので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症  
水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹<sup>注</sup>)のものには使用しないこと)、暑氣あたり、頭痛、むくみ、二日酔
- 《備考》  
注)しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。  
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 79 柴陷湯
- 〔成分・分量〕 柴胡5-8、半夏5-8、黃芩3、大棗3、人参2-3、甘草1.5-3、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、桔梗仁3、黃連1-1.5
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕  
体力中等度以上で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振で口が苦く、舌に白苔がつき、強いせきが出てたんが切れにくく、ときに胸痛があるものの次の諸症  
せき、胸痛、気管支炎
- 80 柴胡加竜骨牡蛎湯
- 〔成分・分量〕 柴胡5、半夏4、茯苓3、桂皮3、大棗2.5、人参2.5、竜骨2.5、牡蛎2.5、生姜0.5-1、大黃1、黃芩2.5、甘草2以内(大黃、黃芩、甘草のない場合も可)
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕  
体力中等度以上で、精神不安があって、動悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症  
高血圧の随伴症状(動悸、不安、不眠)、神経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘
- 81 柴胡桂枝乾姜湯
- 〔成分・分量〕 柴胡6-8、桂皮3、桔梗根3-4、黃芩3、牡蛎3、乾姜2、甘草2
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕  
体力中等度以下で、冷え症、貧血氣味、神経過敏で、動悸、息切れ、ときにねあせ、頭部の発汗、口の乾きがあるものの次の諸症  
更年期障害、血の道症<sup>注</sup>、不眠症、神経症、動悸、息切れ、かぜの後期の症状、気管支炎
- 《備考》  
注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。  
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

- 82 柴胡桂枝湯
- [成分・分量]
- 柴胡4-5、半夏4、桂皮1.5-2.5、芍薬1.5-2.5、黃芩1.5-2、人参1.5-2、大棗1.5-2、甘草1-1.5、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2)
- [用法・用量]
- 湯
- [効能・効果]
- 体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒氣・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症  
胃腸炎、かぜの中期から後期の症状
- 83 柴胡清肝湯
- [成分・分量]
- 湯:柴胡2、当帰1.5、芍薬1.5、川芎1.5、地黄1.5、黃連1.5、黃芩1.5、黃柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5、桔梗1.5、牛蒡子1.5、栝樓根1.5、薄荷葉1.5、甘草1.5  
散:柴胡2、他の生薬はすべて2.5
- [用法・用量]
- (1)散:1回2g 1日3回  
(2)湯
- [効能・効果]
- 体力中等度で、疳の強い傾向(神經過敏)にあるものの次の諸症  
神經症、慢性扁桃炎、湿疹・皮膚炎、虚弱児の体質改善
- 84 柴芍六君子湯
- [成分・分量]
- 人参3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、半夏4、陳皮2-3、大棗2、甘草1-2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-2)、柴胡3-4、芍薬3-4
- [用法・用量]
- 湯
- [効能・効果]
- 体力中等度以下で、神經質であり、胃腸が弱くみぞおちがつかえ、食欲不振、腹痛、貧血、冷え症の傾向のあるものの次の諸症  
胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐、神經性胃炎
- 85 柴朴湯
- [成分・分量]
- 柴胡7、半夏5-8、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合3-4)、黃芩3、大棗3、人参3、甘草2、茯苓4-5、厚朴3、蘇葉2-3
- [用法・用量]
- 湯
- [効能・効果]
- 体力中等度で、気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、かぜをひきやすく、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴うものの次の諸症  
小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、せき、不安神經症、虚弱体質

- 86 柴苓湯
- 〔成分・分量〕 柴胡4-7、半夏4-5、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3-4)、黄芩2.5-3、大棗2.5-3、人参2.5-3、甘草2-2.5、沢瀉4-6、猪苓2.5-4.5、茯苓2.5-4.5、白朮2.5-4.5(蒼朮も可)、桂皮2-3
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度で、のどが渴いて尿量が少なく、ときにはきけ、食欲不振、むくみなどを伴うものの次の諸症  
水様性下痢、急性胃腸炎、暑氣あたり、むくみ
- 87 左突膏
- 〔成分・分量〕 松脂800、黃蠅220、豚脂58、ゴマ油1000
- 〔用法・用量〕 外用
- 〔効能・効果〕 化膿性のはれもの
- 88 三黃散
- 〔成分・分量〕 大黃1-2、黄芩1、黄連1
- 〔用法・用量〕 散:1回0.8g 1日3回
- 〔効能・効果〕 体力中等度以上で、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘傾向などのあるものの次の諸症  
高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安)、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症注)
- 《備考》 注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。  
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 89 三黃瀉心湯
- 〔成分・分量〕 大黃1-5、黄芩1-4、黄連1-4
- 〔用法・用量〕 湯:(振り出しの場合1/3量を用いる)
- 〔効能・効果〕 体力中等度以上で、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘傾向などのあるものの次の諸症  
高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安)、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症注)
- 《備考》 注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである  
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

- 90 酸棗仁湯
- 〔成分・分量〕 酸棗仁10-18、知母2-3、川芎2-3、茯苓2-5、甘草1
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの次の諸症  
不眠症、神経症
- 91 三物黃芩湯
- 〔成分・分量〕 黃芩1.5-3、苦參3、地黃6
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度又はやや虛弱で、手足のほてりがあるものの次の諸症  
湿疹・皮膚炎、手足のあれ(手足の湿疹・皮膚炎)、不眠
- 92 滋陰降火湯
- 〔成分・分量〕 当帰2.5、芍藥2.5、地黃2.5、天門冬2.5、麥門冬2.5、陳皮2.5、白朮あるいは蒼朮3、知母1-1.5、黃柏1-1.5、甘草1-1.5、大棗1、生姜1 (大棗、生姜はなくても可)
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虛弱で、のどにうるおいがなく、たんが切れにくくてせきこみ、皮膚が浅黒く乾燥し、便秘傾向のあるものの次の諸症  
気管支炎、せき
- 93 滋陰至宝湯
- 〔成分・分量〕 当帰2-3、芍藥2-3、白朮あるいは蒼朮2-3、茯苓2-3、陳皮2-3、柴胡1-3、知母2-3、香附子2-3、地骨皮2-3、麥門冬2-3、貝母1-2、薄荷葉1、甘草1
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虛弱なものの次の諸症  
慢性のせき、たん、気管支炎
- 94 紫雲膏
- 〔成分・分量〕 紫根100-120、当帰60-100、豚脂20-30、黃蠅300-400、ゴマ油1,000
- 〔用法・用量〕 外用
- 〔効能・効果〕 ひび、あかぎれ、しもやけ、魚の目、あせも、ただれ、外傷、火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷、湿疹・皮膚炎

- 95 四逆散
- 〔成分・分量〕 柴胡2-5、芍薬2-4、枳実2、甘草1-2
- 〔用法・用量〕  
(1) 散: 1回2-2.5g 1日3回  
(2) 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以上で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに不安、不眠などがあるものの次の諸症  
胃炎、胃痛、腹痛、神経症
- 96 四君子湯
- 〔成分・分量〕 人参3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓4、甘草1-2、生姜0.5-1、大棗1-2
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虚弱で、瘦せて顔色が悪くて、食欲がなく、疲れやすいものの次の諸症  
胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢、夜尿症
- 97 滋血潤腸湯
- 〔成分・分量〕 当帰4、地黄4、桃仁4、芍薬3、枳実2-3、薑2-3、大黃1-3、紅花1
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、皮膚にうるおいがないものの次の諸症  
便秘、のぼせ、肩こり
- 98 七物降下湯
- 〔成分・分量〕 当帰3-5、芍薬3-5、川芎3-5、地黄3-5、釣藤鈎3-4、黃耆2-3、黃柏2
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、顔色が悪くて疲れやすく、胃腸障害のないものの次の諸症  
高血圧に伴う随伴症状(のぼせ、肩こり、耳鳴り、頭重)
- 99 柿蒂湯
- 〔成分・分量〕 丁子1-1.5、柿蒂5、ヒネショウガ4(生姜を使用する場合1)
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 しゃっくり
- 《備考》  
注) 体力に関わらず、使用できる。  
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

100 四物湯

[成分・分量]

当帰3-5、芍薬3-5、川芎3-5、地黃3-5

[用法・用量]

(1) 散: 1回1.5-2g 1日3回

(2) 湯

[効能・効果]

体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体质で胃腸障害のないものの次の月経不順、月経異常、更年期障害、血の道症<sup>注)</sup>、冷え症、しもやけ、しみ、貧血、産後あるいは流産後の疲労回復

《備考》

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

101 炙甘草湯

[成分・分量]

炙甘草3-4、生姜0.8-1(ヒネショウガを使用する場合3)、桂皮3、麻子仁3-4、大棗3-7.5、人参2-3、地黃4-6、麥門冬5-6、阿膠2-3

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

体力中等度以下で、疲れやすく、ときに手足のほてりなどがあるものの次の諸症  
動悸、息切れ、脈のみだれ

102 芍薬甘草湯

[成分・分量]

芍薬3-8、甘草3-8

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症  
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

103 鶴鵠菜湯(三味鶴鵠菜湯)

[成分・分量]

海人草3-5、大黃1-1.5、甘草1-2

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

回虫の駆除

《備考》

注) 体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

- 104 蛇床子湯
- [成分・分量] 蛇床子10、当帰10、威靈仙10、苦參10
- [用法・用量] 水1,000mLを加えて濃縮し700mLとし外用する
- [効能・効果] ただれ、かゆみ、たむし
- 105 十全大補湯
- [成分・分量] 人参2.5-3、黃耆2、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、当帰3-4、芍藥3、地黃3-4、川芎3、桂皮2-3、甘草1-2
- [用法・用量] 湯(原則として)
- [効能・効果] 体力虚弱なものの次の諸症  
病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血
- 106 十味敗毒湯
- [成分・分量] 柴胡2.5-3.5、桜皮(樸樹)2.5-3.5、桔梗2.5-3.5、川芎2.5-3.5、茯苓2.5-4、獨活1.5-3、防風1.5-3.5、甘草1-2、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)、荊芥1-2、連翹2-3(連翹のない場合も可)
- [用法・用量] (1) 散: 1回1.5-2g 1日3回  
(2) 湯
- [効能・効果] 体力中等度なものの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症  
化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫
- 107 潤腸湯
- [成分・分量] 当帰3-4、熟地黃・乾地黃 各3-4(又は地黃6)、麻子仁2、桃仁2、杏仁2、枳實0.5-2、黃芩2、厚朴2、大黃1-3、甘草1-1.5
- [用法・用量] (1) 散: 1回2-3g 1日3回  
(2) 湯: 上記量を1日量
- [効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱で、ときに皮膚乾燥などがあるものの次の症状  
便秘
- 108 蒸眼一方
- [成分・分量] 白礬(明礬)2、甘草2、黃連2、黃柏2、紅花2
- [用法・用量] 各生薬を混合後、水300mLを加え煎じて200mLとする。洗眼又は温湿布する。
- [効能・効果] ものもらい、ただれ目、はやり目

109 生姜瀉心湯

[成分・分量]

半夏3.6-8、人参1.8-4、黄芩1.8-4、甘草1.8-4、大棗1.8-4、黃連0.6-1、乾姜0.6-2、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合2-4)

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、はきけやげっぷを伴うものの次の諸  
食欲不振、胸やけ、はきけ、嘔吐、下痢、胃腸炎、口臭

110 小建中湯

[成分・分量]

桂皮3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、大棗3-4、芍藥6、甘草2-3、膠  
飴20(マルツエキス、滋養糖可、水飴の場合40)

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

体力虚弱で、疲労しやすく腹痛があり、血色がすぐれず、ときに動悸、手足のほてり、  
冷え、ねあせ、鼻血、頻尿および多尿などを伴うものの次の諸症  
小児虚弱体質、疲労倦怠、慢性胃腸炎、腹痛、神経質、小児夜尿症、夜泣き

111 小柴胡湯

[成分・分量]

柴胡5-8、半夏3.5-8、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合3-4)、黄芩2.5-3、大棗  
2.5-3、人参2.5-3、甘草1-3

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

体力中等度で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の  
苦味があり、舌に白苔がつくものの次の諸症  
食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状

112 小柴胡湯加桔梗石膏

[成分・分量]

柴胡7、半夏5、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合4)、黄芩3、大棗3、人参3、甘  
草2、桔梗3、石膏10

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

比較的体力があり、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口  
の苦味があり、舌に白苔がつき、のどがはれて痛むものの次の諸症  
のどの痛み、扁桃炎、扁桃周囲炎

113 小承氣湯

[成分・分量]

大黄2-4、枳実2-4、厚朴2-3

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

比較的体力があり、腹部が張って膨満し、ときに発熱するものの次の症状  
便秘

- 114 小青竜湯
- 〔成分・分量〕 麻黄2-3.5、芍薬2-3.5、乾姜2-3.5、甘草2-3.5、桂皮2-3.5、細辛2-3.5、五味子1-3、半夏3-8
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るもの次の  
気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症
- 115 小青竜湯加杏仁石膏(小青竜湯合麻杏甘石湯)
- 〔成分・分量〕 麻黄2-4、芍薬2-3、乾姜2-3、甘草2-3、桂皮2-3、細辛2-3、五味子1.5-3、半夏3-6、杏仁4、石膏5-10
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度で、せきが出て、のどの渴きがあるものの次の諸症  
気管支ぜんそく、小児ぜんそく、せき
- 116 小青竜湯加石膏
- 〔成分・分量〕 麻黄3、芍薬3、乾姜2-3、甘草2-3、桂皮3、細辛2-3、五味子2-3、半夏6-8、石膏2-5
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出て、のどの渴きがあるものの  
次の諸症  
気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒
- 117 椒梅湯
- 〔成分・分量〕 烏梅2、山椒2、檳榔子2、枳実2、木香2、縮砂2、香附子2、桂皮2、川棟子2、厚朴2、甘草2、乾姜2
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 回虫の駆除
- 《備考》 注)体力に関わらず、使用できる。  
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注  
意〉として記載する。】
- 118 小半夏加茯苓湯
- 〔成分・分量〕 半夏5-8、ヒネショウガ5-8(生姜を用いる場合1.5-3)、茯苓3-8
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、恶心があり、ときに嘔吐するものの次の諸症  
つわり、嘔吐、恶心、胃炎

119 消風散

〔成分・分量〕

当帰3、知母1-2、地黄3、胡麻1-1.5、石膏3-5、蝉退1-1.5、防風2、苦参1-1.5、蒼朮2-3(白朮も可)、荊芥1-2、木通2-5、甘草1-1.5、牛蒡子2

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度以上人の皮膚疾患で、かゆみが強くて分泌物が多く、ときに局所の熱感があるものの次の諸症

湿疹・皮膚炎、じんましん、水虫、あせも

120 升麻葛根湯

〔成分・分量〕

葛根5-6、升麻1-3、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、芍薬3、甘草1.5-3

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度で、頭痛、発熱、悪寒などがあるものの次の諸症  
感冒の初期、湿疹・皮膚炎

121 逍遙散(八味逍遙散)

〔成分・分量〕

当帰3-4.5、芍薬3-4.5、柴胡3-4.5、白朮3-4.5(蒼朮も可)、茯苓3-4.5、甘草1.5-3、生姜0.5-1、薄荷葉1-2.1

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、肩がこり、疲れやすく精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症

冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症<sup>注)</sup>、不眠症、神経症

《備考》

注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、(効能・効果に関する注意)として記載する。】

122 四苓湯

〔成分・分量〕

沢瀉4、茯苓4、蒼朮4(白朮も可)、猪苓4

〔用法・用量〕

(1) 散:1回1-1.5g 1日2-3回

(2) 湯

〔効能・効果〕

体力に関わらず使用でき、のどが渴いて水を飲んでも尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、むくみなどのいずれかを伴うものの次の諸症

暑気あたり、急性胃腸炎、むくみ

- 123 辛夷清肺湯
- 〔成分・分量〕 辛夷2-3、知母3、百合3、黃芩3、山梔子1.5-3、麥門冬5-6、石膏5-6、升麻1-1.5、枇杷葉1-3
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症  
鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症(副鼻腔炎)
- 124 秦艽羌活湯
- 〔成分・分量〕 秦艽3、羌活5、黃耆3、防風2、升麻1.5、甘草1.5、麻黃1.5、柴胡1.5、藁本0.5、細辛0.5、紅花0.5
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度なものの次の症状  
かゆみのある痔疾
- 125 秦艽防風湯
- 〔成分・分量〕 秦艽2、沢瀉2、陳皮2、柴胡2、防風2、当帰3、蒼朮3、甘草1、黃柏1、升麻1、大黃1、桃仁3、紅花1
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度で、便秘傾向があるものの次の症状  
痔核で排便痛のあるもの
- 126 參蘇飲
- 〔成分・分量〕 蘇葉1-3、枳実1-3、桔梗2-3、陳皮2-3、葛根2-6、前胡2-6、半夏3、茯苓3、人参1.5-2、大棗1.5-2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1.5-3、生姜の替わりに乾姜も可)、木香1-1.5、甘草1-2(木香はなくても可)
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症  
感冒、せき
- 127 神秘湯
- 〔成分・分量〕 麻黃3-5、杏仁4、厚朴3、陳皮2-3、甘草2、柴胡2-4、蘇葉1.5-3
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度で、せき、喘鳴、息苦しさがあり、たんが少ないものの次の諸症  
小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎

- 128 参苓白朮散
- [成分・分量]  
人参1.5-3、山茱1.2-4、白朮1.5-4、茯苓1.5-4、薏苡仁0.8-8、扁豆1-4、蓮肉0.8-4、桔梗0.8-2.5、縮砂0.8-2、甘草0.8-2
- [用法・用量]  
(1) 散: 1回1.5~2g 1日3回  
(2) 湯
- [効能・効果]  
体力虚弱で、胃腸が弱く、瘦せて顔色が悪く、食欲がなく下痢が続く傾向があるものの次の諸症  
食欲不振、慢性下痢、病後の体力低下、疲労倦怠、消化不良、慢性胃腸炎
- 129 清肌安蛔湯
- [成分・分量]  
柴胡6-7、半夏5-6、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、人参3、黃芩3、甘草2、海人草3、麦門冬3
- [用法・用量]  
湯
- [効能・効果]  
体力中等度で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の症状  
回虫の駆除
- 130 清湿化痰湯
- [成分・分量]  
天南星3、黃芩3、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、半夏3-4、茯苓3-4、蒼朮3-4(白朮も可)、陳皮2-3、羌活1.5-3、白芷1.5-3、白芥子1.5-3、甘草1-1.5
- [用法・用量]  
湯
- [効能・効果]  
体力中等度以下で、背中に冷感があり痛みがあるものの次の諸症  
神經痛、関節痛、筋肉痛
- 131 清上蠲痛湯(驅風触痛湯)
- [成分・分量]  
麦門冬2.5-6、黃芩3-5、羌活2.5-3、独活2.5-3、防風2.5-3、蒼朮2.5-3(白朮も可)、当帰2.5-3、川芎2.5-3、白芷2.5-3、蔓荊子1.5-2、細辛1、甘草1、藁本1.5、菊花1.5-2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1.5-2.5)(藁本、菊花、生姜はなくても可)
- [用法・用量]  
湯
- [効能・効果]  
体力に関わらず使用でき、慢性化した痛みのあるものの次の諸症  
顔面痛、頭痛
- 132 清上防風湯
- [成分・分量]  
荊芥1-1.5、黃連1-1.5、薄荷葉1-1.5、枳実1-1.5、甘草1-1.5、山梔子1.5-3、川芎2-3、黃芩2-3、連翹2.5-3、白芷2.5-3、桔梗2.5-3、防風2.5-3
- [用法・用量]  
湯
- [効能・効果]  
体力中等度以上で、赤ら顔でときにのぼせがあるものの次の諸症  
にきび、顔面・頭部の湿疹・皮膚炎、あかはな(酒さ)

- 133 清暑益氣湯
- [成分・分量] 人参3-3.5、白朮3-3.5(蒼朮も可)、麥門冬3-3.5、當帰3、黃耆3、陳皮2-3、五味子1-2、黃柏1-2、甘草1-2
- [用法・用量] 湯
- [効能・効果] 体力虚弱で、疲れやすく、食欲不振、ときに口渴などがあるものの次の諸症  
暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢、夏痩せ、全身倦怠、慢性疾患による体力低下・食欲不振
- 134 清心蓮子飲
- [成分・分量] 蓼肉4-5、麥門冬3-4、茯苓4、人参3-5、車前子3、黃芩3、黃耆2-4、地骨皮2-3、甘草1.5-2
- [用法・用量] 湯
- [効能・効果] 体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症  
残尿感、頻尿、排尿痛、尿のにごり、排尿困難、こしけ(おりもの)
- 135 清肺湯
- [成分・分量] 黃芩2-2.5、桔梗2-2.5、桑白皮2-2.5、杏仁2-2.5、山梔子2-2.5、天門冬2-2.5、貝母2-2.5、陳皮2-2.5、大棗2-2.5、竹茹2-2.5、茯苓3、當帰3、麥門冬3、五味子0.5-1、生姜1、甘草1
- [用法・用量] 湯
- [効能・効果] 体力中等度で、せきが続き、たんが多くて切れにくいものの次の諸症  
たんの多く出るせき、気管支炎
- 136 折衝飲
- [成分・分量] 牡丹皮3、川芎3、芍藥3、桂皮3、桃仁4-5、當帰4-5、延胡索2-2.5、牛膝2-2.5、紅花1-1.5
- [用法・用量] 湯
- [効能・効果] 体力中等度以上で、下腹部痛があるものの次の諸症  
月經不順、月經痛、月經困難、神經痛、腰痛、肩こり

137 川芎茶調散

〔成分・分量〕

白芷2、羌活2、荆芥2、防風2、薄荷葉2、甘草1.5、細茶1.5、川芎3、香附子3-4

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力に関わらず使用でき、頭痛があるものの次の諸症

かぜ、血の道症<sup>注)</sup>、頭痛

《備考》

注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

138 千金鷄鳴散

〔成分・分量〕

大黃1-2、当帰4-5、桃仁4-5

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

打撲のはれと痛み

《備考》

注)体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

139 錢氏白朮散

〔成分・分量〕

白朮4、茯苓4、葛根4、入參3、藿香1、木香1、甘草1

〔用法・用量〕

湯

小児の消化不良の効能については小児用量に注意のこと

〔効能・効果〕

体力虚弱で、嘔吐や下痢があり、ときに口渴や発熱があるものの次の諸症  
感冒時の嘔吐・下痢、小児の消化不良

140 疎經活血湯

〔成分・分量〕

当帰2-3.5、地黃2-3、川芎2-2.5、蒼朮2-3(白朮も可)、茯苓1-2、桃仁2-3、芍藥2.5-4.5、牛膝1.5-3、威靈仙1.5-3、防己1.5-2.5、羌活1.5-2.5、防風1.5-2.5、龍胆1.5-2.5、生姜0.5、陳皮1.5-3、白芷1-2.5、甘草1

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの次の諸症  
関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

- 141 蘇子降氣湯
- 〔成分・分量〕 紫蘇子3-5(蘇葉可)、半夏3-5、陳皮2-3、前胡2-3、桂皮2-3、当帰2.5-3、厚朴2-3、大棗1-2、生姜0.5-1又は乾姜0.5-1、甘草1-2
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虚弱で、足冷えや顔ののぼせがあり、息苦しさのあるものの次の諸症  
慢性気管支炎、気管支ぜんそく
- 142 大黃甘草湯
- 〔成分・分量〕 大黃4-10、甘草1-5
- 〔用法・用量〕 (1) 散: 1回0.75-1.5g 1日1-2回  
(2) 湯
- 〔効能・効果〕 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醸酵・痔などの症状の緩和
- 〔備考〕  
注)体力に関わらず、使用できる。  
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、(効能・効果に関する注意)として記載する。】
- 143 大黃牡丹皮湯
- 〔成分・分量〕 大黃1-5、牡丹皮1-4、桃仁2-4、芒硝3.6-4、冬瓜子2-6
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以上で、下腹部痛があって、便秘しがちなものの次の諸症  
月経不順、月経困難、月経痛、便秘、痔疾
- 144 大建中湯
- 〔成分・分量〕 山椒1-2、人参2-3、乾姜3-5、膠鈎20-64
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症  
下腹部痛、腹部膨満感
- 145 大柴胡湯
- 〔成分・分量〕 柴胡6-8、半夏2.5-8、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合 4-5)、黄芩3、芍薬3、大棗3-4、枳実2-3、大黃1-2
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症  
胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症